


10690/12



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30523783_0001


SYNOPSIS

UNIVERSÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ:

Sive Doctissimorum Virorum

DE MORBIS,

Eorumque causis, & Remediis Judicia.



AUTHORE

JO. ALLEN M. D.

EDITIO NOVA VENETA,

Cæteris auctior, & plerisque in locis diligenter
emendata; cui accesserunt celebriorum Veterum,
Recentiorumque sententiæ, præter ea, quæ in aliis
latinis editionibus prostant.

Τὴν αὐτὴν διαβολὰς ἐστὶ γινῶναι τὰ ὁρῶνς εἰρημεῖναι.
Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.

PARS PRIM A.



VENETIIS, MDCCLXII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

Ad. L. L. L.

42990422

1910

1910

1910

1910

1910

1910



1910

1910

1910

1910

1910



PRÆFATIO

EUSEBII SGUARIi M D.

ad Synopsin Medicinæ

JOH. ALLEN.

*In qua Historiæ Medicinæ compendium, & pro
Thyronibus in eadem nunc temporis instituen-
dis præcipui Scriptores exhibentur.*



Medicina, humanarum disciplinarum
Nobilissima atque utilissima, non
solum morborum genera, species,
causas, differentias, numerumque
perquirat, & discriminat, verum
etiam discretos ex suis causis deducit, iisdem-
que experientia duce rationabiliter medetur. Ea-
dem in Theoricam ac Praticam merito dividi so-
let, quarum illa ex Naturæ legibus, & diver-
sis Physicis partibus, morborum causas, quibus
judicium dirigitur, venatur, & explicat; hæc ap-
positis pharmacis ægros in salutis gratiam resti-
tuere contendit, & naturalium vitaliumque mu-
nerum vitia aptis auxiliis emendat. Utraque pars
quantas novissimis hisce temporibus acquisierit
notiones, quantaque, solertissimorum Virorum in-

industria, additamenta, suscepit, testantur nuperrimè illustr. Academiarum, tam quæ Parisiis, & Berolinisunt, quam quæ in Anglia, & Scotia, atq; alibi conatus, nec non quorundam hujusce Seculi Scriptorum doctissimorum, sagacissimorumque labores, qui sublimioribus Scientiis ad usum partium animalis corporis, & naturalium, vitalium, ac animalium actionum œconomiam intelligendam in auxilium vocatis, Theoricam medicinam ad Scientiæ culmen, dignitatemque evexere: quemadmodum post Borellum, Bellinum, Pitcarium, Freindium, & Jurinum celeberrimus Borerhaavius, ejusque alumni, præsertim Cl. Van Schvviecten, & Doctissim. Aller dudum præstitere, quibus merito accensendus est Experientis. Hales, ipsamque Practicam supra Veterum industriam perducere norunt; quemadmodum ab acutissimo Sydenhamo plerique: maxime vero meritissimi Meadius, Astrucius, Montreali, Haen, Stock, & Hasenohrl felici ausu intenterunt. Sed quibus initiis, quibusque progressibus Ars hæc, siue disciplina, per antiquiora tempora ad nostram usque ætatem pervenerit, ut aliquo modo adumbremus, historicam ejus narrationem veluti per synopsis, seu in compendium, exornare juvabit ab Api, siue Serapi Ægyptiorum Osiride ab aliis dicto, vel juxta Diodorum Siculum ab Iside, ejusque filio Oro, quem Græci Apollinem Jovis filium dixere, ni cum aliis putare velimus, ab Hermete Trismegisto apud Ægyptios antiquitus Medicinam ortum habuisse. Id unum tamen certum est ab Ægypto in Græciam una cum cæteris Artibus Disciplinam hanc multo ante Trojæ excidium translata esse, ibique maxime excultam a Centauro Tessalo, & Chirone, a quo etiam Chirurgia dicta, unde liquet, nisi ejus partem, quæ in primis manuali operatione circa vulnerum sanationem

exercetur, antiquissimis illis temporibus usuvenisse. Chiron discipulos habuit Æsculapium Apollinis filium, & Achillem Tessaliæ Regem, qui una cum Machaone, & Podalirio, Æsculapii filiis, ante Trojanum bellum Telephum Regem Herculis filium curavit. Machaon occisus ad Trojam Artis heredem reliquit filium suum Nicomachum, a quo usque ad Melampum, qui 1243. annis ante Christum natum vixit, nisi quorundam Medicorum mentio sit: veluti Promethœi, quem Medicinæ inventorem fecit Æschylus, & Pœonis, unde Pœoniæ herbæ nomen. Melampus, cum filias Regis Argivorum furiosas Helleboro exhibito sanasset, huic vegetabili melampodii nomen dedit, & ab eo usque ad Menecratem Syracusanum 934. ann. ante Chr. nullus quispiam alius Medicus recensetur. Hunc sequitur Herophylus Chalcedonius, qui tempore Phalaridis Tyranni homines vivos e carcere obtinuisse, & fecasse testantur Celsus, & Tertullianus; tum Empedocles Agrigentinus, & Acron itidem Agrigentinus, qui ann. 460. ante Chr. Empiricæ sectæ primordia fundavit. Paulo post Democritus Abderites, & Hippocrates Cous floruerunt, ejusque filii Thessalus, & Draco, atque gener Polybius, qui libros scripsit de natura humana, & de tuenda valetudine. Hos exceperunt Diocles Caristius, & Cratevas; tum Plato, ejusque discipulus Aristoteles, & Theophrastus Eresius, & Erasistratus obscuram filii Seleuci Siriæ Regis Antiochi celebris; demum Nicander inventor Theriacæ, Mithridates Rex Ponti, Themison Laodicæus Methodicæ sectæ inventor, & Asclepiades. Sed a Christo nato vertente

I. Seculo floruerunt Antonius seu potius Actorius Musa Cæsaris Augusti Medicus, ejusque frater Euphorbus Jubæ Regis Mauritanicæ Archiater, tum Apollonius Musa, Philonides Acutus, qui a Plinio

passim citatur, & Aretæus Cappadox. Tiberii vero ætate celebres fuere Antiochus Bachius, Cassius Fœlix, Scribonius Largus, Hetaclides Erythræus, Vectius Valens Antiochenus, qui eodem Plinio teste, in Aula Claudii inter Adulteros Messalinæ fuit, atque demum Cornelius Celsus elegantissimus præ ceteris, qui deinceps scripserunt, Medicis, ornatissimusque. Porro imperante Nerone fuere Andromachus senior Cretensis, ex cujus præscripto hodie Theriaca conficitur, Thessalus Trallianus Methodicæ sectæ cultor eximius, & Evax Rex Arabum, qui de Medicina Librum ad Neronem scripsit. Sub Vespasiano demum fuere Plinius secundus, Andromachus junior, Græcinus, Menedotus, & Democrates; tum Dioscorides Anazarbenfis, ex Anazarba Siciliae urbe, atque sub Trajano versus seculi finem: Crito, Ruffus Ephesius, & Marcinus. Sed ex tantis Medicis plerorumque Opera deperdita sunt; nec nisi extant ex Latinis ea C. Celsi, & Caii Plinii, ex Græcis vero longe plura, viz ea Scribonii Largi, Dioscoridis, & nonnulla Ruffi Ephesi, tum Vectii Valentis nisi fragmenta quædam Astrologiæ; Evacii Liber eidem adscriptus, sed fidei suspectæ, & Cassii Fœlicis libri duo, qui de curatione morborum agunt.

II. Seculo Scripta Hippocratis magno pretio haberi orsa sunt, & a nonnullis Commentario illustrari, simulque plurimi Methodici: ceu Thessali Sectatores inclaruere; præ ceteris vero celebres fuerunt: Soranus Ephesius, qui sub Trajano, & Hadriano Romæ Medicinam exercuit, Olympius, ejusque discipulus Apollonides, Julianus Alexandrinus Hippocratis Commentator, Cœlius Aurelianus, qui etiam Sorani libros latine dedit, Sabinus, qui cum Ruffo Ephesio præcedentis Seculi Hippocratis opera illustravit. Hos sequuntur illi,

illi, qui sub Hadriano Cæsare tantum vixere : ut Dioscorides Alexandrinus, Artemidorus Capito, Pelopes Humesiani, & Satyra Quinti auditores, a Galeno jam memorati; tum Lycus Macedo, & Claudius Galenus, qui postremus omnes hucusque Medicos, & eruditione, & librorum multitudine, cum ultra 200., teste Gesnero, scripsisset, superavit, tandem Emilius Macer, qui carmen de herbarum virtutibus confecit.

III. Seculo vix cujuspiam Medici Opera, nec nisi quorundam tantum nomina occurrunt: veluti Antylli, qui teste Oribasio, multa scripsit de Arte Gymnastica, Archigænis, & Herodoti viris de secta Pneumatica clarissimis, & Possidonii de quo Aetius, & Gesnerus in Bibliotheca aliquid effantur. Ast Probo imperante Panthaleon de Vercellis Sabaudia Ducis Protomachus, & Martyr inclaruit, & sub Caracalla Quintus Serenus Samonicus Poeta Lyricus, Gordiani junioris præceptor, qui in balneo occisus est, & cujus latina fragmenta adhuc extant.

IV. Seculo Medicina florere cœpit Alexandria Zenone Cyprio præceptore, usque in Juliani imperium celeberrimo, a quo instituta sunt: Magnus Antiochenus, Jonicus, sed præsertim Oribasius Pergamenus Juliani Apostatae Archiater, & Consiliarius, a quo Constantinopolitanam Quæsturam adeptus est. Hujus vero ætate vixit etiam Eunapius historicus simul, atque Medicus, ut ei verisimiliter inscribi possint: tum quatuor, quæ extant de Euporistis libri; tum alii nonnulli, & paulopost Vindicianus, quem Theodorum Priscianum quidam dicunt, qui librum de expertis remediis ad Valentinianum Imperatorem concinnavit.

V. Seculo nullus occurrit celebris Medicus; sed omnium, quorum memoria interciderit, jacturam

compensat circa ejusdem seculi finem unus Aetius Amidenus, ex Amida Mesopotamiæ urbe, qui ad imitationem Oribasii plurima veterum fragmenta congeffit, quæque alibi non reperiuntur deducta ex Archigene, & Herodoto, ex Possidonio, & Antyllo, ex Sorano Methodico, & Leonide sectæ Episyntetico. Huic adjungendus est Petrus Archiater Theodorici Gothi Medicus.

VI. Seculo illustres fuere Alexander Trallianus, ex Trallibus Lydiæ urbe celeberrima, a Stephano Parente suo Medicina institutus, Uranius natione Syrus, Procopius insignis Historicus, & Belisarii Ducis Amanuensis, quem cum Freindio Medicum una conjicimus, Perzoes, qui librum de Indorum Sapia Chosrois Persarum Regis nutu confecit, & Palladius Sophista, vel Jatrofophista, primus inter recentiores Medicos græcos habendus, quippe qui Alexandriæ institutus est, & cujus commentarium in librum de morbis acutis Hippocratis servavit Gesnerus in sua Bibliotheca.

VII. Seculo bella Saracenica Asiæ, Africæ & Siciliæ Artes agitantia nisi in minori Asia, & Græcia paucos eruditos reliquerunt. Schola tamen Alexandrina ab initio usque hujus seculi ob Medicinæ studia adhuc inclarescebat, cui operam dedit ibidem Paulus Ægineta, ab Ægina insula dictus, qui primus de Arte obstetricia egit, & Abulpharagio teste acuratissimo, sub Heraclii regno floruit. Huic accedunt Stephanus Atheniensis, quem alii Alexandrinum dicunt, quique commentarium in Galeni primum librum ad Glauconem exaravit, & si habeatur pro eo cognomento Chymicus, sub Heraclio, cui Chrysopæjam suam dicavit, vixisse constat; tum Theophilus cognomine Jatrofophista, Protospatharius, & Monachus, qui præter libros de urinis, de humani corporis structura, & in Aphor. Hipp.

com-

commentaria, alterum etiam de pulsibus composuit, sub titulo Philareti e Græco conversum. Aaron Alexandria Presbyter, qui triginta libros, Medicinæ Pandectas vocatos, scripsit, & Maserjauvaihus Syrus religione autem Judæus.

VIII. Seculo crassa ubique barbaries si Almanzoris aula Bagdad posita excipiat, quia, Abulpharagio teste, postquam Abbatis stirps, ea Omniadum decessa, ad Imperium evecta est, quod anno 746. contigit, Arabes desidia excussa Scientias sub Almanzore primum, dein per subsequentes Chaliphas mirifice excoluere. Hoc vero seculo edificata ab Almanzore Bagdad, cum forti morbo is implicaretur, Georgium Bachtishuam Medicum Indicum Nisaburi, quæ Metropolis Chorasanae erat, degentem, ad se vocavit, qui multos deinde de Medicina Libros suo mutu traduxit.

IX. Seculo multum floruit Medicina in Asia apud Saracenos, ceu Arabes, quia in nova hac Civitate Bagdad, ubi popularis lingua erat Syriaca, insignis fuit quidam professor nomine Mesue, natione Syrus, Nisaburi oriundus, Pharmacopœi filius, & a Gabriele Bachtishuæ filio Medicina optime imbutus, qui magnum illico discipulorum numerum habuit, & Honain Hiræ oriundus, post longum iter per Græcas regiones in urbem Bagdad reversus, circa seculi medietatem Græcorum Medicorum opera in linguam Syriacam converte orsus est, qua in re a Filio Isaac, nepoteque Hobaish deinde imitatus est. Hinc celebres hac ætate comperimus Johannem Serapionem, qui veteris Medicinæ narrationem tradidit, & Rhases Rei natus, quæ Urbs est in Iraco Persico, ceu potius in Provincia Chorasana, qui Bagdad migratus, inter centum præclaros Medicos ibidem commoran-

tes electus est, ut celebre quoddam in ea urbe Nosocomium curaret. Hic Auctor est libri *Continens* dicti, in quo ut Actuarius inter Græcos, sic is inter Arabas primus chymicorum remedium mentionem injecit.

X. Seculo valde multi inter Saracenos, Asiaticos Medicinæ Scriptores extiterē, quorum tamen opera, sicut ab Arabica in latinam linguam nunquam versa sunt, ita penitus interiere; aliorum vero, quorum libri servantur, & supersunt, præcipuus Haly Abbas est, qui suum Amaleci: seu Opus Regium, quo perfectum Medicinæ Systema tradere præsumpsit, Chaliphæ Adad' odaulæ sermone magnifico orientalium more dicavit, tum Avicenna, aliter Abahali, Ebenhali ex Patre Hali, vel Ahasen, Ebensina dictus, Bocharæ in Chorasana natus, qui eximio Opere, cujus titulus *Canon*, universam Medicinam amplexus est, & tanta fuit in celebritate, ut a quibusdam ad Viziris dignitatem ascendisse memoretur, quare etiam Princeps Alahali, vel Hassem fuit nuncupatus.

XI. Seculo illustres fuere Nonus, qui librum de curatione morborum Constantino Porphyrogenito inscripsit, qui juxta Jeremiam Martium ejus versificatorem, editoremque, Constantini Ducæ filius fuit, tum Michael Psellus, & Simeon Antiochenus, & Abumeron Abenzoar, ceu Abimeron Avenzoar, qui librum *Thaïsser* dictum, confecit, & plerique alii Arabes, quorum Opera nihil memorabile continent: ut Abenguesit, Jesu Haly Bulcasem, Camanufali, Rabbi Moses &c. His accedunt Isaacus Deimiram Judæus, Simeon Sethi, qui ex Saracenis Artem in Italiam transtulit, Gabriel Surianus Rhazis traductor, Constantinus Afer Monachus Cassinensis, a quo florere cœpit Medicina Salerni, quod

quod Campaniæ felicis oppidum Cassinensi monasterio adjacet.

XII. Seculo, sub ejus initium, Liber Scholæ Salernitanæ titulo prodiit, qui a Johanne Mediolanensi in ordinem redactus, totius Societatis nomine Roberto Normandiæ Duci, illius Guilielmi, qui Angliam subjugavit, filio, dicavit. Hic Leoninis versibus scriptus est, & de sanitate tuenda, sexque rebus nonnaturalibus dictis, agit. Floruere hoc seculo Rogerius Parmensis, juxta alios Salernitanus, Jamerius, qui tractatum Chirurgiæ edidit, & Rolandus pariter Chirurgus, sed hos omnes præivere Alsaaravius, ceu Albucasis scriptor Arabs, qui opus composuit *Al-Tasrif* dictum, sive Methodum medendi, in triginta ac duo volumina divisum, & Stephanus Antiochenus, qui Haly Abbatem eo sermone, quo nunc legimus, latine convertit. Tandem circa finem seculi plerique Judæi passim Medicinam exercebant: ut Benjaminus e Tudela suis peregrinationibus circa id tempus factis cognovit, quamquam ex Lege Canonica nulli Judæo Medicinam agitare liceret, Johannes Damascenus, Mesuen dictus, sub Friderico Barbarossa Constantinopoli inclaruit, & Egidius Atheniensis Monachus ex ordine S. Benedicti versibus Hexametris, haud magna tamen syllabarum quantitatis ratione habita, de virtutibus medicamentorum, de urinis, & pulsibus scripsit, & Philippi Augusti Galliæ Regis Archiatri munus exercuit; Moschion, Demetrius Pepagomenus, Actuarius, & Nicolaus Mirepsus e Græcis Scriptoribus postremus, qui sub Antidotarii nomine composita medicamenta pleraque in Græcis, & Arabibus dispersa, congeffit.

XIII. Seculo ineunte celebriorum Scripta Arabum, nonnullaque etiam Hippocratis, & Galeni

leni ab ipsis Arabibus in patriam linguam conversa studio Salernitanæ Scholæ, jussuque Friderici II. Imperatoris, Litterarum, & Judicis, & Fautoris insignis, latine converti cœpta sunt, atque passim edi. Hinc illustres floruerunt Medici, Gerardus Carmonensis, ex Carmona Andalusis urbe, qui interpretatus est librum Kyrani Kyramides in Hyrac Kin Koronides inscriptum, & cuidam Persarum Regi tributum, Simeon Januensis, qui cum Abrahamo Judæo Serapionis opera ex Arabico in latinum transtulit, & Saladinus de Esculo, & Benvenutus Graphæus de Jerusalem, & Johannes Platearius. Tum circa medium seculi floruit: Gulielmus de Saliceto, Placentinus dictus, tam in Medicina, quam in Chirurgia peritus, Thaddæus Florentinus ejus coætaneus, qui Medicinam Bononiæ cum ingenti lucro professus est, Gilbertus Anglus, Brunus Calaber Chirurgus, & Theodoricus Episcopus Cerviensis, qui Bruni collectionem una cum quibusdam fabulis a Magistro suo Hugone de Luca surreptis suo nomine edidit. His accedunt Lanfrancus Mediolanensis Chirurgus, qui tempore Rudolphi Imperatoris in Aula Philippi Pulchri vixit, Petrus Hispanus ex Lusitania Episcopus Tusculanus, qui postea fuit Johannes XXI., Rogerus Bacco, Guilelmus Britannus, Turrisanus de Turrisanis, & Arnoldus de Villanova chimicus simul, & Medicus celeberrimus, qui circa initium etiam sequentis seculi floruit.

XIV. Seculo Petrus de Apono statim in Italia occurrit Magia suspectus, sed pendente lite mortuus, cujus tamen effigies flammis damnata est, Valescus de Taranta, Matthæus Sylvaticus, atque Franciscus Pedemontanus, uterque Medicus Roberti Siciliae Regis, tum Mundinus

Me-

Mediolanensis, qui Anatomix volumen composuit ; In Gallia non solum præfatus Arnoldus Villanovanus , qui sub Alberto I. Imperatore floruit ; sed etiam Gordonius Monspeliensis , qui ingens conscripsit volumen *Lilium Medicinæ* vocatum ; In Anglia demum Johannes de Gaddesden auctor celebri Operis , Rosa Anglica dicti , & Joh. Ardernus . Præterea in hoc seculo celebrantur , Guido de Cauliaco Bertrutii discipulus magni nominis , & experientix , cujus ætate Medici a curationibus Chirurgicis , ceu quæ manibus fiunt , abstinere penitus cœperunt , Chirurgus Monspeliæ Professor , & postea Papæ Clementis Medicus , Bartholomæus Clanvillus , Johannes de Dondis , Ugolinus de Monte , Gentilis de Fulgineo , qui Commentarium scripsit in Ægidii Poema , Dinus de Garbo , vel de Carbo , VVihlelmus de Varignana Judæus , Raymundus Lullus , Joh. de Rupe-Sciffa Monachus Ordinis minorum , & chymici artificii professor ; tum Dini de Garbo præfati filius , Thomas , & Johannis de Dondis pater Jacobus , Auctor præclari Operis , quod *Aggregator* inscribitur , sub finem seculi demum Christophorus de Honestis Medicus Bononiensis , qui scripsit expositiones super Antidotarium Mesue , & Antonius Cermisenus , ejusque discipulus Michael Savonarola Patavinus , qui etiam circa initium sequentis seculi inclaruit .

XV. Seculo cum cæteris liberalibus Artibus etiam Medicina ornamenta suscepit , unde circa initia eminuerunt , Jacobus de Partibus , Jacobus Foroliviensis , Marsilius de S. Sophia , & Hugo Senensis ; tum Johannes Marlianus , Bartholomæus Montagnana , Joh. de Conco-regio , Leonhardus Bertapalia , Joh. de Romanis Cremonensis , Nicolaus Vernia , Antonius Goainerius ,
Joh.

Joh. Arculanus in Chirurgia illustris, & Petrus de Argillata, qui primus ex Recentioribus Spinæ ventosæ per Chirurgiam cœpit curationem. His accedunt Georgius Vella, Antonius Benivenius, VVendelinus Hoch, Panthaleon de Confluentia, Bavarius de Bavariis, Conradus Gilinus, Ludovicus Cornelius, qui de vitæ sobrietate elegantissime egit, & Joh. Matthæus de Gadibus ceu Gandavenfis. Anno 1483. morbus, Sudor Anglicus dictus in exercitu Regis Henrici VII. primo incœpit, & anno 1492. luis Venereæ quædam vestigia apparuere, quæ tamen duobus post annis in obsidione Neapolis Gallicum exercitum infecit, & paulo post a Gabriele Torella satis accurate descripta fuit. Hunc sequuti sunt: Antonius Scanarolus, Sebastianus Aquitanus, Natael Montesaurus, & Nicolaus Leonicensis Ferrariæ professor, & Magnus Græcæ Medicinæ instaurator, qua in reviam expeditam sibi reddi percepit a doctissimi Viri Hermolai Barbari Patritii Veneti studiis, qui illa ætate Galenum, & Dioscoridem ab innumeris erroribus expurgavit, adhibitis ad hoc Manuscriptis Codicibus, quos a Constantinopolis expugnatione, multi de Græcis in Italiam fugientes, secum attulere. Exeunte vero hoc seculo, & sub initium sequentis duo Medici apprimè illustres etiam enituere, quorum alter Casparus Torella fuit Cæsaris Borgiae, & Papæ Alexandri VI. Medicus, a quo etiam Episcopus Sanctæ Justæ creatus fuit, alter longe doctior Thomas Linacrus Anglus, qui sub Laurentio de Medicis Florentiæ Demetrio Chalcondyla in Græcis, & Angelo Politiano in latinis litteris usus est, & in Patriam redux Collegium Medicorum Londini fundavit, ejusque primus Præses fuit.

XVI. Seculo Hippocratis, Galeni, aliorumque Medicorum scripta, hucusque fere postliminio habita, in manus studiosorum una cum Græcis litteris, & disciplinis incidere crebro visa sunt, unde Medicina majori diligentia, & elegantia colli cœpit; Sed cum scriptorum numerus ab hinc mirifice in posterum excrescat, ut omnem confusionem evitemus, alphabetico ordine eosdem deinceps recensere statuimus. Quare revocato ad hujus seculi initium exortu morbi, qui Scorbutus dicitur, major pars scriptorum qui de Medicina, Anatome, Pharmacia, & Chirurgia egere sequenti Elencho explicamus.

Akakia Martinus	Bonacciolus Ludovicus
Acquapendente Fabricius ab	Bonacossi Hercules
Alexandrinus Julius	Botallus Leonhardus
Almenar ceu Almeranus Johan.	Bottoni Albertinus
Alpinus Prosper	Brasavolus Andreas
Altomarus Donatus	Brati Johannes
Antonius	Brissotus Petrus
Andreghetius Andreghetus	Burres Laurentius
Andernacus Joh. Guntherus	Cajus ceu Kaye Bernhardus
Argenterius Johannes	Calmet ceu Ciaumeteu ceu Calmetæus Antonius
Baccius Andreas	Campegius Symphorianus
Ballonius ceu de Bailou Guliel.	Campolongus Æmilius
Bartisch Georgius	Capivaccius Hieronymus
Bayrus Petrus	Capra Marcellus
Beli Lucianus	Carcanus Joh. Baptista
Bethancourt Jacobus de	Carpus Jacobus vel
Bodesten Adamus	Carpensis Berengarius
	Ca-

Casatus Joseph	Fracaſtorius Hieronymus
Cafferius Julius	Franciotti Georgius
Caspius Georgius	Franco Petrus
Cataneus Jacobus	Fricius Melchior
Charletonus Gualterus	Fridevallis Hugo
Charretanus Johannes	Fuchſius Leonhardus
Cheſne Joſeph du	Fumanellus Antonius
Claudinus Jul. Cæſar	Galluſus Paſchalis
Columbus Realdus	Gavaſſetius Michael
Cornacchinus Thomas	Gazius Antonius
Cornarius Janus	Gemma Joh. Baptiſta
Coſtæus Johannes	Gerſtorff Johannes von
Courcellius Franciſcus	Gefnerus Conradus
Craffus Julius Paulus	Gordonus Bernhardus
Curtius Matthæus	Goræus Johannes
Dalecampius Jacobus	Grevinus Jacobus
Dantzius Johannes	Guinterus Johannes
Donatus Marcellus	Haſfurtus Johannes
Driandrus Johannes	Heri Tierri de
Duni Thaddæus	Herovius Bartholomæus
Daretus Ludovicus	Heſſus Lobanus.
Eraſtus Thomas	Heurnius Johannes
Euſtachius Joh. Martinus	Hollerius Jacobus
Fallopius Gabriel	Hucherus Johannes
Faventinus Leonellus	Jacchinus Leonhardus
Fernelius Johannes	Jacotius Deſiderius
Ferrara M. Camillus	Ingraſſias Joh. Philippus
Ferreri Augenius	Jordanus Thomas
Ferrius Alphonſus	Joſſius Nicander
Flexelius	Kapfferus Matthæus
Fœſius Anutius	Lacuna Andreas
Fonſeca Rodericus a	Lanfrancus
Fontanon Dioniſius	Laurentius Andreas
Foreſti Petrus	Libavius Andreas

Lusitanus Amatus	Paracelsus Philippus
Magatus Cæsar	Aurelius Theophrastus Bombast ab Hohenheim
Maggius Bartholomæus	Paræus Ambrosius
Manardus Johannes	Parisiis Johannes de
Manni Joh. Jacobus	Peramatus Petrus
Maranta Bartholomæus	Pinæus Severinus
Marinellus [Johannes	Pini Petrus Matthæus
Curtius	Pison Nicolaus
Martianus Prosper	Pons Jacobus
Martyr Petrus	Porta Joh. Baptista
Massa Nicolaus	Quercetanus Joseph
Massaria Alexander	Radius Johannes
Matthæi Johannes	Rhodion Eucherius
Matthiolus Petrus Andreas	Riolanus Johannes
Maynardus Petrus	Roberti Octavianus
Mena Ferdinandus	Rondeletius Gulielmus
Mercurialis Hieronymus	Rosius Matthæus
Minadaus Joh. Thomas	Rossetus Franciscus
Minadoi Aurelius	Rota Joh. Franciscus
Mizaldi Antonius	Rudius Eustachius
Montagnana Marcus Antonius	Rueff Jacobus
Montaltus Hieronymus	Ruellius Johannes
Montanus Joh. Baptista	Ruffen Jacobus
Montius Sebastianus	Ryff Gualt. Hermannus
Montuus Hieronymus	Salus Diversus Petrus
Morus Horatius	Sanctus Marianus Barulitanus ceu ex Barulo
Nennerus Franciscus	Saporta Antonius
Nicoli Nicolas	Scacchus Durans
Niccolinis Annibal de	Schmaus Leonhardus
Nuckius Antonius	Schylandrus Cornelius
Oddis Oddi de	Septalius Ludovicus
Palmenius Julius	Silvaticus Joh. Baptista
Paniza Ludovicus	Solenander Reinerus
Paparelle Sebastianus	

Spachius Isdrael	Turinus Andreas
Sporischijs Johannes	Valleriola Franciscus
Susembetus Lazarus	Valesius Franciscus
Sufius Joh. Baptista	Vanguion
Sylvius Jacobus	Vega Christophorus a
Tagaultius Johannes	Vesalius Andreas
Taliacotius Caspar	Vierius Johannes
Taurellus Nicolaus	Vigo Johannes de
Thriverus Hieremias	Virgilius Marcellus
Toletus Petrus Jacobus	VVittichius Johannes
Tragus Hieronymus	VVeckerus Joh. Jacobus
Trincavellus Victor	VVolfius Caspar
Tronus Petrus Martyr	VVurtzius Felix

XVII. Seculo Litterarum studium adeo incaluit, ut in omni facultate longe plures Scriptores, quam singulis præteritis Seculis, in lucem prodierint; præsertim vero in Arte Medica, quorum nomina juxta nobis propositam Synopseos Methodum sunt: ut sequitur.

Abeille	Alpinus Prosper
Acosta Joseph de	Alsarius Vincentius
Aggravi Joh. Franciscus	Amideus Matthæus
Agricola Johannes	Ammanus Paulus
Aicholtzius Johannes	Andreas Johannes
Alaymus Marc. Antonius	Andriollus Michael Angelus.
Albinus Bernhardus	Angelini Facondius
Albrechtus Joh. Guntherus	Antonides Antonius
Aldrovandus Ulisses	Aquapendente Hieronymus. Fabricius
Allegrì Hieronymus	Arancius Julius Cæsar
Alliot Joh. Baptista	Arcæus Franciscus
Almacherus Joh. Fridericus	Arniseus Henningius
	Asellius Caspar

Augenius Horatius	Bergerus Joh. Gotto-
Bachmeister [Mattheus	fridus
[Johannes	[Hieronymus
Baconus de Verulamio	Beslerus {Michael Ru-
Franciscus	l. pertus
Baldilius Valerius	Betera Felicianus
Baldinus Bernhardus	Beurerus Joh. Jacob
Baldonius Sigismun-	Beverovicius Johannes
dus	Beyer (Joh. Hartman-
Baldutius	nus
Banzer Martinus	Beynon Elias
Barbati Hieronymus	Bianchi Joh. Baptista
Barbette Paulus	Bierlingius Caspar
Barlæus Caspar	Theophilus
Bartholdi Gregor. Theo-	Bilichus Anton. Gunte-
dorus	rus
Bartholinus [Caspar	Blancardus Stephanus
[Thomas	Blasius Gherardus
Bartoletus Fabricius	Blegnyus Nicolaus
Bartschius Jacobus	Blondius Michael An-
Bafapopi Gnesius	gelus
Battus Conradus	Bocconi Paulus
Bauderon	Boe Sylvius Franciscus
Bauhinus [Johannes	de le
[Caspar	Bohnus Johannes
Bauschius Joh. Lauren-	Bokelmannus Andreas
tius	Bologna Joh. Stephanus
Bayle Franciscus	Bonetus Theophilus
Bazzicaluve Ascanius	Bonham Thomas
Maria	Bonocore Thomas
Becke David von	Bontekoe Cornelius
Beckerus Daniel	von
Becherus Jachimus	Bonvinus Elias
Bejerus Gottofridus	[Petrus
Bennet, ceu Benedictus	Borelli {Joh. Alphon-
Christophorus	l. sus
Berengarius Jacobus	Borrichius Olaus

Boselli Franciscus	Capponus Joh. Baptista
Bovius { Thomas	Caranza Alphonsus
Hyacinthus	Cardanus Hieronymus
Brà Henricus a	Cartes Renatus des
Brachi Jacobus	Casaleni Joh. Antonius
Bravo Caspar	Cafe Johannes a
Brendelius Zaccharias	Castellanus { J. M.
Brenzelius Joh. Hiero-	Petrus
nymus	{ Bartholo-
Brovune Joh. Thomas	mæus
Brumaldi Joh. Antonius	Castelli { Johannes
Brunn Joh. Jacobus a	{ Petrus Va-
Brunnerus Balthasar	scus
Brunonus Jacobus Pan-	{ Steph. Rode-
-eratus	Castro { ricus de
Buonacorsi Bartholo-	{ Petrus a
mæus	Causapè Anicetus
Burgeois Aloisia	Charas Moises
Burgers Petrus	Chamberlains
Burri Franciscus Jo-	Chambre de la
seph	Charriere Joseph
Busæus Johannes	Chresnephorus Joh.
Bussolus Aurelius	Chiarana Marianus
Buttler Carolus	Chiffletius Joh. Jacobus
Cabibi Samuel	Christiani Andreas
Cæsalpinus Andreas	Christini Bernardinus
Cæsius Bernhardus	Chunius Joh. Philippus
Caimus Pompejus	Clerc le
{ Joachimus	Cloos du
Camerarius { Elias Ru-	Clovves Guilelmus
dolphus	Clusius Carolus
Campanella Thomas	Cneulinus Tobias
Canonarius Petrus An-	Cnutius Justus
dreas	Cobertus Tobias
Cappella Joh. Antonius	Codronchius Baptista
Capelluti Rolandus	Cognatus Manilius
Capua Leonhardus a	Coiter Volcherus
	Cole

Cole Gulielmus	Dellera Matthias
Golbach Johannes	Deodatus Claudius
Colle Johannes a	Deusingius Antonius
Colerus Martinus	Deventer Henricus
Colnerus Johannes	Diemberbroeck Isbrandus von
Cologninus Angelus	Dieterichius Joh. Conradus
Conringius Hermannus	Dietericus, vel Didricus Helvvig
Contulus Joh. Baptista	Digbæus
Cooke Jacobus	Dionis Petrus
Corbye A. de	Dodonæus Rembertus
Cornacchinus Marcus	Dœbelius Joh. Jacobus
Cortefius Joh. Baptista	Dœringius Michael
Cortilionis Sebastianus	Dolæus Johannes
Cortummius Justus	Doldius Leonhardus
Courtial Joh. Joseph	Donkers Laurentius
Courtin Germanus	Donnoli Francisc. Alphonsus
Covvard Gulielmus	Dornavius Caspar
Craanen Theodorus	Dorncreilius Tobias
Cramer Caspar	Drelincurtius Carolus
Craßius Joh. Jacobus	Droke Jacobus
Crato Johannes	Dryander Johannes
Crausius Rudol. Gulielmus	Duretus Ludovicus
Cregatus Joh. Daniel	Dygby Kenelm
Crelius Ludov. Christianus	Eggerdesius Alardus Mauritius
Cremoninius Cæsar	Eichstadius Laurentius
Crolius Osvvaldus	Ellan Nicolaus
Cruce Andreas a	Elsholz Joh. Sigismundus
Crusius David	Entius Georgius
Culmannus Johannes	Esthius Lubertus
Cuno Joh. Clemens	Ettmullerus Michael
Cyprianus Abrahamus	Eustachius Bartholomæus
Dale Antonius von	
Daggelerus Tobias	
Davisonus Gulielmus	
Dekkers Fridericus	

Eyselius Joh. Philippus	Fortis Raymundus Joh.
Eysenbärthus Joh. Michael	Fracus Johannes
Faber Hieronymus	Fragoso Johannes
Fabra Aloysius	Frambesarius Nicol.
Fabri Petrus Johannes	Abrahamus
Fabricius Jacobus	Framboisiere
Fabricius Hildanus Guilielmus	Franchimont Nicolaus
Falcinellus Bernardinus	a Franckenfeldt
Falcon Johannes	Franciscus de Francis
Fanoisius Guido	Johannes
Faschius August. Henricus	Georgius
Fehrius Joh. Michael	Fraundorffer Philippus
Felde Johannes	Freherus Paulus
Feltman Gerhardus	Freitagius Johannes
Ferrandus Johannes	Henricus
Ferrara Gabriel	Frey Janus Cæcilius
Feyneus Franciscus	Friderici Arnoldus
Fidelis Fortunatus	Frigius Petrus Franciscus
Fienus Thomas	Frommanus Joh. Christianus
Filgi Gulielm. Ludovicus	
Finckius Thomas	Fuiren [Georgius
Fioravanti Leonhardus	[Henricus
Flemming Paulus	Funckius Johannes
Flud de Fluctibus Robertus	Früdeck Joh. Ludovicus
Foglia Joh. Antonius	Gabelcoverus V Volfangus
Fonseca [Gabriel de	Gabelchoferus Osvvaldus
[Rodericus a	Gailhardus Johannes
Font Carolus	Gakenholzius Alex.
[Jacobus	Christianus
Fontanus [Nicolaus	Galaratus Joseph
[Gabriel	Galedo Johannes
Formyus Samuel	Galvanus Dominicus
	Gar-

Garnerius Georgius	Grimm Hermannus Ni-
Gaffarus Achilles Pirm.	colaus
Gasto Flaminius	Grøenevelt Johannes
Gaukes Yvo.	Grosseus ceu Chorto-
Gehema Janus Abraha-	lossæus Johannes
mus. a	Grube Hermannus
Geigerus Malachias	Grublmann Joh. Gott-
Geilfusius Bernard. Gui-	fridus.
lelmus	Grulingius Philippus
Geislerus Laurentius	Guarinonius Christo-
Gelmannus Georgius	phorus.
Gendre Antonius le	Guibertus Philippus
Gendron Deshaies	Guillemeau Carolus
Genga Bernhardus	Guldenklee Balthassar
Georgius Matthæus	Timæus a
Gerbezius Marcus	Gutierrez. Joh. Lazarus.
Geyerus Joh. Daniel	Guyard
Gladbachius Joh. Ber-	Hafenrefferus Samuel
nhardus.	Hammen Ludovicus.
Glandorpius Matthias	von
Glaferus Joh. Henricus	Hannemannus Joh. Lu-
Glissonius Franciscus	dovicus
Gnoffelius Andreas	Harderus Joh. Jacobus
Goclenius Rudolphus	Harris Gualterus
Eberardus	Hartmannus Johannes
Goekelius } Jo. Christo-	Harvæus Gulielmus
phorus	Havenreuter Joh. Lu-
Goelicke Andr. Ottomar.	dovicus.
Gourmelin Stephanus	Havers Cloptonus
Graaf Regnerus. de	Hauptmannus Augustus
Grammius Cæso.	Hechstetter Philippus
Greiffens Sebastianus	Heinzius Johannes
Grembs Franciscus O-	Helmont Jo. Bapt. von
svvaldus	Helvetius
Greffer Joseph	Helvvig Johannes
Griffonius Angelus	Henninger Joh. Sigif-
Grimberg Nicolaus	mundus

Heredia Petrus Mi-
chael de

Herlicius David

Herls Cornelius

Hessus { Matthæus
Johannes

Hildebrandus Andreas

Hildanus Fabricius

Hiskia Johannes

Hobokenus Nicolaus

Hoecheſterus Philippus

Hoeferus V Volfangus

{ Mauri-
tius
Lauren-
tius

Hoffmannus { Caspar
Joh. Jaco-
bus

{ Frideri-
cus

Holder Julius

Holtzapffel Martinus

Homborgius Andreas

Hombürgen Anna Eli-
ſabetha

Horiacherus Conradus

Horne Johannes von

Hornſchuchius Hiero-
nymus

Hornungus Johannes

Horſius { Gregorius
Joh. Daniel

Hortensius Martinus

Huberus Rudolphus

Hueta Hieronymus de

Hutter Andreas

Huxholtzius V Volrad.

Jebringius Johannes

Jens Petrus

Jeſſenius a Jeſſen Jo-
hannes

{ Franciſcus

Imperialis { Joh. Bapti-
ſta

Ingolſtetterus Johannes

Joel Franciſcus

Joepſerius Jacob. Joſeph

Jond Philibertus

Jonge James

Jonſtonus Johannes

Joubertus Laurentius

Jungken Joh. Helfricius

Jungermann Ludovicus

Kanoldus Johannes

Keldermann Cornelius

Kellnerus David

Kentia Comitiffa cea
von Kent

Keplerus Ludovicus

Kern Johannes Fride-
ricus

Kerkringius Theodorus

Kergerius Martinus

Khunrath Henricus

Kirchmaier Johannes

{ Petrus
Kirſtenius { Joh. Geor-
gius

Knaut Chriſtophorus

Kneufelius Chriſt. Fri-
dericus

Knoblochius Johannes

Koenerding Adrianus

Kru-

Krugius Theodor. Chri-
 stophorus
 Hozack { Joh. Sophro-
 nius
 Christopho-
 rus
 Languedelius Bernhar-
 dus
 Lange { Johannes
 Christianus
 Lanzonus Joseph
 Lanzverde Joh. Bapti-
 sta
 { Henricus
 Lavaterus { Joh. Rudol-
 phus
 Laugier Joh. Franciscus
 Launay Carolus Dio-
 nysius
 { Petrus
 Laurembergius { Gu-
 lielmus
 Lauterbachius Joseph
 Leaufon
 Lechelius Johannes
 Leeuvenhoeckius An-
 tonius von
 Lemnius Levinus
 Licetus Fortunius
 Liddelius Duncanus
 Lilius Franciscus
 Lequin
 Linden Joh. Antonides
 von der
 Linschoten Joh. Hugo a
 Lister Martinus
 Lobelius Matthias

Lofelius Johannes
 Losen Laurentius
 Loth Georgius
 Lothichius Joh. Petrus
 Lovverus Richardus
 Lovvthorpius Johannes
 Lucius Cyriacus
 Lusitanus Zacutus
 Lyser Michael
 Macasius Joh. Georgius
 Magati Joh. Baptista
 Magister Rudolphus
 Megnenus Joh. Christo-
 phorus
 Magni Petrus Paulus
 Majoris Joh. Daniel
 Malphi Tiberius
 Malpighius Marcellus
 Mandelsloh Joh. Alber-
 tus a
 Mappus Marcus
 Marchetti Petrus de
 Marggravius Georgius
 Mariotti Carolus
 Marius sive Meierus Ge-
 orgius
 Maroja Cyprianus de
 Maroldi Ortolphus
 Marquardus Johannes
 Marque Jacobus de
 Marten Johannes
 Martinus Henricus
 Martinus Valerius
 Martius Johannes
 Mastiero Philippus
 Masini Johannes Anto-
 nius

Mettenburgius Johann.
Maubeus

Maurerus Christophorus

Mauriceau Franciscus

Mayerne Theodorus

Mayovv Johannes

Meber Joh. Cornelius

Meckren Job

Meibomius { Henricus
Daniel
Henricus
Joh. Hen-
ricus

Meichsnerus Esajas

Meissonierus Lazarus

Menjocius Antonius

Menzelius Philippus

Mercatus Ludovicus

Mercier Petrus le

Mercklinus Georg. Abra-
ham

Mercutius Scipio

Mercurialis Hierony-
mus

Mermannus Thomas

Mery Johannes

Metius Adrianus

Mezgerus Ge. Balthasar

Michael Joannes

Michaelspacherus Ste-
phanus

Milius Joh. Daniel

Millus Julius

Mindererus Raymun-
dus

Mitti Paulus

Moccius Jacobus

Meara { Dermutius de
Edmundus

Moebius Gottofridus

Moellenbrocius Vale-
rius Andreas

Mollerus Jacobus

Moenichen Henricus a

Molinetti Antonius

Molerus Johannes

Monavius Fridericus

Monnier L.

Montalbanus Ovidius

Montaltus Philothæus

Montanus Johannes

Montecalvus Vincentius

Moor Bartholomæus

Morreau Renatus

Morellus { Johannes
Petrus

Morinus Joh. Baptista

Morison Robertus

Morley Carol. Ludovi-
cus

Mortius Jacobus

Moxius Joh. Raphael

Moyle Jonn.

Mukerus { Philippus
Nicolaus
Theophilus
Gulielmus
Henricus

Mundinius Mundinus

Mundus seu Mundy

Henricus

Munnicks Johannes

Munsterus Johannes

Muraltus Johannes

Mg-

Mulggrave
 Mustanus Carolus
 Muys Johannes
 Mye Fridericus von der
 Mylus Joh. Daniel
 Narvaticus Matthias
 Neretius Neretus
 Neucranzius Paulus
 Nicoli Nicolas
 Nicotius Jacobus
 Nierembergii Joh. Eu-
 sebius
 Noslerus Georgius
 Novarinus Antonius
 Nymannus Gregorius
 Occhi Hieronymus
 Occo Adolphus
 Oethæus Jacobus
 Olearius Adam
 Ortlorius Joh. Fridericus
 Overkampius Heide-
 reich
 Pacius Fabius
 Palma Georgius
 Pancovius Thomas
 Pandolphinus Joseph
 Panfa Martinus
 Papinius Nicolaus
 Parma Hippolitus
 Patin { Guidus
 { Carolus
 Pauli Simeon
 Pavv Petrus
 Peccetius Franciscus
 Pechlinus Jo. Nicolaus
 Pecquetus Johannes
 Pellicia Paulus

Pelshoferus Joh. Geor-
 gius
 Perdulcis Bartholamæus
 Peredæ Petrus Paulus
 Perizonius Christianus
 Perla Franciscus
 Petermannus Andreas
 Petit Petrus
 Petrejus Simon
 Petrus Henricus
 Peu
 Peucerus Caspar
 Pfisterus Alexander
 Pfizer Jo. Nicolaus
 Pictorinus Georgius
 Piens Franciscus
 Pietragrossa Bartholo-
 mæus
 Pietreus Nicolas
 Pigræus Petrus
 Pincier Johannes
 Pintus Callinus
 Pipernus Petrus
 Pira Hieronymus de
 { Fœlix
 Platerus { Thomas
 { Andreas
 Plempius Vopiscus For-
 tunatus
 Plazzonus Franciscus
 Ponce Antonius
 Portal Paulus
 { Joah. David
 Portius { Lucas Anto-
 { nius
 Posthius Johannes
 Potterius Petrus

Prævotius Johannes	Rolfincius Guernicus
Prat Ellis	Romani five de Roma
Purmannus Matth. Got-	Franciscus
tofridus	Romanus Gulielmus
Puteanus Gulielmus	Ronſſeus Balduinus
Queccius Gregorius	Roonhuysen Henricus
Quentin Juſt. Ott.	Rosa Andreas
Quentzius Petrus	Rota Michael Angelus
Ragazzina Franc. Ferdi-	Roth Melchior
nandus	Rubeus Hieronymus
Rajus Johannes	Rudius Eustachius
Ramelovius Matthæus	Rudolphus Joh. Gabriel
Ranchinus Franciscus	Ruff Petrus
Raynaud	Rulandus { Pater
Read Vilhelmus	Martinus { Filius
Rebeque Joh. Conſtan-	Rumbaumius Chriſto-
tius	phorus
Regius Henricus	Sacci Pompejus
Rehefeldius Johannes	Sachſius a Levvenheim
Rejes Caſpar a	Philippus Jacobus
Reineſius Thomas	Salmuthus Philippus
Renodæus Johannes	Salvi Tanuccius
Reſtaurant Raymundus	Salvius Johannes
Rex Sigismundus	Salzmannus Joh. Ru-
Reyſinghius Joh. Hen-	dolph.
nemannus	Sanctorius Sanctorius
Rheinanus Johannes	Sandriſ Jacob. de
Rhinus V Vilhelmus	Santinellus Bartholo-
Rhodius Joannes	mæus
Rhumelius Joh. Conra-	Santorellus Antonius
dus	Sattori Petrus
Rhunenburgh B. I.	Sacerides Gellius
Riedlinus Vitus	Saviard
Riverius Lazarus	Saxonia Hercules de
Rivinus olim Bachmann	Sbaralæa Joh. Hierony-
Andreas	mus
Rolandus Johannes	Scala Dominicus de la
	Schef-

Schefferus	[Carolus	Sennertus Daniel
	[Sebastianus	Serrier Theophilus
Schelhammerus	Guntherus	[Marc. Aure-
		Severinus
Sckenkius	[Pater	[lius
Johannes	[Filius	[Petrus
Scherbius	Philippus	Sigemundia Justina
Scheurl	Christoph. Theo-	Siglizius Johannes
	philus	Silvaticus Benedictus
Schiffman	Joseph	Sinibaldus Joh. Benedi-
		ctus
Schilling.	[Sigismundus	Slevogtius Joh. Hadria-
	[Andreas	nus
Schirlæus	Thomas	Smerius Henricus
Schizius	Melchior	Solingen Cornelius
Schmidt	[Johannes	Sommers Joh. Georgius
	[Joseph	Sorbait Paulus de
Schneiderus	Conrad. Vi-	Sparr Joh. Caspar
	ctor	Spead Johannes
Schnitzerus	Sigismun-	Spehrerius Petrus
	us	[Paulus Got-
Schneidermannus	Joh.	Sperlingius
Scholtizius	Laurentius	[tofridus
Schoockius	Martinus	[Johannes
Schorerus	Christophorus	Spigellius Adrianus
Schoute	VValtherus	Sponius Jacobus
Schrarie	Fridericus	Stanerus Johannes
Schretæ	Henricus	Stalpartius Cornelius
Schröderus	Johannes	Steeghus Gottofridus
Schurzens	Tobias	Steinius Gottofridus
Schyvartzens	Joh. Cas-	Sterre D. L.
	par	Sthenonius Nicolaus
Schyvenkfeld	Caspar	Stiglerus Samuel
Sculterus	Johannes	Stiffer Joh. Andreas
Sebitius	Melchior	Stockmannus Johannes
Sendivogius	Michael	Strausius Laurentius
Segerus	Georgius	Stupanus [Joh. Nicolaus
Seidelius	Jacobus	[Emanuel
		Stylle Petrus von der
		Sue

Suevus Bernardus
 Sulzberger Sigism. Ru-
 pertus
 Suterus Jacobus
 Svvalva Bernardus
 Svamerdamius Johan-
 nes
 Tachenius Otto
 Tanckius Joachimus
 Tandlerus Tobias
 Tanstetterus Georg. Col-
 limitius
 Tappius Jacobus
 Taranta Valescus de
 Tassins Leonhardus
 Tencke H.
 Terentius Johannes
 Terenzonus Joh. Anto-
 nius
 Testi Ludovicus
 Thevenin Franciscus
 Thevenot Michael Mel-
 chisadeck
 Thile Johannes
 Thrustonius Malachias
 Tibaut Petrus
 Tidicæus Franciscus
 Tilesius Bernardus
 Tilingius [Johannes
 Matthias
 Timæus Balhassar
 Tinctorius Christopho-
 rus
 Tirelli Mauritius
 Tietlmann Johannes
 Tolet Franciscus
 Tonerus vel Tovvne-

rus Augustinus
 Tozzi Lucas
 Torius Raphael
 Traffelman Joh: Frid:
 Tulpius Nicolaus
 Turquetus Theodorus
 Turnerus
 Valsalva Antonius Ma-
 ria
 Varus Antonius
 Velthufius Lambertus
 Verandæus Johannes
 Verbesius David
 Verduinus Petrus Adria-
 nus
 Vernerus Abraham
 Verpoortenus Joh. Gu-
 lielmus
 Verzascha Bernardus
 Veslingius Johannes
 Vestus Justus
 Vettori Benedictus
 Uffenbachius Petrus
 Ulmus Franciscus
 Viardel Cosimus
 Vieuffens Raymundus
 Vidi Vidius
 Vigierius Johannes
 Viscerus Johannes
 Vimpineus Joh. Albertus
 Viviani Vivianus
 Untzer Matthias
 Vœlters Christophorus
 Voglerus Valentinus
 Henricus
 Volckammerus Johan.
 Georgius

Volgnadus Henricus	VVeypert Joh. Francis-
Voorde Cornelius von	cus
der	VVhitackerus Tobias
Vorstius { Ælias Ever-	VViel Stalpartius von
hardus	der
{ Adolphus	VVillifus Thomas
Vroling Abraham. Len.	VVirdig Sebastianus
{ Rudol.	VVifemannus Richardus
{ Christia-	VVolfius Johannes
VVagnerus { nus	VVormius Olaus
{ Joh. Ger-	Zacchias Paulus
{ hardus	Zacutus Lusitanus
VVahrmannd	Zapata Joh. Baptista
VVarionus Thomas	Zarotti Cæsar
VValdschmiedt Joh. Ja-	Zavona Maximil.
cobus	Zecchius Johannes
VVeckerus Joh. Jacob	Zeidlerus Johannes
VVedelius Ge. VVolf-	Zeifius Matthæus
gangus	Zellerus Johannes
VVeicardus Arnoldus	Zittmannus Joh. Fride-
VVeidnerus Johannes	ricus
{ Gottofridus	Zobelius
VVelschius { Georg. Hie-	Zvvingerus Jacobus
{ ronymus	Zvvolfferus Johannes
VVestphals El.	Zypæus Franciscus

XVIII. Seculo, cujus hoc anno 1762. jam prætergressi sumus medietatem, quæ ad Medicinam spectant Scientifica methodo pertractari orsa sunt, quia novæ Scientiæ, a Cartesio magni ingenii Viro vehementer promotæ, quæ Algebra dicitur, præsidio, cum Mechanica nova additamenta, majoremque perspicuitatem, & nitorem suscepisset, hominibus datum est, ut per singulas Physices partes speditius altiusque penetrare possent. Hac vero prælucente face, quæque jam eximius Alphonsus Borellus mox præterito seculo feliciter ausus

ausus erat suppetias ferente haud difficile, fuit ut quid scitu, & quæsitu dignius esset in humani corporis compage, ejusque partium muneribus ad valetudinem servandam, vel hac nutante ad morbos gignendos perspiceretur. Quare ab initio usque in Anglia Pitcarnius, Freindius, & Keillius, in Italia Bellinus, & Baglivus, apud Helvetios Bernoullii fratres, quorum meditationibus plurimum usus est Michelottus, & in Belgio celebratissimus Boerhaavius œconomix animalis causas, & rationes, morborum Theorias, remediorumque actiones, ut ad simpliciora capita redigerent, & ad solidum judicium, geometrarum more demonstrationibus exornatis, exigent, totis viribus annexi sunt, feliciterque etiam rem ad majorem in dies suscipiendam perfectionem idoneam reddidere. Huic sane Theoriæ Medicæ in Scientiam adstructioni non parum opitulata est Anatomes, quæ hoc ipso seculo mirum in modum exculta jam omne, cujus capax est, perfectionis culmen tetigisse videtur, & in qua nisi parvi momenti aliqua adhuc desiderari possunt. Morborum causis per Anatomicas, mechanicasque rationes explicatis, remediorumque actione per chimica physicaque experimenta perspectis, etiam Praxis modum exinde recepit, quæ rationalis methodi beneficiis decorata cognovit, quæ diligenter observari, quæve perfunctorie tantum, & quæ demum tuto negligi mœrerentur. Eidem innotuit etiam nil omnino proficere, quod præteritis temporibus ex Artis quasi præcepto usqueveniebat, observationes indiscriminatim congerere, monitus, cautionesque consarcinare, quæ natura sua conjuncta sunt, & nisi unum idemque significant, importuna diligentia distinguere, vel contra unum reputare, quod reapse multiplex est, & utiliter semper distinctum percipitur, &

doce-

docetur . Hujusmodi errores, qui per exercitium Medicinæ nisi crebro nimis comittendi sese offerunt: a sana Theoria perbelle expunguntur, quod præ omnibus incomparabilis Boerhaavius, ejusque solertissimus, doctissimusq; discipulus, & Commentator D. Van schvieten S. R. J. M. Archiater, & Consiliarius apertissime evincunt . His deliberatis quoad Medicinæ progressus in hoc seculo, tempus est, ut Elenctum plerorumque Scriptorum huc spectantium juxta nobis constitutam methodum subjiciamus.

Adolphus Christ. Michael	Barbeyrac
Aird Jacobus	Barchusen Joh. Conradus
Alberizzi Petrus Joseph	Barnerus Jacobus
Alberti Michael	Baroy Hyacinthus Theodorus
Alhifius Thomas	Barrere
Allen Johannes	Barry Odoardus
Alrutz Joh. VV.	Bassius Henricus
Amand Petrus	Baumlers Gottofridus Samuel
Amiand Claudius	Bautzmannus Jo. Christophorus
Andry Nicolaus	Bayle Franciscus
Anel Dominicus	Bazzicalue Ascanius Maria
Armstrong Joh.	Beck Andreas
Astruc Johannes	Joh. Conradus
Atyvel Joseph	Beckerus Joh. Joachimus
Bacchettoni Hieronim. Leopoldus	Joh. Frideric.
Baget Johannes	Belchier Joannes
Baglivus Georgius	Benetti Jo. Dominicus
Bajerus Joh. Jacobus	c. Re-
Balderston G.	
Balgoy Carolus	
Banier Henricus	
Barbette Gregorius	

	Rugerus Aug-	Bohnius Johannes
	gustus	Bona Johannes de la
Behrens	Georgius	Borners Nicolaus
	Henricus	Boschetti Bartholomæus
	Conradus	Bosius Gaspar
	Bertoldus	Boulduc
Bellini Laurentius		Bovart
Belloste Augustinus		Boulton Richardus
Benevoli Antonius		Braken Henricus
Berdorus		Brandius Michael
Benini Vincentius		Braunerus Joh. Jacobus
Bergerius Joh. Georgius		Bremond
Bergier Antonius		Breynius Joh. Philippus
Bernerus Gottlieb E-		Brindley J.
phraim		Brinius Joh. Thomas
Bernoullius	Nicolaus	Brisseau D.
	Johannes	Broen Johannes
Bertini		Brogiani Joh. Domini-
Beverlinus Rudolph.		cus
Philippus		Brovvn
Bianchi Joh. Baptst.		Tomas
Bianchini Joh. Fortuna-		Andreas
tus		Bruhier
Bidloo Gottofridus		Brunn Joh. Conradus
Rimus Paulus Hiero-		Bubben Johannes
nymus		Buchnerus And. Elias
Blackstonius Johannes		Budæus Gottlieb
	Petrus	Burchardus Christ. Mar-
Blanchus	Joh. ceu Ja-	tinus
	nus Plancus	Burgmannus Petrus
Blondelus		Christophorus
Blondet		Burlet
Boccaccini Antonius		Burnetus Thomas
Bodley		Barton Gulielmus
Boe Franc. Sylvius de le		Bussiere
Boerhaave Hermannus		Butini Joh. Antonius
Boettcherus Joh. Gottlieb		Butter Alexander
		Calder Jacobus

Calmette Franciscus	Commelinus Caspar
Camerarius Rudolph.	Contulus Joh. Baptista
Jacobus	Cornacchinus Petrus
Cantarini Angelus	Corte Bartholomæus
Carl P. S.	Coschvitz Georg: Da-
Carli Joh. Hieronymus	niel
Carlius Joh. Samuel	Couper
Cartheuser Joh. Frideri-	Crannen Theodorus
cus	Cranz Henricus Nepo-
Castro Jacobus a	mucænus
Cat Nicolas le	Crelius Fridericus
Cattanius Nicol. Anto-	Crescentius Nicolaus
nus	Cron Ludovicus a
Cestoni Hiacynthus	Dale Thomas
Chabert	Davies Evan
Chapmans Edmundus	Deguerus Jo. Hartmanus
Charras Moyfes	Deidier Antonius
Chavalier Jo. Damianus	Delius
Cherardi Robertus	Democritus Christianus
Chefeldenus Gulielmus	Denys Jacobus
Chefneau Nicolaus	Depre Joh. Fridericus
Chiarana Marianus	Derham [Gulielmus
Chicoyneau Franciscus	[Thomas
Chirac Petrus	Default
Chomel Joh. Bapt. Lu-	Dethardingius Georgius
dovicus	Deventer Henricus
Cirillus Nicolas	Dibon
Clacius Georgius	Dillenius Jacobus
Clauderus Christ. Erne-	Dionis Petrus
stus	Dodart
Clericus Daniel	Dodd Petrus
Cocchi Antonius	Dolæus Johannes
Cockburnus Gulielmus	Douglafs [Jacobus
Cohausen Joseph Hen-	[Johannes
ricus	Dran Henric. Franciscus
Color Franciscus	le
Comincioli Jacobus	Drelincurtius Carolus
	Drum-

Drummond Johannes	Friedius Joh. Jacob
Dube	Frings P.
Dubon Claudius	Fritschius Joh. Christo-
Dumoulin	phorus
Dundas Johannes	Frobenius Sigism. Au-
Eames Johannes	gustus
Eckbardus	Fromond Andreas
Eems Jacobus van	Frichsens Johannes
Eggerdesius Alard. Mau-	Furstenau Joh. Herman-
ritius	nus a
Ellerus Joh. Theodorus	Gandini Carolus
Erndelius C. H.	Garengeot Jacob. Crois-
Erfeldt Joh. Franciscus	sant
Eschenbach Christ. Fri-	Genga Bernardinus
dericus	Genorini Michael
Etmullerus Michael	Geofroys Stephanus
Eucherius Camillus	Geraudl
Fabricius Joh. Albertus	Gherli Fulvius
Falconeti Camillus	Ghisi Marting
Fantoni Joh. Baptista	Gianella Carolus
Fauchard Petrus	Gibbs
Faudacq C. F.	Gibson Joseph
Favelet Joh. Franciscus	Giffard's Gulielmus
Faye	Gilcrist Ebenezer
Febrius Joh. Henricus	Gismondi di Gubbio Jo.
Felici Antonius	Baptista
Fenent	[Cornelius Carol. Fri- dericus Joh. Adol- phus
Ferrem	
Fickius Joh. Jacobus	
Fischer Johannes	Glabachius
Fizes Antonius	Gœlike Andreas Otto-
Foster VV.	manus
Fracassari	Gohlius Joh. Daniel
Fracassini Antonius	Goolden Samuel
Franckenav Geor. Fran-	Gortter [Johannes
cus de	David
Freind Joannes	

Gottlieb Johannes	Hecquet Johann. Dom.
Govey Aloysius Leger de	Heisterus Laurentius
Gouland	Helvetius Joh. Claudius
Gourraigne Hugo	Adrianus
Grambs Joh. Jacobus	Hensingius Joh. Tho-
Graniti Nicolaus	mas
Grashuis Johannes	Hermannus Paulus
Gratiani Johannes	Herningerus Joh. Sigis-
Guifard Petrus	mundus
Gulielmini Dominicus	Hesselius Johannes
Guntz Justus Gottofri-	Heucherus Joh. Henri-
dus	cus
Gurischius Martinus	Hilscherus Simon Pau-
Gurvaigne Ugo	lus
Haenelius Christ. Fride-	Hoffmannus [Daniel
ricus	Frideric]
Haen Antonius von	Homberg
Haguenot Henricus	Hoppius Elias
Hahn Johann. Gottofri-	Horn Johannes von
dus.	Hovius Jacobus
Hales Stephanus	Houston Robertus
Haller Albertus	Hubner Joh. Christ.
Halin Joh. Gottofridus	Humelius Johannes
Hamberger Georg. Er-	Hunauld
hardus	Jackson Joseph
Hamel du	James
Hampe Joh. Henricus	Jamjeson Johannes
Hancke Dan. Abraham	Jantkuis Joh. Jacobus
Hanckevitz Ambrosius	Imbert
Gottefridus	Innes Johannes
Harris Gualterus	Interlenghi Flaminius
Hartlei David	Junckens Joh. Helfr-
Hartranffius Joh. Va-	tius
lentinus	Junckerus Johannes
Hasenohrl Joh. Georgius	Junius Hadrianus
Hebenstreitius Joh. Er-	Jurinus Jacobus
nestus	Jussieu

Kaltschmid Carolus Fredericus	Lanzani Nicolaus
Keckius Egidius Craton	Lanzoni Joseph
Keils Christ. Henricus	Lapus { Petrus Paulus
Keill Jacobus	{ Joh. Hieronymus
Kennedy { Johannes	Lavagnoli Bartholomæus
{ Petrus	Lazeme Jacobus
Kesslerus Carolus Gottlieb	Leale Leal
Kestner Christ. VVilhelmus	Leibnitzius Guliel. Gottfr.
Klaunigius Gottofridus	Leinckerus Joh. Sigismundus
{ Jacobus	Lemeryus { Nicolaus
Kleinids { Ludov. Gottofridus	{ & ejus fil.
Knirs Lud. VVilhelmus de	Lentilius Rosinus
Koch Daniel	Leopold Emanuel
Konig Emanuel	Leporinus Christ. Polycarpus
Kramers Geor. Henricus	Levret
Krautermann Valentinus	Levvis VV.
Kruger { Bertholdus	Lichtmann Joh. Michael
{ Joh. Gottlieb	Lindestolpe Johannes
Kuchlerus Joh. Caspar	Linnaeus Carolus
Kulmus Joh. Adam	Linsingh Petrus
Kupferschmidt Johannes	Lister Martinus
Lacerme Jacobus	Littre
Laing David	Lizzari Antonius
Lambrech Amos	Lobb Theophilus
Lamorier	Locherus Emanuel Christianus
Lancisius Joh. Maria	Loescherus Martin. Gottlieb
Langhans Bernensir Daniel	Lœvv Joh. Franciscus
Langguth Georg. Augustus	Lommius Jodocus
	Lovver Richardus
	Lovvis Robertus

Eudolfs Hieronymus
 Ludovici Daniel
 Lupius Jac. Antonius
 Lysthenius Gottlieb VVi-
 pert.
 Macgill N.
 Machin Johannes
 Macoppe Alexander
 Knips
 Madden Thomas
 Maffei Richard. Midle-
 ron
 Malœt
 Mai
 Maitlands
 Maitre Jean Antonius
 Malmedic Joh. Baptista
 de
 Malovin
 Manetti Xaverius
 Mangetti Joh. Jacobus
 Manning Matthæus
 Marcot
 Marche Madame de la
 Marchant
 Marefcotti Franciscus
 Marini Hieronymus
 Martinus [Lucas
 Georgius
 Martyn Johannes
 Maserius Theodorus
 Maternus Georg. Chri-
 stianus
 Matthæus Georgius
 Mauchart Joh. David
 Maurer Johann. Geor-
 gius

Mazini Joh. Baptista
 Mazzuoli Franc. Maria
 Mead Richardus
 Melli Sebastianus
 Mery Joannes
 Mesnard Jacobus
 Metrie
 Meyer Hermann. Pe-
 trus
 Meyfeldus Joh. Gotto-
 fridus
 Michelottus Antonius
 Michles
 Middleton Johannes
 Migliavacca Joseph
 Milligen G.
 Mittermayer Johannes
 Moebius Joh. Fridericus
 Molieres
 Molinelli Petrus Paulus
 Momber Antonius
 Monro Alexander
 Monticelli Joseph
 Morand
 Morandi Morandus
 Morasch Joh. Adam
 Moreali Joh. Baptista
 Margagnus Joh. Bapti-
 sta
 Morin
 Mortimer Cromyvellus
 Morton Richardus
 Motte Gulielm. Mau-
 quest de la
 Movvat Jacobus
 Mulichius Joh. Fride-
 ricus

Mullerus	Joh. Mat-	Pascoli Alexander
	thæus	Pasta Andreas
	Gottofrid.	Paton Petrus
	Gulielmus	Patrick Murray
Munnicks	Johannes	Patuna Nicolaus
Muratori	Ludovic. An-	Pauli Petrus
	tonius	Pelissier Gulielmus
Musitanus	Carolus	Pemberton Henricus
Mustigerus	Joh. Caspar	Petermannus Andreas
Muys	VVyerus (Gu-	Petit
	lielmus	Petrioli Gajetanus
Nanoni	Angelus	Pezoldus Caspar
Nebelius	Daniel	Pisani Angelus
Nenter	Georg. Philip-	Pisoni [Homobonus
	pus	Carolus
Neruccius	Octavius	Pisteris Christ. Frideri-
Nicols	Franciscus	cus
Nicolai	Henricus Al-	Pitearnius Archibaldus
	bertus	Placentinus Jacobus
Nidell	Jacobus	Platner Joh. Zaccharia
Nievventit	Bernhardus	Plummer Andreas
Nigrifolius	Franciscus	Pohlius Joh. Christia-
	Maria	nus
Nouguez	Joseph	Porta Alundius Aloy-
Nolet	Joseph	fius
Norren	Erh.	Porter Robertus
Oeder	Christianus	Porterfield Gulielmus
Oehme	Joh. Augustus	Portius Lucas Antonius
Orteschi	Petrus	Pott Joh. Henricus
Pacchioni	Antonius	Poupart
Pafin	Johannes	Pozzi Joseph
Paisley	Johannes	Preusius Maximilianus
Paitonus	Joh. Baptista	Pringle [Johannes
Palfin	Johannes	Franciscus
Parrot	VVolfang. Geor-	Proebisch
	gius	Pujati Joseph. Antonius
Parson	Johannes	Pye Georgius

Quadrius Joseph Ma-
ria

Quesnay Franciscus
Ramazzini Bernardi-
nus

Ramby Joannes

Rand Jacobus

Redi Franciscus

Reinell

Reiffens Joh. Caspar

Richa Carolus

Rideux Petrus

Riedlinus Vitus

Righellini Janus

Ridley Henricus

Robergius Laurentius

Robinson Nicolas

Roncali Franciscus

Rocca Joseph Maria

Roseen Nicolaus

Rost Joh. Carolus

Rothens Joh. Philippus

Rotundis Petrus de

Roffetti Blasius

Rotarius Sebastianus

Rouhault Petrus Simon

Ruyschius Fridericus

Ruitty Johannes

Ruleau Johannes

Sancaffani Dionysius
Andreas

Sanden Henricus von

Santangeli Antonius

Hiacynthus

Santorini Joh. Domini-
cus

Sauvages Franciscus de

Scardona Joh. Franci-
scus

Schaarschmidt Augu-
stus

Schacherus Polyc. Gott-
lieb

Schacht Johannes

Schabinger David Chri-
stophorus

Scheuchzerus Joh. Ja-
cobus

Schmidius { Andreas
Christo-
phorus

{ Henricus
Victor

Schobingerus Joh. Cas-
par

Schomberg Rodulphus

Schrarie Christophorus

{ Joh. Fride-
ricus

Schreiber { Samuel
Gottlieb

Schuckmann Joh. Hen-
ricus

Schvenke

Schulzius Joh. Henricus

Schurigius Martinus

Seroeckius Lucas

Senac

Senes

Sermes Johannes

Severinus Mar. Aure-
lius

Sguarius Eusebius

Sharo Petrus

Short

Short Thomas	Teichmeyerus Herman.
Sidobre Antonius	Fridericus
Siegfried Bernhardus	Tellier le
Sigismundus Johannes	Thievillier Joh. Ludo-
Signorotti Franciscus	vicus.
Siguart Georgius Fri-	Timme Johannes
dericus	Tissot S. A. D.
Silva Joh. Baptista	Thomson Al.
Simson Thomas	Torti Franciscus
Sinclair Andreas	Tortora Ludovicus
Sipton Johannes	Tournefort Joseph Pit-
Sloane Hans ceu Johan-	ton
nes	Tosi Simeon
Solanus Franciscus	Tralles Balthassar Lu-
Sprengellius Conradus	dovicus
Sproegellius Deterich	Trevv Christ. Jacobus
Stahlius Georg. Erne-	Trillerus Daniel V Vil-
stus	helmus
Stedman Johannes	Tronchinus
Stenzelius Christ. Got-	Turner Daniel
tefridus	Valcarenghi Paulus
Stephens Mademoiselle	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 3em; vertical-align: middle; margin-right: 5px;">{</div> <div> Michael Bernhard. Christopho- rus Ber- nhardus </div> </div>
Stoer Gerch.	
Storchius Johannes a-	
lias Pelasgus	Vallisnerius Antonius
Storeck Antonius	Vandelli Dominicus
Stochius Henric. Sigis-	Vaterus Adrianus
mundus	Veinhart Ferdinand.
Stuart	Carolus
	Verbrugs Johannes
Syvieten Gerardus van	Vercellonus Jacobus
Sydenham Thomas	Verdier
Tabarranus Petrus	Verdries Joh. Melchior
Taboris Gerardus	Verduc Joh. Baptista
Tavury	Verheyenus Philippus
Taylor Johannes	Ver-

Verna Joh. Baptista	VVeisbachius
Verney Joseph Guic- ciardus du	VVepferus Joh. Jaco- bus
Vespa Joseph	VVerensfeldius Conra- dus
Viardel Cosimus	VVerlhof Paulus Gott- lieb
Vilars Elias-Col-de	VVesthoven Herm.
Vignon	VVernerus Engelber- tus de
Vincenti Dominicus	VWhite
Voetius Joh. Eusebius	VVidemannia Barbara Obstetrix
Vogel Zaccharias	VVidemann Franciscus
Voglius Joh. Hyacin- thus	VVilison Andreas
Vulpini Joh. Baptista	VVillan R.
Uxam	VVillis Thomas
VVabst Christian. Xa- verius	VVifemann Richardus
VVagnerus Georgius	VVinslovs Jacobus Be- nignus
VVagret	VVitte Jacobus
VVahrendoffers Joh. Petrus	VWoodvard Johannes
VValdschmidt Joh. Ja- cobus	VVolhaufe
	VVoolhouse Thomas
	VVolphangus Christia- nus
	VVolpinus Joseph
	VVoyts Joh. Jacobus
	VVreden [Otto Justin. I. E.
	Vves Carolus de Saint
	Zanotti Jacobus Maria
	Zendrini Bernardinus
	Zuingerus Joh. Rudol- phus
	Zulatti Angelus
	Zvvingerus Theodorus Post

Post

Post hanc recentionem si ex librorum copia judicandum esset, cum nulla fere Scientia tot Scriptores per omnia Secula Medicina retulerit, censere deberemus hanc *Artem* perfectionis culmen jam attigisse, ast peritiores merito arbitrantur ab infantia vix egressam esse, plurimæque ad ejus perfectionem, & ad omnem curarum securitatem desiderari. Etenim, quæ ab antiquis usque temporibus utilia magis ac tuta addita sunt, tantà quidem non videntur, ut ad prænotationes, prædictionesque dirigendas satisfaciant, sed simul eadem neque tam exilia, aut inania nanciscimur, ut eorum, qui erroneam, futilemque *Artem* prædicant, possimus assentiri judicio. Quamvis nonnulla per Scriptores occurrant, quæ magni habenda sunt, & *Præceos* fundamenta reputari possunt, quod specimen exhibent eorum, quæ ad curationes sunt magis necessaria; reliqua tamen, quibus magna librorum moles exsurgit, nihil nisi inania verba, aut quæ semel iterum iterumque dicta, & ad ravini usque rescripta sunt, confarcinant, & rescribunt. Cui sane incommodo alterum magnitudinem, & copiam librorum augens accedit, quo sane præterita secula maxime gloriabantur, videlicet, perpetua commentariorum in Antiquos Scriptores, præsertim qui *medicinæ* Parentes reputantur, confectio, cujus utique eruditionis generis tanta est Librorum farrago, ut omnem premodum fidem superet. Neque reticenda est immensa quasi librorum quantitas, quæ ab una in alteram linguam veluti a Græca in Arabam, & Latinam, vel ab Araba, & Syriaca in Latinam, a Latina in Anglicam, Gallicam, Germanicam, & Italicam atque vicissim, ex una in alteram conversione successive producta fuit. Quæ cum ita sint, expulsis commentariis, & ver-

fioni-

sionibus desideramus, ut Arte Critica, quemadmodum in ceteras disciplinas; ita in Medicinam, tandem invec̃ta Scriptores a vitiosis repetitionibus, a plagiis, a falsis observationibus, a inutilibus Theoriis, a temerariis hypothesibus, a paralogismis, ab erroribus, omnibusque aliis irritis, gloriosis, vanis, ampulosisque descriptionibus expungantur, & emendentur. Quo criterio non tantum Scriptorum peritiam, vel fortunam in Praxi, ut dudum feliciter D. Bodley Anglus perfecit, sed eorum Scripta, & Opera a capite ad calcem successive, per omnes sententias, indeque deducta corollaria, in quibus præsertim medicinæ labes sita est, expendere juvabit. Nam quamvis morborum casus exarentur, observationesque instituantur, dicaturque quid in ægris repertum, quidque notatu dignum offensum est, quia ex falsis præconceptis opinionibus pleraque interpretantur, descriptiones veritati minime consentiunt, & corollaria inde deducta, utpote præconceptarum opinionum infirmitate notata, fallacia sunt, & in errorem inducunt.

Quantum ad Theoricam: hoc quidem certum est, Praxim ejus subsidio nunquam defuisse, & antiquissimos usque Scriptores aliquam admisisse, quæ ad ægrorum lectulos specie quadam rationabilitatis, quasi prælucente face, manuduceret. Principio nisi in quibusdam veluti prudentiæ regulis consistebat, inde quædam ornamenta fuscipiens admodum angustis limitibus contraheretur, quos ubi prætergressa est, tam late se explicavit, ut majorem partem occupaverit Librorum, quos Medici a Galeno ad nostra usque tempora confecere; siquidem per observationes, & experimenta in curandis morbis capta, Theoretica quædam naturali rationis lumine primo commenta sunt, unde generale illud fun-

damentum statutum est, cujus in libro de flâ-
tibus meminit Hippocrates, & quo Medicinam
definivit, quod sit ablatio eorum, quæ exce-
dunt, & appositio eorum, quæ deficiunt, adden-
do: qui autem istud optime facere potest, il-
lum optimum Medicum censendum, quantum-
que quis ab hoc præstando deficit, tantum de-
ficere quoque ab ipsa Arte. En quam facilis
hujusmodi Theoria, simulque quam utilis, &
vera! Subsequenti vero ætate valetudinis phæ-
nomenis diligentius perpensis visum fuit, æque
generale principium aliud Theoreticum posse
admitti ex stricto, & laxo desumptum, maxime
quod ex corporibus, quæ pharmacorum titulo
usurpari poterant, perspiciebatur eadem vivi
animalis partibus applicata: modo corroborare,
& contrahere; modo contra lacescere, & infir-
mare. Atque hinc ortam intelligimus Metho-
dicorum Sectam, quorum potiora doctrinæ ca-
pita funditus a Cœlio Aureliano, & bona parte
quadam a Celso referuntur. Sed cum subsidia
hæc nimis arcta ratiocinio visa sint Galeno, to-
tis ingenii nervis annixus est, ut latiora ab
Aristotelis Philosophia depromeret, atque adeo
quatuor elementorum qualitates, similiaque tem-
peramenta primus in Medicæ Theoriæ funda-
mentum accersivit, quæ deinde ab Aetio, Ori-
basio, Paulo, & a præcipuis Italiæ Medicis in-
ter Antiquiores recepta, usque ad Paracelsi, &
Helmontii ætatem pressa pede, & uno ore ab
omnibus amplexa sunt, atque etiam diutius ea-
dem intacta viguissent, ni Paracelsistæ, &
Helmontiani, tum quoque Tachenius, Sylvius
de la Bois, & Cartesiani aliis principiis a Chy-
mia desumptis, aut commentitio jure supposi-
tis antiquam Theoriæ formam in novam mu-
tassent. Nova autem methodus plerisque magis

arridebat, tum quod præter Aristotelica principia, nescio quas vires occultas, quosque universales, & aereos spiritus peculiaribus nominibus insignitos admittebat, tum quod grande sonantium verborum coalitu indoctis suspensionem incutiebat, sub reboante quodam vocabulo arcani aliquid, & mysteriosi latitare. Nec quidem peritiores eam indignabantur, quibus persuasum erat, illo peregrinarum vocum conflictu abdita naturæ, & rerum difficillimarum causas satis revelari. Turpi vero profundissimoque hujusmodi insomnio, sub quo hominum ingenia torpebant, a Mathematices, Mechanices, Physicis experimentalis, & Anatomes studio, circa finem seculi XVII. & initium hujus feliciter ejecto, Theoria Medica ex Anatome, Chymica, & Mechanica solidiorem sibi vindicare cœpit formam, & Naturæ potius leges, causarumque utut latentium phœnomœna, potius quam difficulter admodum, aut vix unquam detegendas ipsas causas inquirere.

Si nuperis annis felicissimos progressus, admirandaque incrementa Theoria accepit, agnoscendum tamen est, & vehementer dolendum Praxim, quæ pars est Medicinæ longe utilissima, haud pari passu processam esse. Nam quamvis singulorum morborum historia, cum diagnosi causarum, Theorica explicatione effectuum, prognosi, & Therapeia, vel Chirurgica curatione habeatur, quod ab innumeris Scriptoribus factum est, adhuc tamen remanet interior eorum notitia cum differentiis, quas cum in diagnosi, & prognosi; tum in curatione, & remediorum delectu inferunt temperamenta ægrotantium, sexus, ætas, anni tempestas, cœli regio, solum, aeris conditio, aquæ, alimenta, mores, similiaque communium, vel

peculiarium causerum virtutem habentia, quibus singulis, & universis satisfieri posse nonnulli arbitrantur per casus medicos a Scriptoribus fide dignissimis relatos: quemadmodum inter antiquissimos apud Hippocratem, Aretæum, Trallianum, Cœlium Aurelianum, Celsum &c., & inter recentiores apud Martianum, Hollerium, Duretum, Ballonium, Jacotium, Montanum, Tulpium, Cratonem, Carolum Pisonem, Alpinum, Hildanum, Forestum, Sennertum, Riverium, Bonetum, Ramazzinum, Malpighium, Baglivum, VVefferum, Sydenhamum, Van Swietenium, Haenium, Morgagnum &c. videre est, quicæteris palmam præripiunt, quibus adde Medicos, qui peculiares ægrorum historias Academiis per Europam institutis misere, quæq; videri possunt in Miscellaneis Naturæ Curiosorum, sive Academiæ Leopoldinæ, & in Actis Uratislavienfibus, Berolinensibus, Helveticis, Haffnicis, Edimburg. &c. Sed falsa conjectura decipimur, & multitudo casuum parum, vel nihil huic scopo inferuit, quousque indigesta, ut nunc videtur, remanet, & nisi prodeat, qui ex eorum collatione, & opportuna distributione utilitatem eruere noscat, nam confusionem parit, & tanquam iners suppellex habenda. Quod si etiam in ordinem reddi contingat, nondum certum est, Praxeos necessitatibus omnibus hinc fieri satis. Alia via igitur adeundum, ut ad iddem incrementum, quo Theorica gaudent, etiam Practica perducantur, qua nulla tutior planiorque sane videtur, quam quæ illustri Boerhaavius felici ausu suscepit. Hujus enim methodum in eo maxime positam percipio, ut ex morborum, & remediorum phœnomenis experientia, & observatione compertis Theorica, & ab his regressu facto, quid inde experiundum in Praxi, & in

in ipsis morbis quid futurum deducat. Ne autem Theoretica aliqua parte nutent, & in hypotheses, in quas prona est, relabatur, proponit semper ut Phenomenorum causæ per mechanicæ leges, & per vitæ principium ex solidis, per physicam experimentalem, per chymicam, & per microscopica documenta ex fluidis eruantur. Sed susceptum ab eo opus, & multo etiam provectum quisnam erit, qui perficiet, & Medicinæ Praxim ad complementum, & perfectionem evehat? Interea quousque tam felix tempus adventet, nobis plurimis Operibus clarissimorum Virorum frui licet, quæ desideratæ perfectionis defectum quoquo modo compensant, & ingeniosioribus aditum expediunt, ut omne, quod arte possibile, & humanæ solertiæ ac prævisioni concessum est, inter curandas ægritudines præstare possint. Quæ in suo genere hucusque meliora, & præstantiora sunt pro Anatomia: VVinslovvii discursus Anatomici, & Heisteri compendium; sed quia necessariæ figuræ in his desiderantur, adire juvabit eas Bartholini, vel VVerheyeni, vel Kulmi, vel Eustachii, vel Couperi, vel Albini; pro Medica Theoria præstant eximii Boerhaave institutiones ex se, vel cum doctiss. Alberti Haller commentariis, tum ejus nomine prælectiones ab eodem editæ, & notis illustratæ, vel ejusdem Haller opusculum prima linea Physiologiæ inscriptum; pro Botanica Raii methodus plantarum, Tournefortii institutiones rei Herbariæ, maxime vero, quæ dudum celeberrimus Carolus Linnæus evulgavit, pro Chimica Rothii chemia germanice scripta, vel ea VVedelii, aut Teichmeyer; sed maxime Boerhaavii, aut Stahl, & Friderici Hoffmanni latine editæ, quæ vero gallicam callent linguam, uti possunt chemia le Febure, Leme-

ry, Senaci, Melovini, sed præsertim Macqueri. Hisce duabus conjunctis facultatibus, ut vegetabilium animalium, & fossilium vires medicæ rite assequantur, adeunda sunt: Macassii promptuarium Materiæ Medicæ, Grube de medicamentis simplicibus cognoscendis, aut Schroederi Pharmacopeia, vel Valentini Museum, vel melius omnium Geofroy materia medica, tum Emanuelis Konig Lexicon, Franci Flora, Hermanni materia medica, Dale Pharmacologia, Lemerii Lexicon simplicium, & VVedelii opus de Medicamentorum facultatibus. Simplicium vero facultatibus medicis, & physicis experimentis, chimicaque analysi perlustratis ad composita dignoscenda egregie faciunt: Pharmacopeia Augustana, Viennensis, Borussica, Londinensis, & Parisiensis tum ea Lemery, & Lexicon Pharmaceutium Jungkeri, atque nostras illud Jo. Baptistæ Capello. Quantum ad doses omnium simplicium, & compositorum unus satis est Paulus Andreas Parentus; & pro formulis conscribendis ad Thyronum usum potissimum commendari mœrentur, quæ in hunc finem scripsere Morellus, VVedelius, Ettmullerus, Eyselius, Fickius, & Junckerus; pro Pathologia, sive morborum notitia secundum mechanica principia ediscenda excellunt: Fridericus Hoffmannus in medicina rationali ex fundamento sensibilitatis partium, Herneſtus Stahlus secundum principium a se admissum, quod anima vivificans corpus animale informet, idemque conservet, & a morbis ac a nece tueatur; atque Hermannus Boerhaave in Aphorismis de cognosc. & curand. morbis juxta simplicius fundamentum chimico-mechanicum, quod vita, & sanitas a physicis mechanicisque Naturæ legibus, omni quacunque hypothesi exulata

lata tantum dependeat, qui aphorismi, ex se omnino aurei sunt; sed nitorem splendoremque adepti sunt mirifice a doctissimi Sereniss. Austriacæ Domus Archiatri, & Consilarii D. Vansvieten commentariis; pro Semiologia, quam plerique cum Pathologia conjungere, seorsim tradita, eminent: VVedelius, Lommius, & Vaterus, pro Therapia, & morborum curatione per pharmaca, præter Hoffmannum, & Boerhaavium faciunt etiam Hippocratis, Sydenhamii, Baglivi, Lancisii, Torti, VVerlosii, & Scardonæ scripta practica, & secundum Stahlîi systema, vel ejus Opera, vel ea quæ Nenterus, Junckerus, & Storchius latine, postremo vero VVeisbachius, & Gohlius Germanice edidere, præ ceteris tandem apprime inserviunt tum nuper evulgati a celeberrimo Haen libri practici tum hæc Jo. Allen Synopsis; pro Chirurgia demum, & morborum curatione manuali operatione instituenda excellent ex Neotericis: Garangeoti operationes Chirurgicæ, Chaberti & Drani observationes, tum Heisterus, la Fayus, sed maxime Platnerus, novissime vero Angelus Nannonus, qui inter Italos nuper eximias chirurgicas operationes, cum casibus oppido rarissimis evulgavit. Ab omnibus hisce Medicinæ partibus ac facultatibus, quæ ad eam spectant, utilioribus ad Praxin notionibus haustis, jam satis peritiæ comparatum est ad morbos feliciter secundum rationem tractandos, & quoscumque eorum bonos, vel malos exitus prænosceudos; sed adhuc magis in Artis usu confirmabitur Medicus, si præter hæc sollicitus erit de iis, quæ raro contingunt, quæque videnda sunt in Observationum Medicarum collectaneis Tulpîi, Caroli Pisoni, Timæia Guldenkleæ, Foresti, & Schen-

III P R Æ F A T I O.

chii, tum in Actis Academiae Curiosorum, Anglicanae, Gallicanae, Petropolitanae, Bononiensis, praesertim in Commercio Litterario universali Norimbergico, & morborum origines ex sectione cadaverum in Sepulchreto Anatomico Boneti, & in Observationibus Medicis celeberrimi Morgagni nuper evulgatis, nec minus diligenter peculiare inquirat Tractatus ad praxin in primis spectantes veluti: is de re cibaria Bruyerini, de studiosorum sanitate curanda Gregorii Horstii, VVedelii, & Pujati; de Artificio, & Monialium, Principumque valetudine tuenda Ramazzini; de Peste, plerorumque Opera, de morbis militum in castris Lucae Antonii Portii, de Atrophia, & Hæctica Christophori Bennet, de Pthysiologia Mortoni, de Arthritidem speciebus Musgraviæ &c. neque prætereant Scriptores de Thermis, & Aquis salubribus balneo, & potu usurpandis, inter quos excellunt: pro fontibus Medicatis Germaniæ Frid. Hoffmannus, pro Thermis Carolinis Bergerus, pro Tœplicesibus Castius, pro Embsesibus VVolfartus, pro VVisbadensibus Melchior, aut Jungkerus, pro Ægranis Langius, pro Schvvalbacesibus Hensingius, pro Pyrmontanis Slarius, & Heisterus, pro Italicis, simulque omnium regionum Andreas Baccius, qui unus pro omnibus valet, quamvis postea doctè egerit de fontibus Mutinensibus Ramazzinus, de Aponensibus Gratianus & Vandelli, de Pisanis Cocchius, de Selteranis D. Venel, &c.

Hisce omnibus facultatibus præstantiorum Scriptorum ope lustratis, melioribusque inde hauritis documentis in memoriæ cancellis alte impressis jam Medicus parum distat a summa in Arte perfectione, & ægrorum lectulis par est utiliora adjumenta præstandi, & famæ suæ va-

leu-

letudinique bono consulendi. Quia ejus officium hic totam non desinit, sed non raro accidit, ut scripto interrogationibus de judicandis, & curandis morbis respondere debeat, aut sententiam dicere coram magistratibus: de occisis, de vulneribus, de veneno, de potentia, & impotentia utriusque sexus, de infanticidio, virginitate, legitimo partus tempore, morbis simulatis, & dissimulatis, aliisque similibus, ideo in utraque parte Auctores comperitos habeat oportet, qui de meliori consultationum forma, & de Forensi Medicina placita tradunt. In priori classe sunt præsertim Raymundi Joh. Fortis, Pompei Sacci, & Friderici Hoffmanni consultationes, sed Italico Idiomate elegantissime scriptæ: ex Joseph del Papa, Francisci Redi, Antonii Vallisnieri, Joh. Mariæ Lanissi, Marcelli Malpighii, aliorumque quorum consilia una cum iis duorum postremo loco memoratorum in duos Tomos collegit Cajetanus Armilleus, & Venetiis 1743. edidit Joseph. Corona. In Medicina demum forensi præstant Teichmejerus, Bohnius, Zittmannus, Valentini scripta forensia, sed præ omnibus Pauli Zacchiaræ quæstiones Medico Legales, Joh. Ernesti Hebenstreit Anthrophologia Forensis, & Michaelis Bernardi Valentini Corpus Juris Medico Legale. Num hisce temporibus nunc memorati Scriptores Thyroni Medico congruant: nullus dubito; num vero omnes necessarii sint: plane non affirmo; cum tamdiu ii primas obtinere possint, donec meliora edituri prodeant. Disciplinæ enim acquirendis præstantia magis, quam copia librorum inservit. Sicut stomachus abundantia ciborum gravatur, & valetudo detrimentum capit; euchymi contra, & pauci adjumento sunt; ita plus unus ex optimis, quam plurimi libri edi-

scendis Artibus faciunt, qui veluti mentis pabulum intellectum rerum ordine informando, & varietate instituendo, pauci & selectiores Disciplinas, multiplices & varii eruditionem adjuvant; immodicus vero eorum usus ut ordini, & perspicuitati officit, ita memoriam tantum, non autem ingenium exercet.



SYLLABUS


Auctorum quorum sententiæ in
hoc opere recensentur.

Ægineta
Anelius
Arbuthnotus
Aretæus
Aurelianus
Baglivus
Ballonius
Barbette
Barbeyracus
Bellini
Bellosius
Blegneus
Boerhaavius
Bonetus
Calmetteus
Cardanus
Cathervoodius
Celsus
Charletonus
Chesneavius
Cheyneus
Chiracus
Cole
Covvardus
Deckerfius
Deodatus
Diemerbroeckius
Donckerfius
Ettmullerus

Fizes
Floyerus
Foresti
Freindius
Fromannus
Fullerus
Gandolphus
Glissonius
Gorter
Hamilton
Harris
Harvæus
Hecquetus
Heister
Helvetius
Helvigius
Hildanus
Hippocrates
Hoffmannus
Hollerius
Jonstonus
Junckerus
Kins-Macoppe
Lancisius
Langius
Lifterus
Littrius
Lommius
Lovyerus


Malpighius
 Mauriceau
 Mayerne
 Mayovvius
 Meadius
 Mercatus
 Mercurialis
 Morgagnus
 Mortonus
 Musggravius
 Petitus
 Pitcarnius
 Placentinus
 Platnerus
 Pujati
 Purcellus
 Purmannus
 Riverius
 Ruyschius
 Sampsonius
 Scardona
 Sckenckius
 Schmitzius
 Schomberg

Schvvietten
 Sennertus
 Septalius
 Sponius
 Stephens
 Storchius
 Sydenhamus
 Sylvius
 Tovvnerus
 Tozzi
 Trallianus
 Trillerus
 Turnerus
 Velschius
 Verduc
 Verna
 Verzascha
 VValdschmid
 VVeinhart
 VVerlhof
 VVillifius
 VVisemannus
 Yves



TYPOGRAPHUS

Lectori .



IN novam tibi Lector humanissime
 Job. Allen Synopseos Medicina
 editionem utpote Operis , quod
 magni semper fecisti, & Praxeos
 usui aptissimam utilissimamque invenisti. Ejus ex-
 ortum & progressum si quæris , nisi testimonium ha-
 bes operis ab omnium Gentium Medicis vehementer
 expetiti, & passim adhibiti. A suo auctore Londi-
 ni anno 1719. primum evulgata, & ab eodem paulo
 post in Patriam linguam conversa , pluries ibi-
 dem vernaculo idiomate, & latine, deinde trien-
 te amplior recusa fuit , quo etiam idiomate in-
 tra paucorum annorum spatium quinques Amste-
 lodami prodiit . Cum ejus utilitas late innotuis-
 set Germaniæ typis semel, iterum, iterumque sub-
 dita

data fuit, & postrema vice anno 1749. Francofurti ad Moeneum, & Lipsiae, inde in Italiam migrata meis praelis evulgari annis 1732. 37. 41. anno vero 1748. cum augmentis in tertia Londinensi, & cum formulis remediorum in quinta Amstelodamensi editione partis atque anno 1754. iterum eadem forma. Cum autem in Gallia vernacula illius Regionis lingua conversa anno 1728 prodierit, nullibi huc usque augmenta, praeter quae ejus Auctor ipsi adjecit, referre visa est, quo mortuo ibidem primum anno 1737. incrementa eoque sibi vindicavit, ut in IV. volumina in 12. tributa prodierit, & anno 1741. alias additiones recipiendo VII. volumina habuerit, quae deinde a D. Boudon aliorum appositione anno 1752. crassiora facta sunt, nec aliunde, quantum scio, majora augmenta suscepit. Hucusque tamen, quae ei adjuncta sunt, cum nisi de recentiorum inventis, & curandis modis decernant, quoniam mihi notum est non recentiorum tantum, sed praesertim Veterum Medicorum, eorumque, qui mediis aevi dici possunt, fusius pleniusque sententias desiderari, propositum habuit in hac nova editione hujusmodi desideria satisfacere, ut qui eodem tenerentur, Omnia, quae apud Antiquos, medios, & neotericos Scri-

Scriptores meliora sunt , facile invenire possent :
 Hoc ubi praestitum fuit duo beneficia synopsis hanc
 simul reddere perspexi : alterum videlicet quo lu-
 culentius morborum natura , & curationum formas
 apud antiquos , recentioresque adhibita aperiren-
 tur ; alterum quo plerique morbi ab Auctore prae-
 rissi noviter inveni , in Praxi animadverten-
 di exhiberentur , quibus alterum etiam adjici po-
 test h. e. expositio methodi nonnullos morbos tra-
 ctandi , quae post meritissimi Auctoris obitum sa-
 gacissimi Medici opportune invenere . Haec ubi tibi
 placebunt , mihi gratum erit , & satis habeam , re-
 terum Vale , & fave .



¹² NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova .

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del *P. F. Serafino Maria Maccarinelli*, Inquisitore Generale del Santo Officio di *Venezia* nel Libro intitolato *Synopsis univ[er]sae Medicinae Practicae Jo: Allen M. D., sive Doctissimorum Virorum de Morbis, eorumque causis, & remediis judicia. Accesserunt nunc demum Veterum ferme omnium, ac Recentiorum quorundam celebriorum sententiae M. S.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Lorenzo Bassaggio* Stampator di *Venezia*, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di *Venezia*, e di *Padova*.

Dat. li 6. Febraro 1760.

- (Angelo Contarini Proc. Rif.
- (Bernardo Nani Rif.
- (Francesco Morosini 2.^o Cav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 77. al Num. 170.

Giacomo Zuccato Segr.

Addi 16. Febraro 1760. M. V.

Registrato in Libro del Magist. Eccel. degli Esec.
contro la Bestemmia.

Gio: Pietro Dolfin Seg.



SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ, &c.



CAPUT PRIMUM.

Sive Fasciculus Morborum primus.

FEBRES IN GENERE.

Ex observatione & inter legendum.

Art. 1.



EBRES (ut recte annotavit clarissimus Sydenhamus) cum Appendicibus suis duas fere tertias partes omnium, quæ sunt morborum, complent; ideoque his exponendis, utpote quæ etiam totis corporibus inhærescunt, merito exordiri statuimus. *Proæmium.*

Art. 2. Febris autem (inquit idem) nihil aliud est, quam *naturæ conamen materiæ morbificæ, corpori valde inimicæ, exterminationem in agri salutem omni ope molientis.* *Febris quid.*

Art. 3. Februm divisio maxime generalis & genuina est in *Essentialem & Symptomaticam.* *Februm divisio.*

A

Art. 4.

Essentialis.

Art. 4. Febris essentialis est cujus causa primaria in ipso sanguine delitescit, a nullo alio morbo solidarum partium originem ducens, aut quocunque modo pendens; atque hæc est *Febris absoluta & proprie dicta*.

Symptomatica.

Art. 5. Febris symptomatrica est febris secundaria, quæ non propriam subsistentiam habet, sed a graviore alicujus partis affectu originem trahit, & frequentissime ab insigni aliqua inflammatione pendet, unde *Febres varia inflammatoria dictæ*.

Essentialis divisio.

Art. 6. Febris essentialis dividitur in Ephemeram, Intermittentem, Continentem & Continuumam.

Ephemera.

Art. 7. Febris omnium mitissima est Febris ephemera, sive diaria, i. e. Febris unius diei; quæ ab insolatu, exercitio nimio, vel aliquo alio accidente externo oritur, & spatio 24. horar. ultro terminari solet. Sola quiete, & in lecto decubitu curatur.

Intermittens.

Art. 8. Huic proximæ sunt Febres intermittentes, scilicet, quotidianæ, tertianæ, quartanæ simplices, tertianæ, quartanæ duplices &c. Hæ more Febris diariæ spatio 24. horarum plus minus pro isthac vice finiuntur; verum pro peculiari illarum genio, singulis, vel alternis diebus, vel quarto quoque die, recrudescere solent.

Continens.

Art. 9. His congener est Febris *συνεχής*, seu continens, quæ quidem est Febris continua, sed non uno tenore pergens; ad plures dies sine *ἀνυπέλα* protenditur, habet tamen sua *remissionis & exacerbationis* tempora, statis, vel incertis periodis se invicem excipientia; *intermissionem* vero nullam habet.

Continua.

Art. 10. Febrium gradus proximus & ultimus est *συνωχός*, sive Febris continua proprie dicta, quæ ab initio ad finem ubique est æquabilis, si-

ne symptomatum exacerbatione & remissione periodica: hujus generis sunt Febres malignæ, Febres pestiléntiales, ipsa pestis, &c.

Sydenhami sententia.

Art. 11. Ille dubio tramite errat, atque incerto ducitur filo, qui in Febrium curatione non continenter ob oculos habet *anni constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo epidemice producendo favet, cæterisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis; hæ autem variæ constitutiones aut habitudines ab occulta & inexplicabili quadam aeris alteratione pendent, quæ proprias ac sibi peculiâres Febres producant, quæ *stationaria* nobis audiunt.

Ratio habenda est anni constitutionis.

Art. 12. In novis Febribus cunctandum est paulisper; & ad magna remedia non nisi pede tardo procedendum; interim morbi genium ac morem diligenter pensitando indicationes præsertim a *ludentibus & juvantibus* sumendæ sunt; neque pudet fateri me non semel in curandis Febribus, ubi nondum constaret, quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & ægro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportunius confodere valeam, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se typum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda. „ Non enim levis est „ consolatio viro probo in rebus dubiis, facile „ que errori obnoxiiis se saltem inculpatum tue „ ri, si se minus utilem præbere nequeat. „

Et in nova Febris ingressu paulisper cunctandum est.

Art. 13. „ Calidum solum non est Febris causa, „ sã, (inquit Hippocrates de vet. medic.) sed ea „ est: calidum & amarum simul; calidum & aci- „ dum, calidum & falsum, aliaque innumera. „

Febris causa.

*Evenire
potest in
corpori-
bus sa-
nis.*

Ex frequenti etiam observatione compertum est Febrem in *corporibus sanis* evenire posse, in quibus nullus apparatus morbificus, vel quoad plethoram, vel cacochymiam, &c. occasionem subministraret; nihilominus hujusmodi homines præcedente insigni aliqua aeris, victus, &c. rerum non naturalium, mutatione, Febre corripiuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverit.

*Indica-
tio gene-
ralis.*

Art. 14. Indicatio generalis in curatione Februm est, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem contineatur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo gliscat, unde periculosa symptomata, nec illinc nimium torpeat, ne naturæ conamen frustretur; atque hinc exurgit norma sanguinem mittendi plus minus, vel prorsus omittendi.

*Vomito-
rium.*

Art. 15. Si adsit vomendi proclivitas, vomitorium propinare necessum esse omnino videtur; alias etenim accidere solet diarrhœa in Febris progressu, ægro interdum admodum periculosa. In initio Febris emeticum propinari debet, sed, si omissum fuerit, quovis morbi tempore adhiberi potest, modo vires ægri ferre valeant; post hoc autem paregoricum hora somni propinandum est; diebus insequentibus, si repetitio venæsectionis minus indicetur, & non aderit diarrhœa, enemata alternis diebus in usum venire possunt, usque ad decimum vel duodecimum diem, quo tempore negotio ad secretionem vergente medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo, ad concoctionem accelerandam. Si fermentatio recte progrediatur, nullis omnino remediis opus est; despumatio etenim est opus naturæ.

*Cathar-
ticum
exhiben-
dum sub
finem.*

Art. 16. Usitato circa diem decimum quintum, si adsit in urina laudabilis separatio, & sympto-
ma-

matum remissio, catharticum adhiberi debet, ne sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet, quandoque tamen ad diem decimum septimum differendum est.

Art. 17. Pro comperto affirmo, nihil ita cer- *Cathar-*
to, atque ita potenter ægrum refrigerare, atque *sis post*
catharsim post venæsectionem celebratam: testatur *V. S.*
enim experientia catharsin post venæsectionem
quibuslibet aliis remediis foelicius certiusque Fe-
brem perdomare, tum quatenus intestinis illu-
viem dimovet, tum quatenus anodyno viam
sternit. (Schedul. Monit.)

Art. 18. Ad genuinam sanguinis depuratio- *Duplex*
nem *duplex secretio* requiritur; una per *feces* fit, *secretio.*
altera per *flores*, hæc sensim & paulo pleniori
διαιροῦν, potius quam sudore manifesto ut pluri-
mum peragitur; separatione hac per flores jam
facta, minus periculosa est diarrhœa.

Boerhaavii sententia.

Art. 19. Febris est frequentissimus morbus, *Febris*
inflammationi individuus comes, qui ingenti *quid.*
symptomatum numero plerumque stipatur.

Art. 20. In omni Febre, a causis internis or- *Sympto-*
ta, horripilatio, pulsus velox, & calor, vario *mata*
tempore, & vario gradu, adsunt; hæc autem ubi *quæ in*
velociter decurrunt, Febris acuta, ubi tarde, *omni Fe-*
lenta audit. Febris fere semper cum sensu fri- *bre ad-*
goris incipit, & progrediente morbo maxime a *sunt.*
velocitate pulsus primario cognoscitur; adeoque
velocior cordis contractio cum aucta resistantia
ad capillaria Febris omnis acutæ ideam absol-
vit, quæ a causis infinitis produci potest. Sa-
nitas ægroti videtur esse *cynosura* primaria, in
quam natura in Febribus collimat; frequenter

vero Febris in mortem definit, quandoque in alium transit morbum.

Curatio generalis. Art. 21. Curatio Februm generalis summatim comprehenditur, vitæ ejusque viribus consulendo, in acre irritans corrigendo & deturbando, lentorem dissolvendo, expellendoque, & symptomata mitigando. Si in Febre exorbitare natura deprehendatur, moderamen fit abstinentia, victu tenui, potu aquæ, venæsectione, clysmate refrigerante, &c. si segnior appareat, excitabitur ope cardiacorum, aromaticorum, volatiliū, &c. Sublata Febris causa symptomata reliqua cessabunt, quatenus ab ea primario pendet, adeoque, si ferri queunt sine vitæ periculo, singularem curationem vix requirunt, nec temere turbari debent: Si vero intempestiva & nimis sæva fuerint, singula sunt lenienda suis remediis propriis, habita semper ratione causæ & status morbi ipsius.

De symptomatibus.

Etmulleri sententia.

Quid vult natura? Art. 22. Febris est *motus natura*, seu quædam lucta, quæ spirituum plus minus alteratorum ope id, quod est hostile œconomix animali, Febrem. eliminare satagit.

De diætâ. Art. 23. Quo magis acuta est Febris, eo tenuior convenit diætâ; licet ægri ad plures dies jejuni jaceant, perinde erit, *nec unquam vidi febricitantem fame pereuntem*, sed potius, si quid ingeritur, Febris exasperatur, &c. nam in alimentis appetitus præscribit rationem, *quantum & quale, & tempus.*

Vomitiva & sudorifica. Art. 24. Vomitoria in Febribus fere omnibus in principio sunt proficua. Sudoriferorum usum ipsa natura nobis monstrat, signis coctionis apparentibus sunt optima; & etiam in toto morbi decursu sunt utilia; immo horum usu promiscuo

scuo Febres non raro curantur. Spiritus salis armoniaci, vel sal volatile ejusdem, est febrifugum universale, & usu repetito raro fallax. Saccharata quæcunque in Febribus insigniter nocent. *Hippocrates* in omni Febre vinum porrigit. Semper observavi quamdiu urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu existere ambiguo; quando vero adsunt signa coctionis fausta possumus ominari: opus hoc coctionis est solius naturæ. Inter signa lethalia nullum est certius, quam frequens manuum ad nares admotio sine ulla materiæ effluxione.

Baglivii sententia.

Art. 25. In morbis acutis, atque inflammatoriis paucis opus est remediis, satis enim fuerit vias observare diligenter, quæ natura exitum tentat, curamque eo perducere, naturæ obsecundando, alioquin ægrotus pessum dabitur.

Natura ductus sequendi sunt.

Art. 26. In Febribus universalibus, id est, quæ ipso de sanguine suscitantur, non admodum laborandum est circa partem affectam, ut inde curativæ deducantur indicationes; Febrium siquidem primordia, partesque affectæ in iisdem, nos plerumque latent, & si unquam paterent, oportet indicationem dirigere ad constitutionem massæ sanguineæ febricitantis, potius quam ad sophisticam speculationem causarum proximarum, aut quæ in Febribus primoprinx sunt, quæ nostræ aciei minime subjiciuntur.

Inanes speculationes nihil facienda.

Art. 27. Ideo si primæ viæ sint obductæ, exque egerendæ atque expurgandæ fuerint, danda opera, ut Febrium fomes tollatur; Si vero sanguis febricitans sit exaltatus, & vehemens, ejus reprimendus est impetus; si nimis crassis humoribus irretitus, atque coagulatus, exaltetur,

Tria præcepta pro curandis Febribus.

ac dissolvatur. In hisce enim *tribus preceptis* omnium prope illarum Febrium cura versatur, quæ ortum non ducunt ab organi læsione, verum ab humorum congerie, aut in ipso sanguine, aut in primis viis. Et cum ad crisin natura vergat, aut eas jam exiverit, tum a remedium copia tanquam a peste cavendum.

*Odor cadaverosus mor-
tis præ-
sagium.*

Art. 28. Ex odore, quem ægri spirant, soleo sæpe, utrum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generis futurus sit, judicare. In ægis qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, dum pulsum tangimus, ab eorum exhalare corpore foedus quidam ac veluti *cadavericus odor*, qualem spirant in templis cadavera, ut sæpe observavi, & velim, ut serio animadvertant medici. *Animadv. in pract. nov.*

Friderici Hoffmanni sententia.

*Febris
sæpe sa-
lutaris.*

Art. 29. Licet autem febris humano generi tam infestus, & pernicialis sit morbus; hanc tamen peculiarem obtinet facultatem, ut motu intestino & progressivo, quo absolvitur, acutiori causam suam destruat, ac se ipsum sanare possit, immo aliis, & gravibus, & longis morbis superveniens eosdem vincat, atque expugnet. Ipse *Hippocrates* & *Celsus* febrem habuerunt medicinam, & morborum præsidium, quo magni etiam morbi curantur; paralyse, epylepsia, convulsivi motus, affectus spasmodici, sic dicti: hypochondriaci; quin consultum duxerunt, suppressa citius febre, novam accendere. Et testantur etiam observationes, quod valetudinarii post febrem, longam sanitatem fuerint adepti, quin quod temperamentum, & mores fuerint immutati, qua de re latius videri potest dissertatio nostra *de febrium salubritate*.

Art. 30.

Art. 30. Affero formalem febris rationem, si- *Causa
formalis.*
 ve, ut ita loquar, fundamentalem causam con-
 sistere in spasmodica universi generis nervosi &
 fibrosi affectione, quæ maxime ex spinali me-
 dulla procedit, & successive ab exterioribus ad
 interiores partes vergit. Docui id ipsum pluri-
 bus & momentosis rationibus in dissertatione
de vera motuum febrilium indole ac sede. Idem
 vero etiam luculenter arguunt omnia, quæ in
 febre præsto sunt pathemata, atque phænome-
 na, dolor scilicet dorsi, præsertim circa lum-
 bos, horror, rigor, frigus, præsertim extremo-
 rum, tremor, unguium livor, vasorum in ma-
 nibus & pedibus detumescencia, cutis contracta
 & arida, oscitatio, pandiculatio, pallidus, &
 lividus faciei color, tremens & palpitans cordis
 motus, præcordiorum anxietas, spiratio ægra,
 inquietudo, corporis jactatio, sensus ebullientis
 circa præcordia sanguinis, pulsus contractus,
 parvus ac debilis, nausea & inclinatio ad vo-
 mitum, alvi & perspirationis suppressio cum
 urina tenui & aquosa.

Art. 31. Hinc prona jam fuit consequentia, *Causa
materialis
varia.*
 quod omnia quæ totum nervosarum & vasculo-
 sarum partium systema ad spasmos irritare &
 sollicitare possunt, ad ingenerandam febrem sint
 aptissima. Horum classem ducunt vehementes ani-
 mi commotiones, terror in primis, & ira, ma-
 teria venenata & subtilis caustica, vel intus ge-
 nita vel per contagium suscepta, intercepta per-
 spiratio, sudores critici cohibiti, exanthemata
 retropulsa, materia purulenta ulcerosa, passim
 in partibus adhærescens, alimenta nimis acria,
 corruptæ & biliosæ primis in viis hærentes cru-
 ditates, nimix vigilix, dolor vehemens ac ner-
 vosarum partium tensio in inflammationibus,
 tumoribus, & abscessibus, læsiones nervosarum
 par-

partium ab acuto instrumento, ab acri & corrosivo pharmaco, balnea frigida & vicissim nimis calida, aut adstringentia. Sed pro differente harum causarum indole, & vario quo nervosum genus infestant modo, differunt etiam prognatae inde febres; ut nonnullae sint benigniores, aliae intermittentes, aliae continuae, simplices vel compositae regulares, vel anormales, exanthematicae putridae hecticae, vel lentae, ut porro quaedam facilius vel difficilius sanationem admittant, quaedam citò decurrant, quaedam longius extrahantur, quaedam etiam hominem perimant. De qua februm origine, earumque causis & differentiis, pluribus egi in dissertatione *de generatione februm*.

Farrago sententiarum.

Regula de diæta. Art. 32. Hippocratis Aphorismus de diæta in morbis acutis sic se habet: ubi peracutus est morbus, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu uti necesse est; ubi vero non, sed plenius cibare licet, tantum a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit. *Seçt. I. Aph. 7.*

Incommodum nimia remedium copia. Art. 33. Graviter errant illi, qui acutos & inflammatorios morbos remedium copia tamdiu afficiunt, donec natura, quo se vertat nescia, & hinc inde, tum a morbi vehementia, tum a remedium pondere, varie distracta, tandem cogatur succumbere: perturbato enim, distractoque motu illo ordinato naturæ a repetitis toties, vel absque methodo exhibitis medicamentis, nec Febris minuitur, nec crisis statò tempore succedit, sed patiens dubio Marte colluctatus; vel in perniciem, vel in chronicos morbos delabitur. *Baglivius.*

Art. 34.

Art. 34. Hippocratis aphorism. 36. §. 4. Sudores febricitantibus boni, qui manare cœperint die tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo quarto, decimo septimo, vigesimo primo, vigesimo septima, tricesimo primo, tricesimo quarto, ii enim sudores morbos judicant: qui secus evenerint, laborem, & morbi longitudinem, & recidivas significant. Aphorism. 24. §. 2. Index septimi quartus; sequentis septimanæ octavus initium; spectandus quoque est undecimus; siquidem is secundæ septimanæ quartus est; rursumque decimus septimus spectandus: is enim a quarto decimo quartus est, & ab undecimo septimus, Dierum (inquit *Lister*) indicum & contemplabilium ad *crises explicandas* tota doctrina valde obscura est. Est quidem trium concoctionum quædam mensura, ut ex anatomia & statica medicina plane constat: ita Febrium intermittentium periodi statæ sunt; in aliis vero morbis acutis, quales sunt Febres symptomaticæ, ut pleuritis, angina, variolæ, & Febres continuæ, *crises*, earumque indicia fortè non ita promptè animadvertimus, quod parum naturæ, sed nobismet ipsis (quod tamen veteres non fecerunt) totam ferè sanationem vindicamus.

Art. 35. Nullum remedium (inquit D. D. *Fremind*) sub initiis Febrium est æque salutare ac vomitorium, sæpenumero & necessarium est, si quando, quod plerumque fit, vel nausea, vel ventriculi gravitas, vel etiam capitis dolor invaserit: hoc medicinæ genus apud vetustissimos *Græcos* haud infrequens fuit, & *Celsi* temporibus *Romæ* perquam familiare. Medicamenti, quo vomitus cietur, interior est quædam actio; quæ nusquam alias se manifestius prodit, quam in celebri illa radice *Ipecacoanha*. Hujus sane vis in attenuandis humoribus eximia est; cui & fidem facit summa her-

De diarræ-
bus cr-
ticis.

Ex

Indici-
bus.

Doctrinæ
eorum
valde
obscura.

Utilitas
vomito-
rii in Fe-
brium
princi-
pio.

Virtus
singula-
ris rad.
Ipecaco-
anha.

herbæ amaritudo, & vividus ille, qui apparatu Chymico elicitur, *sal.* Equidem hanc radicem non parca manu adhibitam esse comperi, cum nulla fere vel per os, vel per alvum sequeretur purgatio: Elapsa autem una aut altera hora incallescere capit ægrotus, ita ut, pulsu excitato, tandem in *uberrimum sudorem* colliquesceret.

Febres vix sine evacuatione curantur. Art. 36. Hoc unum spondeo (idem laudatus author) quemquam experiundo comprobaturum, quod scilicet ex Febribus *multæ evacuantibus solis*, etiamsi haud alio fuerit remediosus, *cedere consuecant*; vix ulla autem, quæ paulo vehementius invaluerint, *medicina qualicunque*, si ab hoc *evacuandi instituto decesseris*, *restringui possunt*.

Methodus Ludovici in curandis Febr. Art. 37. „ Hæc est accuratissima *Danielis Ludovici* methodus curandi Febres continuas, nempe, in principio præmissio vel omisso vomitu, mox volatile aliquod v. g. *tincturam bezoardicam, mixturam simplicem, spirit. C. C.* & pro circumstantiarum ratione cum *opiatis* exhibendo; in statu *fixiora, terrea, alcalina*, in declinatione *cancrina, corallina*, &c. hac nempe methodo nec crisin negligit medicus, nec otiose eam expectat.

Art. 38. „ Quo mitiora pathemata sunt circa primas vias & regionem stomachalem, eo mitior & salubrior est Febris.

Art. 39. „ Facies turgida & subtumida morbi longitudinem pronunciat.

Signa prognostica.

Art. 40. „ Quo magis sudant febricitantes, eo minor est sedimenti copia in urinis; *Glutinosus sudor est pessimus*.

Art. 41. „ Quanto urina rubicundior est in initio, tato citius terminatur Febris, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum: *Urina alba, aut pallida, & admodum cruda in Febribus ardentibus periculosa est, & plerumque*

„ mor-

„ mortem portendit, præsertim si adsit delirium; convulsiones enim sunt in propinquo.

Art. 42. „ Surditas in Febribus, urina existente cruda, delirium grave portendit; sed si cum signis coctionis jungatur, bene ominatur.

Art. 43. „ In Febribus, si ægri non possunt discernere colores, imminent *convulsiones*.

Art. 44. In omni Febre pulsu existente languido, inæquali, aut formicante, cane pejus & angue *opiata* vitentur. *Cautela de uss opii.*

Art. 45. Observatione constat, quod *crebra sanguinis missio* homines Febri aptiores reddat præcæteris: quare vulgo dicitur, quibus sanguis semel detrahitur, eos, nisi quotannis idem faciant, in Febrem proclives esse, & pinguescere. *Vvillis.*

Art. 46. In Febribus continuis, si pulsus sit fortis uno tenore pergens, ut ut deliria, tremores, tendinum subsultus, cæteraque dira in genere nervoso symptomata subitam ruinam minari videantur, semper bene præfagit: e contra vero pulsus celer, debilis ac vacillans mortem præ foribus adstantem indubitanter prædicat, ut ut reliqua symptomata adblandiantur. *Morton.* *Prognosticon generale.*

Art. 47. In curatione Februm summum ac acerrimum medici ingenium requiritur. Judicio præpollenti, *facultati innata & incommunicabili*, plurimum debetur. Morbi genius, anni constitutio, ægroti temperamentum, & vivendi modus, symptomata singula & universa, & innumera alia incidentia, & accidentia, omnia conjunctim & divisim *animo præsentis & sereno* diligenter perpendenda sunt; e quibus inter se rite collatis sagaci medico, *lente festinanti*, exurgit *clara ac distincta medendi methodus*; & plerumque insequitur felix morbi exitus. Veritatem hujusce mei effati longa jam annorum serie

rie non sine gratissimo animi delectamento foeliter non sine gratissimo animi delectamento foeliter

Eadem citer expertus sum.

phar-
maca
semper
febrem
non sa-
vant.

Art. 48. Valde communis est morbus, qui febris dicitur, & nusquam aliquis extat, cui persuasum, sit, unum tantum remedium ad eandem subigendam valere. Observatione dignum est, quæ Pharmaca quodam tempore febres fugarunt, alio eandem virtutem non obtinere. Cortex ipse Peruvianus tanti habitus, cum primum in Europam prodiit, subinde frustra adhibitus fuit, etiam si plurima diligentia & cautione usurparetur. Veteres Centaurium minus ut singulare adversus hos morbos remedium celebrarunt; nunc vero tantos effectus, vel qui ad hos proxime accedant nobis intueri non licet, cujus differentia ratio ab Aeris mutationibus, a quorundam miasmatum prædominio, atque adeo a diversitate nutritionis, quam ab hisce elementis plantæ mutantur, oriri posse verissimiliter credimus. Febres item singulis annis, cum non sint eadem, quamvis eadem symptomata ob oculos fiant, prudentem exigunt Medicum ut aliud usurpet remedium; quando illud quo diu usus est nondum ægrum in salutis gratiam revocavit. Nulla ergo remedia tutiora dantur generalibus; quæ necessario in qualibet Febre simplici; atque etiam subinde in compositis & complicatis usurpari debent. M. J. G. *Medicus Bruxellæ in Lexico Med. seu Dictionnaire dicinal.*

A qui-
bus in-
cipien-
da cu-
ratio.

Art. 49. Incipiendum semper, ait memoratus Scriptor, a Clysmate purgante vespere ægrotanti exhibendo; quodque sequenti modo cinnatum ceteri cujuslibet vices exerere potest.

℞. Fol. Malv. Parietar. Mercurial. Beta ana man. j Senn. orient. unc. j Sal. Tartar. ʒ j Aq. font. lb j ebull. per horæ $\frac{1}{4}$, & colat. dimid. pro

puero

puero adde Mellis unc. jv. f. Clyster. vespere injiciendus.

Postridie extrahatur sanguis ad unc. x & die sequenti detur Emeticum. Hæc sane methodus numquam fallax est, quocumque febris deinceps Typo induta prodeat, non obstante quod nonnullis practicis videatur binos tresve accessus nullo objecto Pharmaco intactos relinquere; sed nisi de specificis pharmacis, id intelligendum est. Generalia quæ laudantur cito satis quidem adhiberi nequeunt, cum primæ viæ infarctæ opletæque semper inveniantur. Ægro item propinanda dabitur aqua pura nitro depurato imbuta ad libitum, & summo præcipue febris calore vigente affatim haurienda; & quia Ptisanæ ex herbis & radicibus factæ principiis onerantur fermentescibilibus, laudabile idcirco erit iisdem abstinere.

Art. 50. Si æger non purgatus fuerit quantum expedit, quod cognoscitur ex oris amaritie, acidis eructationibus &c. ad alterum Emeticum biduo a primo deveniendum est. Si Venter plenus est atqueensus, si viscera doleant, gravitas genua teneat &c. purgatus est ut sequitur *℞ Senn. mundat. ℥ ij Cheresol. man. j. Aq. font. unc. vij Infund. per hor. 8 super ciner. calid. & colat. add. Mann. elect. unc. j. percolet. iterum, atque colat. add. Crem. Tart. ℥ sem. Syrup. flor. persic. unc. j m.*

Quomodo continuandum.

Art. 51. Certissimum est alvum Laxantia febres haud ægre, & sine redivisus periculo compescere. Irritum hinc est specificis vacare remediis, dum primæ viæ opletæ adhuc reperiuntur, quæ si ita non se habeant laxantibus id obtinetur, quæ sæpe febrium intermittentium, quarum accessus cito reiterant fermentum per alvum præcipitant. Fatendum quidem est Empiricos quos-

Observatio de evacuantiis usu.

quosdam, imo Circulatores nonnullos specificis sæpe febres tollere, quorum si optatum effectum interdum ægri non vident, id negligentiae tribuendum est eorum, qui generalium remedium usum antea despexere.

Remedia ad Febrem simpliciter continuam. **Art. 52.** Quod si febris simpliciter continua videatur, h. e. malignitatis expers, veluti absque purpura, variolis, aliisque gravioribus symptomatis, sequens remedium jubendum est, quod laudato Auctore fidem faciente, omnium febrifugorum huc usque inventorum præstantius haberi debet.

℞ Sal. Tamarisc. Absynth. Armoniac. ana ℥iij. Chin. Chin. unc. ij. f. pulv., quo cum Syrup. de Absynth. unc. ij fiat Opiatum. cujus ℥ j detur mane, totidem trihorio a meridie, totidemque vespere. Habenda observatio est, ne æger hoc remedio utatur nisi hora elapsa post ultimo assumptum cibum, ejusque vis specifica æque tuto Continuas simplices, ac Intermittentes subigit, modo per XV. dies continuetur.

Remedia ad Febrem malignam. **Art. 53.** Si vero febris est Maligna, quod cognoscitur ex pectoris oppressione, hypochondriorum & ventris tumore, gravedine capitis, delirio, raptu ad cerebrum, motibus convulsivis, nausea, inclinatione ad vomitum, vigiliis &c. tunc omissa Ptisana vel potione nitrata, altera paratur ex Rad. Scorzon. & Raf. C. C. Dein alterum propinatur Vomitorium, cui Confect. Hyacinth. drachma admiscetur, & quotidie jubetur ægro usus pulveris ex Ocul. cancr. ℥ j, & Sale Tartari, vel absynth., vel Armoniaci gr. xxx cum jure carniū hauriendus.

Continuatio Remediorum ad Febrem. **Art. 54.** Quando febris ex sanguinis oritur dissolutione; quod ex pulsu cognoscitur parvo & frequenti, ex oculis splendentibus, nec non ab ægri inquietudine; vel quando oritur ex coa-

gula-

gulatione ; quæ cognoscitur ex pulsu duro, & tenso, ex difficultate respirationis, dolore lateris, & somnolentia, bis in die optimo successu sequens haustus usurpatur .

℞ Stib. diaph. gr. xx Sal. Tart. gr. xxx Aq. flor. Tunic. lil. alb. ana unc. ij. Sp. sulph. p. c. gutt. iij. In omnibus malignis febribus putridis, & colliquativis hoc remedii genus palmam ceteris quidem præripit. Juvat aut in iisdem colliquativis febribus, quas alvi fluxus comitatur, vomitorium præmittere ex Rad. Ipecacuanhæ 3 sem. jure carniū hauriendum. Si vero symptomata hoc remedio semel exhibito non remittant, postmodum reiteratur. Hoc omne illud est, quod ad publicam utilitatem litteris consignare fas erat, reliqua enim Clinici experientia præstanda relinquuntur, qui morbi progressui invigilando, augescentibus sæpe & iminuentibus symptomatibus opportune & congruis auxiliis subveniat.

Art. 55. Veluti præcipua Praxeos Regula habendum est, ne diebus Criseos qui sunt 5, 7, 9, 11, 14, 21; nec etiam in statu febris purgans aliquod jubeatur, sed in declinatione aut remissione & diebus omni febre expertibus idem usurpare præstat. Vitandæ itidem sunt Ptisanæ refrigerantes, Sp. Vitrioli, Hordeata, Emulsiones, Amygdalæ, & pulli juscula &c. hujusmodi namque remedia, & quæ magnifice & gloriose a quibusdam celebrantur, nulla majori virtute pollent ad brevi tempore febrem compescendam, nisi ut validius revertatur, & majori vexet deinceps molestia. Certissimum est ergo remedia, quæ motum sanguinis fermentativum componunt, cum hostem noxium abigere nequeant, nisi palliariorum vim, & effectum præstare.

*Regule
pro usu
evacu-
antium
in Fe-
bribus .*

DE FEBRIUM SYMPTOMATIS

gravioribus

Inter legendum & observandum

Arbuthnoti Sententia.

*Obser-
vationes
circa ri-
gores.*

Art. 56. **M**aximi refert: ut aptum regimen præscribatur ad frigus, quod principio februm corripit, nam hoc in gradu idem contemnere periculosum est; rigor enim diuturnus graviores morbum ostendit, & primum gressum in mortem ponit. Quousque persistit, sanguinis circulatio lentior est, & qui in arteriis capillaribus remoratur, vi cordis obstitendo anxietates facit, & occasionem præbet, ut circa ipsum cor polyposæ concretiones generentur. Patet hinc cur rigores inflammationibus augmentum adferant. Qui ex quartana febre pereunt, durantibus rigoribus occumbunt; nullum enim triste symptoma datur, quod a diuturno rigore produci nequeat.

Rigore item persistente nec calida Analeptica, nec irritantia medicamenta conveniunt; siquidem illa vehementius super dexterum cordis sinum agendo sanguinem nimio impetu impulmones adigunt, hæc vero artibus vasa minima confringendo mala subinde intendunt.

Nil igitur aptius Aqua hoc in casu invenitur, quæ diluendo simul, & laxando rigores cito abrumpt, & citius alexipharmacis, & Analeptics sudores prolicit. Quare efficacior reddi potest Vini Rhenani additione. Monendum item est, ægrum, frictionibus ad corporis extremitates habitis, plurimum levare posse.

*Anxi-
etates.*

Art. 57. In anxietatibus, quæ febrem comitan-

tantur, regimen calidius præscribere licet, quia cum eadem sæpius a spasticis constrictionibus, & a flatibus foveantur, utiliter Aromaticorum virtute adjuvantur.

Indicatio est contra anxietates: ut substantiæ saponaceæ dissolvendo sanguini aptæ adhibeantur: Utiles quoque sunt fructus maturi, plantæ (quædam lactiginosæ: ut lactuca, endivia &c. In primis vero mel & mellita laudantur.

Art. 58. In siti febrili: ne sit potus frigidus, quia *Sitis* frigidi liquores faucium, gulæque glandulas contrahendo, æque cito sitim non extinguunt, ut qui mediocriter calent; quare hoc in casu potu leviter subacido æger confortandus est, & quia omnia salia sitim augment, excepto nitro, ideo spiritus nitri dulcificatus adhuc usum optime facit. Faciunt quoque decoctum album Avenæ, & Emulsiones, modo stomachi debilitas, & flatuositas absit; secus aqua pura cum vini Rhemani pauxillo præferri debet.

Art. 59. Nausea, & Vomitus ex gravioribus *Nausea* sunt febrium symptomatis, quia ægrum ita con- *& Vomitus.* stituunt, ut nihil admittere intus possit, quare Vomitorio opportune exhibito sæpe hoc malum prevenitur, vel vomitu aliquandiu tepida excitato curatur.

Quousque vomitus persistit, acida, & styptica, & acerbata indicantur, quippe quæ stomachi fibras corroborant. Observatione quidem dignum est, ægros hoc in statu leviter acidis delectari, contra vero pingues oleososque liquores naturaliter adversari.

Hoc item symptoma frequentius cohibetur laxantibus, quæ alvo soluta biliosas fœces extrudunt. Sed attendendum est hoc in casu, & in quibusdam aliis ægrotantium appetitui, qui sub-

hinde res quamvis inconcinnas expetendo : ut Sal, acetum, &c. ab iisdem tamen plurimum levantur.

Vomitus qui a biliosa saburra producitur, haustu sanatur acido, qui a putrida, omnigenis salibus tractari debet. Hoc autem in casu emulsiones cum cremore tartari, Vinum Rhenanum cum aqua, gelu ribesiorum, conserva cydoniorum, acetosa decocta in jure carniū optime conferunt.

Si Vomitus a copia pituitæ exoriatur aromaticis curabitur;

Etaus Si cum stomachi inflammatione vexet, per-
Spa- nitiosus est.
mi.

Art. 60. Flatus, atque spasmi a febris calore humorum particulas rarefaciente producuntur, quare anodynīs, calmantibus, & refrigerantibus eidem obviam eundum.

Debitas *Art. 61.* Virium debilitas cum febre sociata
tas. principio morbi a vasorum repletionē nimia exoritur, eodem vero declinante ab inanitione; quare binæ contrariæ causæ diversam curationis methodum exigunt. Priori casu evacuatio, & dilutio requiritur, altero dandum est ægro plenius nutrimentum, & vini cum aqua usus permittendus, nec non aromata parva quantitate, gelatinæ, & juscula concedenda.

Calor. *Art. 62.* Temperatur demum calor Febrilis phlebotomia, quiete non solum corporis, verum maxime spiritus, aquosis, subacidis &c.

Inter legendum & ex observatione.

Frigus. *Art. 63.* Frigus in Februm initiis oritur ex imminuta cordis contractione liquidis ad extrema fere stagnantibus; unde oriuntur, si diu maneat, polypose in vasis majoribus concretiones, & interdum

dum mors subitanea insequitur; ideoque quo majus in initio frigus, eo periculosior est Febris. In peste incipiente frigus est summum. — Optime curatur potu aquæ calidæ *nitrosæ* cum paucò vino, *decoct. coccin. frictione blanda*, &c.

Art. 64. Calor intensissimus in Febris & Calor.
velut incendium cum magno & forti pulsu fere semper *venesectionem* postulat; quandoque etiam *clyisma leniens* calorem mitigat. Nimius sanguinis fervor & ebullitio *julapiis*, *emulsionibus* & *decoctis appropriatis* attemperandus est; sed apprimè cavendum est, ne ex nimia attemperatione, spiritus elasticitate sua plus justo orbentur, & inde Febris ardens inopinàto in *malignam* mutetur.

Art. 65. Febris *lipyria* dicitur, quando interiora uruntur, exteriora vero frigent; oritur ex Lipyria.
inflammatione visceris interioris valde sensibilis; algor autem non est tactu medici judicandus, sed ægri judicio, qui se algere dicit, & tegi jubet; tepent enim membra; hæc Febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum vel quatrimum, & vix unus evadit, nisi statim ab initio occurratur.

Art. 66. Ad sitim in Febris extinguendam Sitis.
melius est frequentius & parcius bibere, quam una vice multum ingurgitare; sequens est potus gratissimus febricitantibus; *℞. Aq. font. cum pane tost. incoct. ℥ij. vin. rhenan. ℥ss. gelatin. C. C. ℥ij. syr. cydon. vel è succ. citr. parum misce.* Convenit etiam *decoct. ad sitim Fuller.* vel *decoct. coccin. ejusdem*. Gargarismata quoque usui esse possunt, ut *gargarisma commune Fulleri*, *decoctum rosarum* pro gargarismate, &c. Frequens ablutio oris cum simplici aqua multum confert ad sitim fallendam. *Sitis* (ut recte monet *Helmonstus*) non oritur a calore, sed a defectu salivæ,

hinc guttæ aliquot *spir. sulphur.* plus levant sitim, quam integra mensura aquæ frigidæ; in eundem finem etiam conducunt *succi è vegetabilibus & fructibus*, ut *acotose, aurantiorum, limonum, citronum, ribium, berberum, cydoniorum, &c.* Præ cæteris commendabiles sunt hi succi per spontaneam residentiam post *sulphurationem* secundum *Helmontium* depurati, & in loco frigido asservati; *tamarindi* quoque optime conveniunt sitim leniendo, & alvum blande laxando; hæc vero *acida & refrigerantia* non sunt omnibus Febricitantibus indiscriminatim porrigenda, sed opus est maturo consilio: si enim præter sitim importunam adsit etiam summa debilitas, tum vinosa & spirituosæ tutius propinanda sunt.

Jusculum avenaceum.

Art. 67. Ptisana ex hordeo omnibus aliis forbitionibus præfertur ab Hippocrate in lib. de victus ratione in acutis; & crebrior est ejusdem mentio apud veteres medicos; sed recentiores hordeo vitio vertunt ejus cruditatem ac flatulentiam, & *jusculum avenaceum* substituunt.

Siccitas linguæ & prunella.

Art. 68. Siccitas & asperitas linguæ corriguntur *humectantibus, & lenientibus*. Febris cum *prunella* dicitur, quando lingua, crusta nunc albicante nunc nigricante obducta, colore nigricante puniceo apparet tincta; ipsa saliva infecta videtur esse maxima causa. In *prunella* præter *mucilag. cydon.* &c. conducit sequens gargarisma, *℞. Liqueor. è rapis coct. express. lbss. succ. sedi major. depurat. ℥iij. mellis despumat. ℥j. sp. sal armoniac. q. s. m.* Sequens quoque mixtura commodissima est, *℞. Alb. ovi unius, fortiter agitetur cum aq. sperm. ranar. ℥iv. mel. ros. ℥j. m.* Ad linguæ etiam ardorem & siccitatem quandoque in usu sunt sequentia, viz. *Mucilago* sequens *℞. Mucilag. cydon. ℥ij. pulp. tamarind. amygd. dulc. excort. ana ℥j. ol. sulph. per campan. gut. xx. syr.*

de rub. Ideo q. s. misce. vel decoct. ulmi Bat. gargarisma commun. Fuller. loboch rub. vel loboch vitellin. ijsdem.

Art. 69. Nausea & vomitus in Febris, cum *Nausea*
a crapula ortum ducant, leni vomitorio (*v. g. li-* & *vomi-*
quor. posset. cum foliis cardui benedict. incoct. co-
piose ingesto, addendo inter vomendum bis terve
sal. vitriol. ℥℔. vel loboch. oxymel. scillit.) tutissi-
me curantur; ubi vero fermentum febrile ven-
triculum petit, & enormes vomitiones biliosas
excitat, ut ægri vix quicquam vel medicamento
vel alimenti retinere valeant, imprimis conve-
nit jusculum tenuissimum pulli affatim ingere-
re, & postea remediis appropriatis tonum ven-
triculi laxatum firmare; sequens Julapium est val-
de efficax, *℥. Sal. absynth. Div. succ. limon. reccens*
express. ℥ij. misceantur & finita ebullitione add.
aq. cinamom. hord. ℥iij. mentb. Stephan. ana ℥i. sp.
croc. ℥℔. ol. caryoph. g. iv. syr. Cydon. ℥i. m. Inter-
dum ad *laudanum* confugiendum est. Plura de
vomitione sistenda videantur alibi.

Art. 70. In Febris aliquando accidit *Diar-* *Diar-*
rhœa colliquativa magno ægrotantium damno, *rhœa.*
quæ evacuatio non naturæ vi, sed morbi potius
impetu, & acrimonia turgentis humoris naturam
stimulantis fit, adeoque *symptomatica* est, & sisti
debet; convenit *decoctum album* pro potu ordi-
nario; recte exhibentur *pulveres testacei absorbentes*
diaphoreticis admisti, & postremo ad *diascor-*
dium, theriacam, &c. deveniendum est. Enema
sequens quandoque singularem præstat opem, *℥.*
Fol. ros. rub. m. ij. coq. in lact. chalyb. ℔℔. in cola-
tura dissolv. diascord. ℥vj. m. f. enema diutissime
retinendum. Hic etiam plurimum facit, mihi que
in frequenti usu fuit, *Enema de malicorio Fulleri.*
In genere observamus in Februm initiis alvum
laxiorem quam adstrictiorem meliorem esse, in
B 4 pro-

progressum vero morbi pejorem. Unicum hic notatu dignum observare licet, nempe in diarrhoeis colliquativis in declinatione Februm accedentibus, & diu, non obstantibus remediis quibuscunque adhibitis, perseverantibus, solam prohibitionem *jusculi pullini* prohibito omni alio victu & potu quocunque diarrhoeam brevi penitus tollere, & aegrum restituere, ut experientia me docuit.

Dysuria.

Art. 71. Interdum Dysuria est symptoma molestissimum. *Emulsiones communes* effervescentiam humorum in Febris ardentibus plurimum compescunt, & hoc molestissimum symptoma plerumque sublevare solent, ut etiam *ol. amygd. dulc. cum syr. de alth.* Dysuria ex applicatione vesicatoriorum in Febris *gum. arab.* commode medetur, *solutio scilicet ad ℥ij. in decoct. hord. ℥ij.* pro potu communi. Emplast. epispastic. Fulleri est omnium longe optimum & certissimum. Operæ pretium esset fortasse, experiri vires *Camphoræ* intermiscendo ipsam in compositione epispasticorum, num stranguriam vel ardorem urinæ præcavere potis esset.

Sudor.

Art. 72. Sudor in Febris, qui vel morbi initio vel quovis alio tempore ante diem criticum, nec adhuc visis coctionis signis, profluit, est *symptomaticus*, & frequenter *colliquativus*, qui aegrotum gravat, & morbum exasperat; ideoque si modum excedat, arte, si fieri possit, cohibendus est. Prohibetur surgendo ex lecto; corpus a nimis integumentis liberando; aerem frigidiusculum admittendo; a calefacientibus abstinendo; *leniter astringentia & blanda acida* capiendo, &c. egregiam vim in sudoribus sistendis habet *Jaccharum Saturni*.

Dolor capitis.

Art. 73. Inmanis capitis, lumborum, vel artuum dolor in Febris maxime in initio ut plurimum

rimum *Venesectionem* postulat; manente nihilo-
minus cum vehementia dolore injiciendum est
enema laxans; fortassis levamen aliquale dolenti
capiti conferre potest sequens epithema *℞. Sem.*
papav. alb. parum contus. ℥ss. placent. rosac. ℥j. vitel.
ovi unius, acet. sambucin. q. s. misceantur super
ignem, & f. epithema fronti admovendum, &
sæpius renovandum.

Art. 74. Vigiliæ pertinaces in Febris succurrendæ sunt, ne dissipatis spiritibus vires fran- *Vigilia*
gantur. Investiganda est causa vigiliarum; si a
fervore & siccitate proveniant, conveniunt re-
frigerantia & humectantia; si a dolore, propriis
remediis leniendus est dolor; non nisi necessi-
tate coacti ad opiata confugemus. Obiter mo-
nendus est medicus, ne criticis vigiliis, seu ab
inquietudine critica suscitatis auxilium hypnoticis
præbere satagat.

Art. 75. Prædicto malo contrarius est sopor ni- *Coma.*
mius in Febris, seu coma, sive assidua somno-
lencia; quando sopor morbosus evadit, excutien-
dus est omni arte, ne calor natus opprimatur;
injiciendi sunt clysteres acres; epispastica variis
partibus admovenda sunt, & cataplasma de ha-
lecibus five de raphan. Fullerii plantis pedum ap-
plicandum; interne conveniunt salia volatilia,
cephalica &c.

Art. 76. Pervigilium frequentissime est causa *Delirium.*
delirii, non ideo delirium hypnoticis curari ten-
tandum est; nam id esset temerarium, sed inda-
ganda est causa, & remediis appropriatis auxilium
ferre, conandum est. Camphora (inquit Quincy)
in delirio Februm somnum conciliat opio neu-
tiquam proficiente. Delirium Febris iminere
signum præbet, urinarum, quæ antea valde tin-
ctæ erant & flammæ, in tenues & aquosas mu-
tatio.

Spasmi.

Art. 77. Convulsiones quoque interdum superveniunt, tremores item & affectiones spasmodicæ; in tali rerum statu diligenter expiscanda est causa horum symptomatum, unde medicus intelligat, quibus remediis internis opem ferre valeat, interim plantis pedum applicari possunt *duo columbi* pullive recenter mactati & per medios secti, vel toti pedes involvi possunt *calidis pulmonibus agnini, vitulinis*, vel *vervecinis*; renovari debent hæ applicationes saltem ter in die.

FEBRIS EPHEMERA.

D. Fizes sententia.

*Ratio
Nomi-
nis.*

Art. 78. **F**ebbris hæc ita dicta fuit, quod per diem hoc est horas viginti quatuor durare soleat, extenditur tamen interdum ad diem tertium conclusivè; cumque ulterius extenditur abit in synochum imputrem, aut etiam putrem.

Types.

Art. 79. Febris Ephemera ea est febris continuæ simpliciter brevis species, in qua pulsus magnus est, modice celer ac frequens, æqualis & mollis, calor mitis absque gravibus symptomatis, quæque intra diem, aut ad majus intra tres dies sua percurrit tempora.

*Diagno-
sis.*

Art. 80. Febrem hanc non antecedit cibi fastidium, nec corporis lassitudo, nec horror, multave oscitatio, verum repente ea febris velut tota accedit cum calore, interim nullis febrilibus symptomatis notabilibus stipata est: qualia sunt capitis dolor aut ventriculi, nausea, vomitus, inquietudo corporis, æstus, immutationes in urina, & similia; solvitur brevi, interdum latenter sine manifesta ulla evacuatione, sæpius

sæpius per copiosos halitus aut madores; aut per sudores, neque multos, nec foetidos.

Art. 81. Causa hujus febris est materies febrilis constans particulis parum crassis, quibus admixtæ sunt, & laxè adunatæ multo copiosiores particulæ tenues, duræ, actuosæ, a quibus quidem sanguis exagitur protinus, duciturque in rarefactionem non tamen impetuosam, quod sanguis vix spissior fuerit factus, ex qua rarefcentia aliquantum difficile transit sanguis per vasa nonnulla minima incitatis simul ex tensione majori suscitata cordis & sanguiferorum viribus & adauctis, ex quibus sequitur frequentia pulsus modica & celeritas, magnitudo sine tensione tamen vel duritie, calor adauctus nec tamen æstuosus nec acer, neque symptomatum gravium productio, sanguine nimirum non ægre admodum per vasa minima transeunte, symptomatum siquidem febrilium gravitas a difficili eo transitu excitatur potissimum.

His autem materiei febrilis particulis cum exigua insit viscositas, ea facile solvitur, particulæque eæ tenues motu sanguinis agitato vel destruuntur facile, vel solutæ penitus percutim cum diapnoë excernuntur, unde cito dissipata materia febrili febris brevis ejusque terminatio, aut modo insensibili, aut per halitus copiosos & madores, aut per sudorem aliquem suavem.

Art. 82. Causæ febris diariæ remotæ evidentes esse solent; eæ namque potissimum existunt: vigilia, sollicitudo, mæror, ira, solis æstus, lassitudo post exercitium immodicum, temulentia, inedia, & similia; quæ quidem causæ omnes febrem eam excitant, quatenus occasionem præbent, ut sanguis inspissetur leviter, simulque fiat aliquantum actior, seu, quod idem est,

qua-

quatenus procreantur ab eis in sanguine particulæ nonnullæ paulo duriores & magis activæ quæ omnes simul sumptæ, ut materia febrilis, febris ephemera spectari possunt.

Febris ephemera ex præfatis cognosci aut saltem suspicari potest, neque enim de ea, nisi cum terminata est, Medicus certus fit, cum interdum talis existimata continetur in putridam, fit enim aliquando ut materia febrilis, tum in sanguine, tum in primis viis delitescat gravis, cujus spissamentum non evolvitur nisi post dies aliquot, febrem acutam excitaturum, dum in principio partes tantum quædam ipsius mobiliiores extricantur, ac sine gravibus symptomatis febrem excitant, quæ imponit pro febre ephemera.

Prognosis.

Art. 83. Semper est absque periculo febris ephemera, tum quod gravibus careat symptomatis, quod parum difficile fluere sanguinem per vasa minima, primasque vias a pravorum succorum apparatu liberas esse denotat; tum quod ipsius materia motibus sanguiferorum spontaneis & motu sanguinis agitativo evolvi facile & attenuari valeat per cutem deinde absque molestia discutienda facile & ableganda. Interea tamen cum circa febrem eam falli possit medicus, ut vidimus; suspendendum est iudicium ad tertiæ diei finem.

Curatio.

Art. 84. Committenda est naturæ febris huius sanatio: hoc est sanguiferorum motibus spontaneis & sanguinis agitativo. Id unum tantummodo ab arte expetitur, ut nulla committatur culpa, qua in incepto opere natura turbetur; quapropter tota prima die relinquendus æger sine alimento, potandusque aqua tantum, aut ptisana aliqua diluente: ut infuso capillorum veneris; si autem ultra diem febris protrahatur jus-

cula ei exhibenda quoque erunt, interdictio omni alimento solido, ne ab eo pravi quidam succi in primis viis procreentur, qui febrem putridam excitare possent, nunquam enim in febre quacumque digestionem bene fiunt. Verum si calor paulo nimis adauctus perciperetur, vel aliquod accederet symptoma paulo molestum: ut capitis dolor aut aliud, sanguinem saltem semel mittere prudens foret, tanto magis quo cum febris ephemera corpora potissimum juvenilia & robusta aggredi soleat, ex tali evacuatione nihil detrimenti timeri possit. De cætero si iis observatis febris intra dies tres non dissipetur, tunc Medicus illud non esse febris ephemeræ genium gnarus inquiret per signa: an tunc febris synochus putris aut imputris existat, quo, ut infra docebitur, febrem quantocyus efficaciter impugnet. Imo si ante diem tertium signa putredinis manifestentur, succurret ut febris putridæ incipienti,

Hecqueti sententia.

Art. 85. Ephemera febris, juxta scriptorum iudicium, ad spiritus magis quam ad sanguinis corruptionem spectare videtur; at ephemera febris, quæ pauperes & operarios invadit, quamq; *Courbature Galli* vocant, ab imminuto fibrarum Tono exoriri evidentissimum est; quia ex diuturnitate laboris nervosæ fibræ debiliores factæ laxantur & flaccescunt, unde solida debilitata, quantum par est ad circulationem sanguinis promovendam contrahi nequeunt. Est ergo in hoc morbo *virtus Systaltica*, cui incumbit omni præstare valetudinis conservationi necessarium, quæ inepta nanciscitur sanguinem deturbandi. Hinc eodem ubique stagnante molestiam parit, & impedi-

*Quid sit
Courbature
Galli.*

pedimentum iis partibus ubi remoratur, & sistit.

Signa.

Art. 86. Sic talis Morbus, vulgo *Courbature* nuncupatus, ex lassitudine repente exorditur totum corpus tenente, quam rigores sequuntur, capitis gravitate & universali oppressione conjuncti, cum febre itidem calida, decem vel duodecim horis persistente, quæ demum sudore definit.

Causa.

Art. 87. Inordinata perspiratio præcipua *Courbature* causa videtur, nam a violentia exercitationum, & musculorum diuturno motu in operariis & pauperibus, sanguis per totum corporis habitum dispergitur, atque eo quidem promptius & facilius, quod solis ardor, ad modum succus cucurbitarum, eundem ad externa attrahit. Accedit etiam ex negligentia & sæpius impossibilitate corpus mature obtegendi, ob loca humilia, humida, & insalubria, in quibus degitur. Cum cutis pori improvide conspiciuntur, plurimum, quod perspirare debebat in sanguinis massam recidit, unde humore heteroclito gignito, adversus hunc natura insurgit, ut omnibus viribus ad externa corporis ableget, in quo conatu natura febris consistit.

Curatio.

Art. 88. Generalis medendi methodus in hoc maxime sita est: ut videlicet spiritus animales compescantur, fibræ ad naturalem tensionem revocentur, & sanguinis quantitas in justa mediocritate detineatur. Sanguinis iminutio phlebotomia expeditur, cui remedio deinceps addi potest Emeticum temperatum, si forte corpus ægri succo alimentitio scateat, vel stomachus impeditus videatur ab impressione, quam vis humoris morbifici adtulit. Tunc enim hujusmodi vomitorium cum apto regimine h.e. humectante & demulcente eo quidem salubrius est, quo foret catharticum insalubrius.

Art. 89.

FEBRES INTERMITTENTES;

Art. 89. Febres intermittentes multiplicis sunt *Plurium* generis; atque usus invaluit easdem sequenti ra- *februm* tione a se mutuo distinguendi: *quotidiana* dici- *inter-* tur ea, quæ eadem hora qualibet die reverti- *mitten-* tur; *Tertiana*, quæ redit quovis tertio die in- *cium di-* clusive; *Quartana* quæ quarto quovis die inclu- *stinctio.* sive. Si Febris quovis quinto die redeat *Quin-* *tana* dicitur, si sexto *Sextana*, si Septimo, *Se-* *ptimana* &c. Dantur etiam febres *Tertiana du-* *plices, vel triplices* dictæ, aliæ vero *duplices, tri-* *plicesque Quartana*, quarum typus sequenti ra-
tione discernitur.

Art. 90. *Tertiana duplex* est quæ binos eodem die accessus habet, post die autem nullum, vel singulo die unum. Differt febris hæc a quotidiana, quia statim accessus horam non habet; sed secus ac in quotidiana primus tertio correspondet, secundus quarto, & sic deinceps. *Duplex Quartana* ea est in qua modo bini eodem die accessus ingruunt, duobus subsequen- tibus diebus omni accessu expertibus relictis, modo singulis diebus accessus adest, tertio semper immuni relictis. Quoad *triplices Tertianas & Quartanas* interdum bini accessus eodem die redeunt, interdum diversis diebus; quod ubi contingit, observatur, priorem accessum correspon- dere quarto, secundum quinto, tertium sexto, atque ita deinceps.

M. I. G. Sententia.

Art. 91. Cujuslibet generis sit febris intermit- *Ad fe-* tens a generalibus remediis semper initium su- *bres in-* mendum est. Quando febris locum non cedat, *termi-* sed pertinaciter insistat, ut in Autumnalibus fre- *tentes* quenter occurrit, remedium usurpabitur me- *remedia* thodice: ex Salibus, & Chinachina conflatum,

ejus præparationem alibi tradidimus . Elige-
re etiam ex sequentibus aliquod licebit , quod
æqualis efficaciz fore experientia probavit .
℥. Chin. chin. ʒvj. Aloes Succotrin. Rhabarb. ana
ʒij. Cinnab. natural. Lapid. Hemat. ana ʒ sem.
pulverent. simul & cum Syrup. absynt. q. s. f.
Opiat. , de quo capiat æger magnitudinem avel-
lanæ quotidie mane stomacho jejuno , totidem-
que sero cubitum iturus , usque dum febris eum
deferat , & per duos vel tres dies etiam post
febris discessum continuetur . Hujus remedii præ-
stantia commendabilis & specifica quidem est ,
maxime in quartana febre , quam nulla relictæ
noxæ satis frequenter , sed aliis tractata metho-
dis sæpe recurrentem , felicissime subigit . Po-
test etiam loco ejus sequens usurpari . *℥. Nu-*
cis myrist. n. j. Alumin. ʒj. conter. simul & in
cyath. Vini alb. gener. infund. per horas quinque ;
dein trajecta infusione propinetur tota dosi una
hora ante frigoris accessum , & stragulis deinde
æger probe obtegatur .

Art. 92. Efficacius autem antifebrile , quod mi-
hi perspectum est , sequens ipse reputo . *℥. Ran.*
virid. q. v. quibus intra duobus testis quarum jun-
ctura pasta obturantur probe ad ignem exsiccatis
fiat pulvis subtiliss. per setaceum vel potius se-
riceum trajiciendus . Porro ℥. Rad. Cichor. sylv.
Malv. Apii , quibus exsiccatis subtilissime itidem
seorsim conterantur . His præstis *℥. Pulv. su-*
prad. Ranar. virid. unc. i. pulv. rad. Cichor. ʒ sem.
pulv. rad. Malv. Apii ana ʒ ij. misce . Hujus pul-
veris dosi pro infantibus est ʒ i. pro adolescen-
tulis ʒ ii. & ab ætate annorum 20. usque ad 60.
est ʒ j. Sumitur in cyatho dimidio sp. vin. , cui
vix ac pulvis subsedit , additur tantumdem aquæ ,
quibus recte agitatis fit haustus , & os postea
aceto & aqua abluitur . Tum æger Ptisana uta-
tur

tur ex radicibus cichorei sylvest. & glycyrrhizæ tantum, quousque in dicti remedii usu perseverat. Prima remedii dosi stomacho jejuno hauritur, bihorio vero elapso jus carniū vel Ptisana, trihorio post altera remedii dosi & bihorio iterum elapso Ptisana, trihorio demum post tertia remedii dosi, atque itidem tertio elapso trihorio ptisana. Ægrum fas est, cibum consuetis horis assumere, sed postridie dabitur ei jejuno remedium, & trihorio elapso ptisana; postea cibum capiet, & die vesperscente alteram remedii dosim hauriet, & trihorio post ptisanam. Sic quoque tertia die semel tantum horis matutinis & stomacho jejuno remedio fruetur, & trihorio elapso ptisana. Pro certo habendum nullam dari intermittentem febrem etiam in locis palustribus, & coenosis, ut illud est Zelandiæ, præcipue vero quartanam, ut contumacissimam, quæ huic remedio non cedat. Cavendum tamen a Lacticiniis, Butyraceis, Caseosis & Saccharatis.

Art. 93. Alterum remedium pro omnibus intermittentibus tanto mirabilius, quo simplicius, quodque ut plurimum sanat, malum citreum est. Hoc sub frigoris febrilis accessu nullo adempto cortice devoratur, tum æger stragulis obtectus ad sudandum decumbat.

Art. 94. Vino modice utendum est semper aqua diluto, non solum in febribus intermittibus, sed in continuis etiam remittentibus, etsi aliquid de malignitate participant. Id omne, quod ab eo impendere potest, levis est tantum canitis circumgyratio, aut mentis alienatio, quæ symptomata, utpote leviora & fugacia, non prohibent, quin prædicto modo vinum usurpetur; etenim ægri molestæ ab utili-

Quomodo dandū vinum febricitantibus.

tate, & commodis inde emanantibus affatim compensantur.

Externa
remedia
ad fe-
bris.

Art. 95. Quoad Topica sive remedia externa quorum nonnulli in curatione intermittantium febrium virtutem celebrant, duorum hic meminerimus, quorum vis ceteris præstat. *℞. Cortic. Alliz, Croc. Piper. Sal. comun. Fuligin. q. v. f. pulv. Acet. subigendus, quo in pastam redacto quartus digitus utriusque manus singula die, qua febris imminet, obvolvatur.*

Art. 96. Aliud Topium *℞. Salv. tenuis man. i. Sal. comun. man. i. contund. simul additoque aceto, quantum ovi cortex capere potest, & tantundem Fuliginis durioris & splendentis, diu misceantur omnia, atque addito demum ovi albumine f. emplastrum, carpis utriusque manus applicandum.*

Art. 97. Hujusmodi externa remedia interdum effectum obtinent, sed iis plurimum non est fidendum. Præstantius, quod adhiberi potest, Theriaca est, qua in spiritu vini dissoluta, eadem in accessu frigoris spina dorsi confricatur, ubi febris intermittens est; sed in continuis febribus ad vitanda deliria plantis pedum pasta farinæ plurimum fermentata, & aceto soluta ad moveri potest. Monendum tandem est, ne hujusmodi topicis antifebrilibus manus admoveatur, nisi generalibus adhibitis remediis, secus vero aut recidivæ periculum impendit, aut febris in immodicam longitudinem protrahit.

Morbus
febrim
proci-
dens pri-
mo cu-
ratus.

Art. 98. Observationem demum non præterimus, quod si febris a quovis alio morbo producatur: ut a Diarrhœa, Dysenteria, Pleuritide &c. danda est opera præcipuo morbo, febre quodammodo prorsus despecta; siquidem eodem adempto febris etiam simul subtrahitur, & sponte sua, rite sanato priore morbo, eadem conquiescit.

Mor-

Mortoni sententia.

Art. 99. **F**ebbris intermittens est calor præter-
 naturalis in sanguine accensus ab
 insolita spirituum expansione statis periodis re-
 deunte; in hac autem Febre alior, rigor, calor,
 & sudores se invicem excipiunt; adsunt
 etiam in paroxysmo ægritudo universalis, nau-
 sea, & vomitus, dolor capitis, lumbago, &c.
 Paroxysmus quidem acutus est, morbus vero ipse
 ut plurimum plus minus chronicus. Febbris in-
 termittens simplex facillimè cognoscitur; ultro
 enim sese in conspectum dat: quotcunque au-
 tem sint ejus varietates (h. e. quotidiana, ter-
 tiana, quartana, &c.) *fermentum morbificum*
 omnium idem est, & viribus *corticis Peruviani*
 certo ac cito cedit.

Definitio
Febbris
inter-
mitten-
ris.

Art. 100. „Species Febrium intermittantium
 „ communes sunt: *quotidiana, tertiana, & quar-*
 „ *tana simplex; quotidiana, tertiana, & quarta-*
 „ *na duplex; semitertiana, &c.* Sunt etiam Fe-
 „ bres intermittentes quinto, sexto, vel septimo
 „ die recurrentes. Contigit mihi in praxi vide-
 „ re foeminam per integram septimanam Febre
 „ laborantem, deinde proxima septimana omni-
 „ no liberam; atque ita alternis septimanis fe-
 „ bricitantem, & alternis apyrexiam habentem,
 „ idque per longum tempus. Cortice Peruvia-
 „ no curata fuit. „

Species
Feb. in-
termitt.

Historia
 rara.

Art. 101. Neque venæsectio, neque vomitoria,
 cathartica, aut diaphoretica, neque aliud quod-
 cunque remedium in paroxysmo exhibitum ali-
 quid ad curationem hujus morbi promovendam
 conducere observantur; a justa dosi vini benedi-
 cti trihorio ante tertium paroxysmum expecta-

Curatio.

tum exhibita, sæpius Febrem tertianam curatam novi. *Antimonium diaphoreticum* paulo ante adventum paroxysmi datum interdum morbum tollit; *Sal absynthii* febrifugum audit, & sequentem haustum usu comprobavi, ℞. *Aq. card. ben. the-riacal. stillat. ana* ℥ij. *sal. absynth.* ℥ss. *syrup. limon.* ℥ss. *misce*; sumat æger dimidiam partem trihorio ante paroxysmum, & reliquam in primo insultu. „ In Febribus intermittentibus (inquit Do-„ læus) pro singulari secreto mihi est *lapis Ea-*„ *zuli* a ℥ss. ad ℥j. cum spiritu vini ante paro-„ xysmum traditus. „ Efficacia plurimorum ama-„ rorum (antequam vires *corticis Peruv.* satis ex-„ ploratæ fuissent) experta fuit: uti *absynthii*, *car-*„ *dui benedicti*, *rad. gentian. flor. chamem.* fere spe-„ cifica, & privatim *decocti amari febrifug.* seq. ℞. *Fol. matricar. card. ben. absynth. summit. cen-*„ *taur. vin. flor. cham. ana* mj. *sem. card. ben. citr. ana* ℥j. *sal. absynth.* ℥iss. *coq. in aq. font. q. s. ad* ℥ss. *dosis* ℥iij. vel iv. quarta quaque hora extra paro-„ xysmum. Item pulvis febrifugus sequens; ℞. *flor.*„ *cham. subtilissime pulverizat.* ℥j. *antimon. diaphoret.*„ *sal. absynth. ana* ℥ss. m. f. pulvis pro una dosi quar-„ ta quaque hora extra paroxysmum, utilissimus est quidem iis, quibus vires *corticis* defecerunt, vel quando ob *ἰδιουμπαρσίαν* non possumus exhibere. In confesso est his & hujusmodi remediis Febres intermittentes æstivo tempore quandoque cura-

Cortex ri: *Cortex* vero *Peruvianus* consensu medico-„ *Peruvia-* rum (hodie omnium) est *catholicum febrifugum*;„ *rus re-* quod omnes Febres intermittentes, in quavis an-„ *medium* ni tempestate, in omni ætate, & temperamento,„ *poliobre-* penitus, cito, tuto, & feliciter sanat: neque o-„ *rum.* pus est, ut medici ingenia sua amplius torqueant in aliis febrifugis explorandis. „ *Cortex Peru-*„ *vianus* sudorem omnino nullum excitat; tam-„ tum

„ tum omnigenas concoctiones, e vestigio emen-
 „ dat, sine ulla sensibili evacuatione, nisi aliquan-
 „ do alvum aliquoties, idque leniter admodum
 „ moveat. Modus exhibendi nunc dierum omni-
 „ bus innotescit. *Hactenus* de Febris inter-
 „ mittentibus simplicibus.

Art. 102. Symptomata vero Febr̃ium intermit- *Febris*
 tentium *spuriarum* nonnumquam sunt perquam *inter-*
 vehementia, & typus Febris ipsius in variis suis *mittent*
 stadiis sub larva vomitionis, diarrhoeæ, doloris *spuria.*
 alicujus gravissimi, &c. absconditur. A periodi-
 ca symptomatum vehementium exacerbatione &
 remissione, nec non ab urina lateritii coloris
 verus morbus potissimum dignoscitur: alios et-
 enim morbos frequentissime simulat, unde ar-
 reptâ occasione, creantur nunc hæc, nunc illa gra-
 vissima symptomata, vomitiones, diarrhoeæ tor-
 mentosæ, cholera morbus, colica, dolores late-
 ris punctorii, tanquam pleuritici, ophthalmia,
 apoplexia, hemicrania, spasmi universales, vel
 particulares, dolores nephritici, &c. „ Item do-
 „ lores parturientium *amuli*. In foemina quadam
 „ hujusmodi dolores, alternis diebus recurren-
 „ tes, duobus vel tribus a partu septimanis ac-
 „ cedentes semel ipse observavi, idemque ab
 „ alio observatum fuisse audiui. Et (quod ræ-
 „ rius adhuc videtur) *dolorem unius cruris* pe-
 „ riodice revertentem in homine quadrage-
 „ nario semel in praxi adnotavi: dolor fuit vehe-
 „ mentissimus per 24. interdum per 30. horas
 „ durans, unde ingens intumescencia totius
 „ membri superveniebat; tumor cruris erat qua-
 „ si partim *flatulentus* & partim *œdematosus*,
 „ qui non nisi longo post tempore fasciatione
 „ ad pristinam dimensionem redactus fuit. Am-
 „ bo hi ægroti cortice Peruviano sanati fuerunt.

Art. 103. Versatilis quidem est horum affe- *Curatio*

Etuum Proteiformium genius, sed ab uno eodemque fermento pendentes omnes, unica antidoto, nempe *cortice Peruviano*, cum prudentia adhibito, facile profligantur.

Prognosi. Art. 104. Nemo unquam a Febre intermittente interimitur, nisi in primo paroxyſmi ſtadio, durante, ſcilicet, algore ex ſpirituum oppreſſione orto. Febres intermittentes, ubi valde chronicæ evadunt, viam ſternunt ad alios morbos maxime funeſtos.

Historia. Art. 105. „ Sequens hiſtoria intercaſus oppi-
 „ do raros merito recenſeri poteſt. Paucis ab-
 „ hinc annis Vvincauntionix in agro Somerſe-
 „ tenſi mortuus eſt ſenex, Theologus, nomine
 „ *Bulgin*; hic annum agens trigefimum quar-
 „ tum in Febrem intermittentem quotidianam
 „ incidit, quæ per totum vitæ curſum (dictu
 „ mirabile, veriſſimum tamen) per ſexaginta
 „ ſcilicet annos, uſque ad vitæ in extrema ſe-
 „ neſtute terminum, duravit. Febris cum fri-
 „ gore præeunte, calore & ſudore ſuccedentibus
 „ per diuturnum iſtud ſpatium, utcunque non
 „ ſemper cum eodem ſæviſſimo impetu, con-
 „ ſtanter tamen, quotidie illum invaſit. Poſtre-
 „ mo *ſenio* potius quam morbo confectus nona-
 „ geſimum quintum agens annum obiit. Hæc
 „ narratio a filio & filia prædicti ſenis adhuc
 „ viventibus, fidei indubitatae ambobus, renun-
 „ ciata eſt.

FEBRES INTERMITTENTES.
cum Caro.*Verlhof sententia.*

Art. 106. **E**X tertianarum genere fuerunt omnes, in quibus id quidem Fe- *Carus*
cum in-
termit-
tentibus
sociatus.
brium symptoma observavimus, vel observatum
comperimus, simplices aliæ, aliæ paroxysmo se-
cundario adscito duplices, quamquam *Galenus*
soporem quotidianæ maxime proprium esse no-
tat, & *Forestus* Carum ex quartana memorat.
Tempus quo id contingit, in tertium primariæ
accessionis paroxysmum, sive diei morbi quin-
tum, aut ubi accessiones valde anticiparunt in
quartum incidit: nonnullos serius afflixit.
Fuit sane hoc ipsius febris & paroxysmi sympto-
ma, qui cum aliquo sensu consuetorum mo-
tuum, iusto tempore plerumque incepit, statim
deinde interdum, alias vero nonnisi sensim,
& cum incremento accessionis, sopore illo ac-
cedente, & increcente. Pulsus in plerisque fre-
quens, in unico per novem ante mortem dies
continuos apoplectico tardissimus, in quibusdam
exantlato quidem tempore paroxysmi, non au-
tem ipso affectu soporoso, naturalis, in multis
durus fuit, & intermittens. Verbis sanè *Enga-*
leni ejusmodi accessionem describere licet: pro-
fundo somno, caro scilicet correptus absque omni
sensu ac motu jacuit, ut ne digitum haberet,
quem dimoveret, & sola respiratione a mortuo di-
ferret; hæc autem plurimis ore hiant singul-
tim, & cum stertore fiebat, quo maxime indi-
cio, apoplexiam a Caro, gradu ad illam proxi-
mo, dirimere solent Auctores: Nullis vellica-
tionibus excitari atque revocari ad se potuit, &

si post vellicationes punctionesque, vel post phlebotomiam, scarificationes, sternutamenta, clysmata acria, cauteria, leviter aliquando oculorum palpebras attolleret, statim tamen rursus ille connivebant; interdum inæqualiter, ut altera semiclausa appareret, vel manebant immotæ & apertæ sine visionis sensu. Idque malum quibusdam in singulis febrium accessionibus recurrebat, iisque desinentibus sponte solvebatur, etsi obtusiores tum quoque sensus viderentur, neque plane integri, sed quodam quasi stupore præoccupati: paroxysmo etiam deinde gravius in dies affligere solito. Nonnullis prima statim vel alteratalis accessio exitio fuit. Aliqui evigilarunt quidem finiendi paroxysmi tempore, sed diutius longe, quam ante hunc laborantes, magis alii, alii minus: continue febricitantes, somniculosi, magno stupore, immo interdum veluti catoche, seu catalepsi affecti delirantes, anxie, & assidue inicturientes, motibus vel haud voluntariis, vel anxiiis jactati, dextro latere interdum, tanquam ab hemiplegia immoto, vel parum mobili. Hi vero sub ingressum novi paroxysmi plerumque sopore iterum, immo sæpe apoplexia insanabili correpti, sub eo ipso vel quod paucioribus evenit, post aliquot demum dies, sensim exspirarunt. Complures mature satis advocato Medico, posteaquam medicina & tempore excitati fuerunt, melioris, & præcipue longioris remissionis, aut intermissionis participes facti, medicamentis generosis ab instante paroxysmo, & mortis periculo vindicati sunt. Pauci sine ejusmodi remediis, sponte naturæ, post toleratos aliquot paroxysmos soporosos, sub longo languore febris intermittens, variorumque symptomatum, vel convaluerunt sensim, vel consumpti, aut relapsi, atque extincti sunt.

Art. 107. Unicum mihi visum est exemplum Casus.
in muliercula sexagenaria, quæ quidem extra ac-
cessiones aliquantulum, post externa remedia,
sensuum vigorem recepit, medicamenta vero nul-
la admisit, & nihilominus tandem, diu misere
conflictata, rediit cum sanitate in gratiam.

Art. 108. Neque vero ullum ex remediis, Corticis
Peruvi-
ani in
his fe-
bribus
præstan-
tia.
quæ febrifuga audiunt, in tam ancipiti rerum
statu, certum satis fidemque comperimus, præ-
ter unum illum Corticem Peruvianum sive Chin-
chinam tantopere multis invisam. Ejus vero
virtus omnium manifestissima in restituenda su-
bito oeconomia corporis, horrendis symptoma-
tibus per paroxysmos turbata, excitare potius ad
rectum usum detegendum, vel confirmandum,
& contra abusus muniendum, cordatos medicos
deberet, & imperfectis de modo agendi ideis,
ad vituperandum hoc divinæ providentiæ mu-
nus, & castrandam generoso præsidio materiam
medicam febribus medentem seduci non pati-
mur.

Art. 109. Atque in hoc quidem, de quo scribi- Modus
usurpan-
di.
mus, rerum statu pulverem corticis electi subti-
lissime tritum, in substantia, quod dicunt, lon-
ge quippe, ut in confesso est, & in vulgus no-
tum, efficacissimis omnibus anteponimus præpa-
rationibus pharmaceuticis, & chemicis, quas
ipsi magni alioquin æstimamus. Exeunte igitur,
& in intermissionem, immo vel remissionem
satis observabilem terminato paroxysmo, facta
vel omissa pro indicantibus evacuatione, dra-
chmam integram pulveris tertia, immo vel al-
tera quavis hora exhibuimus, quocunque modo
minime nauseoso deglutiri commode potuit, ut
uncia una aut etiam amplius in accessionum in-
tervallis assumpta, vel penitus instantia sympto-
mata averteret, vel minueret certe, & pericu-
lum

lum amoliretur. Et longe tunc profecto tutius major hæc, & repetita, quam exigua, & vano medicamento timore, refracta, & rara dosis, aut nescio quibus correctionibus castrata, præbetur. Quicquid enim metuendum est, id non a corticis particulis naturæ amicis, sed a perniciosa materia morbosa est metuendum, si incassum imbelli remedio tentata fuerit, proximo forte paroxysmo jugulatum relinquet ægrum, quem servare potuisset. De hoc morbo sane verum est, quod poeta de animo iracundo canit:

nisi servit.

Imperat: hunc franis, hunc tu compesce catenis.

Quandiu continuandus.

Art. 110. Declinante accessione repetendus est statim cortex, nulla que alia medicina, nisi quid urgeat, interpolatus, in notabilium paroxysmorum intervallis tertia vel quarta quavis hora dandus, neque desistendum est prius quam paroxysmi fugati sint penitus, & æger cum sanitate in gratiam rediisse videatur: adjuvante optima diætâ, & quam primum fieri potest, moderato motu in aere liberiori, puriorique. Pulsus æquabiliter perpetuo bonus sit, lingua sana, urina qualis per sanitatem consueta, vel solito limpidior aliquantum, & copiosior, appetitus naturalis, vel naturali acrior, nullus dolor, nulla functionis turbatio, quæ sub febris acciderunt, præsertim per intervalla paroxysmorum, affligat amplius, lassitudo corporis quasi ulcerosa, & cutis color febrilis evanuerit, antequam a continenti corticis usu desistas. Atque hæc, si, quid in arte certi est, certissime ita evenient intra unius plerumque, vel saltem alterius hebdomadæ decursum. — Imminui dosis periculo superato potest, sed non facile, his quidem in casibus, ubi vitæ periculum instans adfuit, infra scrupulum unum, vel drachmam dimidiam vel

quan-

quantum fere æquipolleat decoti aut infusiter, quater, quinquies, vel sexies, si fieri potest, quotidie assumendum.

Heisteri Sententia.

Art. III. Speciatim vero *sitim*, *astumque nimium moderantur*, ac simul sanguinem spissum *febris &* attenuant, acremque temperant, partim *sufficiens potus aquosus*, ut Infusum Theæ, Coffeæ, *symptomatum curatio.* veronicæ, card. bened. præsertim in principio paroxysmi, aliaque similia: item *cerevisia tenuis* cum paucis nitro vel frustulis dissecti pomi citri adjectis. Vel præsertim in progressu paroxysmi, aut ejus declinatione, quando cum primis ægri potum calidum averfantur, *decoctum hordei citratum*, aut blande acidulatum, v. g. spir. sulph. vitriol. vel syrup. citri, ribesior. berberis, vel cerasor. acid. vel etiam aqua simplex pane tosto alterata cum vel sine frustulis citri; vel syrupo acidulo q. s. ad gratum saporem, vel aqua simplex cum paucis vino & saccharo, additis vel omissis citri frustulis; partim *mixture diaphoretica* ex aquis destillatis temperatis, cum pulveribus temperantibus, & leviter diaphoreticis, pro materia vitiosa febrili cum corrigenda tum e sanguine expellenda: ut Lap. cancr. antim. diaphor., aliisve temperantibus jam *alibi* laudatis, addito syrupo quodam grato ex modo laudatis. Quibus ita, una cum *dieta parca* & tenui, per aliquod tempus rite usurpatis, hæc febres, præsertim vernaes, post aliquot paroxysmos, intra quatuordecim dies, vel citius quam optime sæpe solent profligari.

Art. IIII. Quodsi vero intra hoc tempus non fiat, primæ tamen viæ bene prius purgatæ, & *Specificæ antifebrilia.* vitiosi humores ex parte correcti sint, tunc ad *Speci-*

Specifica antifebrilia id est, febrim peculiari virtute sistentia accedendum est, qualia plurima laudantur, & inter hæc maxime *Specificum antifebrile Croliz*, aut *Strobelbergeri*, itemque *Regulus Antimonii medicinalis*, aliaque similia terrea ad ℥j. bihorio vel trihorio ante paroxysmum exhibita, commendantur. Ita & *mixtura febri-fuga Croliz* ex aquæ cardui bened. unc. ij. Sal. absynth. ℥. s. succ. citr. ℥iij. constans, vel in robustioribus ex Sal. absynth. ℥j. & succ. citr. ℥iv. aut Essent. absynth. ℥j. cum Essent. vitriol. ℥. sem. ante accessionem semel iterumque data, sæpe juvat. Præterea omnia *salia neutra* præcipue vero tart. vitriol. arcan. dupl. Sal. digestiv. Sylv. Sal. armoniacum, Sal. antimoniatum &c. nec non *salia fixa* majori paulo dosi & sæpius exhibita febres has sæpe profligant. Quidam *alumen* vel per se ad ℥j. vel ℥. sem. vel cum N.M. part. æqual. datum valde extollunt, sed ob nimiam, adstrictionem, & inde metuenda mala, valde suspectum est; id quod & de *pulvere galarum*, qui a Gallis in Acad. Reg. ad ℥j. valde laudatur, sentiendum esse puto:

Nonnulli *piper* quoque præsertim phlegmaticis ad grana xx. & ultra; alii *piper hispanicum* vulgo dictum, ex spiritu vini aliquoties sumptum valde commendant, quæ vero ob fervorem nimium facile præsertim imbecillis nocent, & calorem præternaturalem, vel alia mala inducunt.

Alii *Nucem Vomica*, & huic affinem *fabam S. Ignatii* a gr. v. ad x. vel solam, vel cum aliis mixtam, & ante accessionem datam magnopere laudant; alii *vitrum Antimonii*, immo ipsum *arsenicum* ad gr. j. vel ij. immo gr. iij. pro specifico euporisto habent; quæ vero tanquam violentiora & venenata, aut ad naturam venenorum quam proxime accedentia, non facile, & forte

forte non nisi in casu necessitatis, ubi securiora nihil præstarent adhibenda. *Flores chamomeli* contra in decocto, quam in forma pulveris aut electuarii, larga dosi propinati, securissimi sunt, & multum sæpe in febribus hisce debellandis præstant. Ita & *radix pentaphylæ* aut *Imperatoriæ* aut *gentianæ* vel & *cortex cascarilla*, vel cortices aurantium in pulvere vel electuario larga & sæpe repetita dosi, febres has egregie, & tuto sæpe tollunt. Id quod etiam non raro *crocus martis antimonizatus*; quem Stahliani valde extollunt perficit, itemque *pilule Vildegansii* dictæ. At si securiora ex his debitum effectum non præstant, sicuti sæpius contingit, aut certioris effectus causa omnibus illis tamquam minus certis uti nolumus, ne scilicet ægri nimis diu a febre torqueantur, *corticis peruviani* sive *china china* legitimus usus (licet multis adeo exosus sit, & multa obloquantur) intermittentes quascunque certo & tuto etiam profligat.

De Gorter sententia.

Art. 113. Quæ medicamenta febris causam extinguunt *Antidota* vocantur. Febris vero continua causa, quæ non fuit ex intermittente orta, nullo mihi cognito medicamento extinguipotest, at vero in intermittentibus varia summa laude extolluntur. Quid non Riverius in suis observationibus prædicat de febrifugo suo ad gr. xx. exhibito, quod alvum movet, & quandoque vomitum, quamvis præparationem alto silentio supprimat? Quibus encomiis non extollitur *Sal Ammoniacum* & ejus spiritus? neque *Gentiana* neque *Chamamelum* auctoritate carent; Imo *Alumen*, aliaque adstringentia celebrantur. Omnibus tamen palmam præripit *Cortex China china*!

Expe-

Experientia in his omnibus est consulenda. Si autem quis invenerit tutissimum & promptissimum, ægrotantium saluti consecrare velit exopto. Ego vero in multis horum, licet omnem cautelam adhibuerim, raro felicem successum obtinui, nisi quandoque in sale Ammoniaco. Verumtamen nunquam tanto successu, quanto in Cortice Peruviano, hujus ergo usus paulo altius inquirendus.

*Cortex
Peruvianus.*

Art. 114. Multa accepit hic Cortex nomina, omnium frequentissime cortex *China china*, vel *Kina-Kina* & *Peruvianus* ex arboris & regionis nomine, item *pulvis patrum* quia Patris Societate Jesu Romæ pauperibus gratis eum largiebantur; etiam *pulvis Cardinalis de Lugo*, quia primus ex India in Hispaniam eum transfudit.

Nativitas.

Art. 115. Crescit hæc Arbor in America Peruviana circa Loxam in montis cacumine, non valde procera est, ornatur floribus albis & cœruleis, foliis instar prunorum, & seminibus quasi cucurbitæ; neque in his, neque in ejus transfudante resina tanta vis febrifuga invenitur, quanta in cortice.

Electio.

Art. 116. Eligendus recens, vegetus, non admodum crassus, a ramulis derasus, facile terendus, odore peculiari grato, saporeque aromatico amaro, atque colore cinnamomi, præditus.

Art. 117. Inclaruit ejus virtus primo in Regno Peruviano 1616. brevi postiterum suppressa, at majori studio exculta iterum 1648. multa tamen passus est dein fata, quæ lites hucusque nondum compositæ sunt.

Usus.

Art. 118. Usus Corticis primarius est in febribus intermittentibus puris, atque symptomatibus obstinatissimis ex febre intermittente productis.

ductis; atque etiam in febribus continuis, ex causa intermittantium natis: extinguit enim febris intermittens causam, sine sensibilis evacuationis augmento, verum omnibus ex phænomenis insensibilem perspirationem augere videtur, qua via forte subactam materiam educit, quum aliis in evacuationibus nullum præbeat indicium. Si vero simul hæreat cacochyliæ in primis viis, ea primo purgante, vel emetico educenda, si plethora urget, venæ sectione minuenda, sed tunc statim exhibendus, priusquam vires detritæ non possent in actum ducere medicamentum; quando frustra sæpe præscribitur, majori dosi exhibendus, ut observatio docuit.

Art. 119. In aliis præterea morbis quandoque, sed tamen minus certe, multa præstat, ut in debilitato tono solidorum, hysteriis, hypochondriacis, ventriculi inappetentia, atrophia ex nimia humoris evacuatione, chlorosi, Leucophlegmatia, hydrope, vel podagra enervatis; epilepsia, & convulsionibus istis, quæ ex inanitione excitantur, hemicrania, aphtis, & singultu in fine febris, si in longum tempus protrahantur, atque omnibus symptomatibus a febre intermittente relictis, egregium etiam inter roborantia, sua leni adstrictione, & amaritudine meretur nomen.

Art. 120. Prudens vero Medicus ejus usum intermittet aliquandiù, si ipsa febris intermittens inveteratum malum expellere possit; aut si aliquid prius sit educendum. Quandoque etiam coacti sumus ob vehementiam febris statim exhibere corticem, & dein educere humorem malignum, summo cum successu; præstat enim mutare methodum, quam ut, nimis religiose servata Methodo, pereat æger.

Art. 121. Ejus usus non modo suspectus, sed *Abusus.*
etiam

etiam damnandus in febribus symptomaticis , humorum putredine , acrimonia scorbutica , pure latente , melancholia biliosa , cacochymia , bile acri adusta , inflammatione , erysipelate , multisque febribus epidemicis , & pestilentialibus , ab acri inquinazione , atque in omnibus febribus acutis continuis ; febris enim intermittens causam , non vero continuam extinguit .

Præparatio corporis .

Art. 122. Antequam exhibetur , non est opus ulla præparatione , nisi in primis viis hæreat cacochylia , quæ educenda est ; omnes enim evacuationes , aliaque , quæ corpus debilitant , actionem hujus febrifugi minuunt ; si vero alvus nimis laxa sit , vel vomitus urget , compescenda prius ; ingressum enim corticis in vasa lactea impediunt .

Exhibendo tempus & dosis .

Art. 123. Tempore Apyrexia , vel quando ea adesse debebat , incipiendus , & continuandus singulis vel alternis horis ejus usus ad semidrachmam , vel ultra pro dosi , donec redeat paroxysmus ; continuandus finito paroxysmo , donec cedat febris , quæ quandoque uncias duas , vel tres exigit , præprimis si corpus fuit debilitatum , vel si quartana in continuam fuit conversa : verum tertiana quandoque drachmis duabus cedit . Licet unica vice ad unciam sumatur , nulla inde fuit facta molestia , & tamen sine recidiva curata fuit quartana , & plusquam semel vidi in ægris , qui suo periculo una vice integram quantitatem , partitis vicibus assumendam , devoraverant , ex quorum imprudentia didici , non opus esse , ita timide dosin definire . Verum in aliis morbis §. 100. sufficit , si quotidie ad semidrachmam , vel drachmam unam assumatur . Hoc tempore non est opus , æger rigidissima inedia vexetur , aut calidiori regimine , imo jugis decubitus in lecto remoratur operationem ; sed com-

men.

mendet modo alimenta facilis digestionis. Nihil præterea addendum cortici, nisi aliquod symptoma talia exigit. Sæpe addere debemus anodynum, vel adstringens, quia alvum quandoque laxat: verum purgantis admistio ejus minuit vires. Præscribitur omni forma: pilularum, electuarii, infusionis, decocti, clysmatis. Sed simplex dosis in substantia tantum valere solet, quantum duplex in infusione.

Art. 124. Fugata febre nihil molliendum; nisi *quid potest a-*
quod continuetur per mensem quotidie assume- *gendum.*
re semidrachma ejusdem corticis aut unica per
14. dies; ita enim metus recidivæ evanescet.
Si purgante vel vomitorio vexetur æger, brevi a
febre curatus, ut plurimum febris recidivat.
Quia vero curata febre ut plurimum nimis au-
getur appetitus, cavendum est, ne æger se ali-
mentis repleat, sed modicam servet diætam. Ita
tuto, & felicissime curatur febris, sine recidivæ
periculo.

Farrago sententiarum.

Art. 125. Post accuratum examen totius histo- *Causa*
riæ Febrium intermittantium causa proxima con- *proxima*
stituitur *viscositas* liquidi arteriosi, supervenien- *Feb. in-*
te dein causa quacunque velocioris, & fortioris *termi-*
contractionis cordis, atque resolutionis ejus, *tantium*
quod stagnaverat. *Boerhaave.*

Art. 126. Galenus hac methodo curavit quar- *Galeni*
tanæ; primò propinavit vomitorium, die se- *metho-*
quenti dedit *succum absynthii* bibendum, & de- *odus in*
nique bihorio ante paroxysmum dedit *theriacam.* *quarta-*
„ Sed his adminiculis tutò inniti nequimus. Fe- *na.*
„ bris tertiana veteribus, quibus vires antidoti
„ Peruvianæ ignotæ fuerunt, curatu erat valde
„ difficilis, & quartana opprobrium medicorum

„ audiebat; at hodie secus esse nemo non noscit:
 „ quo enim longius recedunt intermittentium
 „ paroxyfmi a naturam Febrium continuarum,
 „ aut quo majus est intervallum inter acces-
 „ siones, eo minus periculi ab illis impendit,
 „ quoniam amplior est locus commodiorque cu-
 „ rationis.

*Epithe-
mata.*

Art. 127. Epithemata & pericarpia quandoque profunt Febribus intermittentibus abigendis; ejusmodi est *Emplast. febrile pro carpis D. Michaelis ℥i. Fulig. furni splendent. ℥i℥. terebinth. ℥vj. tel. aranear. ℥℥. camphor. ℥ij. ol. scorpion. q. s. m. f. emplast. pro carpis.* Mortonus duo sequentia ex propria experientia commendat. *℥. Pulv. oliban. terebinth. venet. ana p. e. f. pericarpia. ℥. Fol. chelidon. maj. ruta ana m. j. fuliginis e lignis combustis, sapon. venet. salis marin. ana p. e. cum aceto acerrimo f. massa, &c. „ Empl. rubrum febrifugum* sequens scrobiculo cordis applicatum in tenelis infantibus frequenter prodesse deprehendi. *℥. Thur. subtilissime pulv. ℥v. minii ℥j. ol. olivar. q. s. f. empl.*

*Enema
febrifugum.*

Art. 128. Qui corticem Peruvianum ore assumere pertinaciter respuunt, curari possunt cum enematibus ex ejusdem decocto; istiusmodi est *enema febrifug. Fullerii*; sed pueris certius solet opem fere quam adultis.

Ad algorem.

Art. 129. Dum febrilis horror, aut frigus universam cutim convellit, tum *oleum destillatum caryophyllorum* epigastricæ regioni illitum remissionem horroris undequaque procurat. *Baglivius.*

*Vires
succi limonium.*

Art. 130. Ansam mihi suppeditari autumabam, aliquid ad artis nostræ incrementum ediscendi, idque aliquoties tentans, non infortuniter processit; in Febribus scilicet intermittentibus, circa initium proxysmi, *haustu calido succi limonium*
cum

cum saccharo & aq. fontan. tantum semel atque iterum exhibito; exacerbationes vel in totum cessasse, vel saltem in dies præter expectationem simul cum siti deferbuisse, & intra paucos dies plane siluisse, deprehendi, subsequente utique manifesto effectû, urinæ scilicet, & inprimis sudorum larga promotione. *Piso* p. 315.

Art. 131. Sunt & alia nonnulla remedia a quibusdam plurimum decantata, tanquam Feb. intermit. specificè curantia. Nempe *pulvis corticis in erioris fraxini* a ℥j. ad ℥j. cum paucis *sale absynthii* in vehiculo idoneo exhibitus, more *corticis Peruv.* vires ejusdem adæquare, immo superare, dicitur; foelici cum successu sæpe exhibuit doctissimus & insignis medicus *D. Hen. Vaghan.* Idem perhibetur *de cortice ulmi prope radicem.* *Flores salis armoniaci* optimum febrifugum censentur, præcipue in Febribus intermittentibus. De quo remedio audiatur clarissimus *Boerhaave*: non novi (inquit ille) melius febrifugum quam gr. xx. *salis armoniaci* in calido haustu, una vel duabus horis ante paroxysmum. *Succus rad. gentian. inspissatus*, & in vehiculo appropriato cum myrrha assumptus propter ejus vim febrifugam non immerito usurpari potest ad instar cort. *Peruvian.* cujus succedaneum fere est (inquit *Ettmullerus*.) Sed forsitan *cortex rad. prunæ sylvestris*, i. e. *spinæ nigre* vulgo appellatæ, est adhuc præstantius medicamentum, quod olim honorandus *D. Sloan* in literis mihi datis communicavit. *Camphora* est remedium diaphoreticum nobilissimum, & omnium adhuc notorum certissimum. Insignis est ejusdem usus in curandis Febribus intermittentibus, & viribus corticis *Peruviani* magnopere opitulatur.

Art. 132. Unicum hic, quod multa experientia didisci, in bonum commune evulgari volo de

Recidi-
va ionis
præcau-
tio.

Recidivazione præcavenda; nimirum, Febre cor-
tice Peruviano prius fugata, cui penso istius re-
medii unica vel ad summum sesquiuncia semper
sufficit, intra triduum vel quatrimum propinare
soleo *medicamentum aliquod chalybeatum*, & huic
operi levissimas præparationes eligo, & in hunc
fere modum præscribo. *℞. Vin. chalybeat. pharm.*
Londinens. ℥ij. tinctur. stomach. amar. Quincii ℥iij.
vel *iv. misce* dosis *coch. iv. vel v. bis in die*, vel
loco hujus infusum chalybeatum amarum sequens.

Infusum ℥. Limatur. ferri ℥iv. succ. limon. N. iv. aurant.
chalybe- acid. N. vj. infund. per hor. 24. deinde add. rad.
ae. amar. gentian. ℥. aristoloch. rotund. ℥j. cort. uvinteran.
rad. calam. arom. ana ℥ij. summit. absynth. centaur.
min. ana p. j. vin. alb. ℥iv. aq. gent. comp. ij. in-
fund. frigide per septimanam, & decantetur præ-
usu. Vel ℥. Flor. sal. ammoniac. martiat. ℥ij.
myrrh. elect. ℥j. rubig. ferri ℥ij. extract. rad. gent.
g. f. m. f. pil. med. dos. iv. bis in die, superbiben-
do infus. stomach. amar. sequent. ℥. Rad. zedoar.
Infusum cassumuniar. ana ℥i℥. cort. flav. aurant. Hispa-
lens. ℥ij. sem. cordamom. min. ℥℥. summit. absynth.
amar. Rom. p. ℥. infund. in aq. bullient. ℥℥. coletur fri-
gide. Atque ita ventriculo optime consultum est,
ut res in vado sit; Febris nullatenus recrudescit,
nisi ex gravi aliquo sex rerum non naturalium
errore. Interdum in casu ancipiti, & in corpori-
bus valde debilitatis chalybs & cortex Peruvianus
junctim maritati melius cedunt, quam alteruter
eorum seorsim exhibitus; in hunc finem deco-
ctum nigrum sequens est remedium appropri-
atum; ℥. Cort. Peruv. pulverisat. ℥ij. chalyb. cum
Deco- tart. præp. ℥j. coq. in aq. font. ℥iij. lento igne ad
stumni- ℥i℥. addendo sub finem coctionis cinnam. acutissim.
grum. ℥ij. colatur. add. aq. absynth. magis comp. ℥℥. m.
Tinctu- vel in magis delicatulis vinum chalybeatum præ-
ra bur- dict. & tinctura sequens usus tempore commissa;
gundica. dosi

Deco-
stumni-
grum.

Tinctu-
ra bur-
gundica.

dosis

dosis ad coch. iij. *℥. Cort. peruv. pulverisat. 3x. calam. arom. cinnam. ana 3j. cort. aurant. 3ij. cochinel. 3ss. macera per biduum in vin. alb. Uliſſiponenſ. 15iſs. filtretur, &c. hanc ob venuſtum colorem tincturam Burgundicam vocant.*

Art. 133. Febre proſtigata victus parvus ac tenuis, medicamenta amara, ſtomachica, & roborantia adhuc aliquandiu ſedulo continuanda, hauſtulus vini generoſi in paſſu uſurpandus, frigusque diu vitandum, & ne morbus hic, quod ei alias ſolemne eſt, facile recrudescat, præſertim ſi jam antea pertinacioris fuit indolis, aut jam ſæpius recruduit, bis terve in die portio aliqua corticis chinæ vel caſcarillæ, & quidem in tertianis curatis poſt octiduum a ſuperata febre, in quotidianis vero & quartanis tertia quavis, poſt debellatam febrem, hebdomanda ſalutariter uſurpanda, ſubjuncto, tempore idoneo, motu corporis moderato, & præſertim ambulatione, aut equitatione, aut vectione frequenti.

Art. 130. Si ægri *Sudores* in paroxyſmi declinatione oriundi refrigeratione corporis impediuntur, ii augent laſſitudinem corporis, morbum protrahunt, & varia inſolita aequæ ſæpe gravia hoc ipſo ſymptomata excitant, & febres leves facile in lentas periculoſiſſimas, hecticam, cachexiam, oedemata, aſthmata, hydropem, alioſque peſſimos morbos tranſmutant, quæ mala ſæpe inſonti Cortici Peruviano, ſed falſo adſcribuntur.

Art. 135. Frigus nimium in paroxyſmo quarundam febrium, & præſertim quartanarum lenitur calore lecti, potu calido, baſſamis ſtomachicis, & aromaticis, ventriculo ac ſpinæ dorſi calide illitis; item ſpiritu vini rectificato, lintheis complicatis calide ventriculo impoſitis, ſtragulis ſufficientibus, lapidibus, aliis que machinis calidis pedibus ſuppoſitis.

Art. 136. Febre debellata si cibi desiderium diutius deficiat Rec. Vitrioli Martis Ludovici, aut Elixir vitrioli Mynsicht bis terve in die ad gutt. 50. sumpta egregie profunt, interpositis lenibus purgantibus.

Art. 137. Oedemata post intermittentes, ut sæpe vel ob potum nimium, vel ob sudorem impeditum relictæ, frictionibus, motu corporis, exercitationibus, salibus digestivis, atque essentiis, itemque infusis amaris, cum vino, aut cerevisia paratis, præsertim ex cardo benedict. summit. absynth. bacc. junip. cort. aurant. & cascarill. immo & ipsius chinæ chinæ curantur, interpositis subinde remediis martialibus, lenibusque laxantibus, atque observata simul tenui ac parva diætâ, & vitato potu nimio.

Art. 138. In febribus intermittentibus senum, soporosis dictis, ubi ægri altero vel tertio paroxysmo in soporem gravem, ut tertio vel quarto paroxysmo in apoplexiam lethalem incidere solent, ut præstantissimi practici observarunt, mox post paroxysmum, quo sopor ille accessit, cortex peruvianus sæpe & larga dosi est exhibendus, ut sequens paroxysmus avertatur; alias ægri plerumque in sequenti paroxysmo apoplectici moriuntur. Confer hanc ob causam utilissima scripta celeb. Itali Torti & V Verlof nostri de febribus. *art. (106.)*

Art. 139. In febribus inveteratis aliquandiu salia, vina medicata amara, & pilulæ amaræ balsamicæ, interjectis purgantibus, sunt usurpanda antequam specifica sive sistentia exhibeantur.

Art. 140. Quoties ex quartana hydrops oritur, nullo remedio melius uterque curatur morbus, quam cortice peruviano, tam in substantia, quam in infuso recte exhibito. Conf. Filii Dissert. de quartana, & hydrope per corticem Peruvianum curatis anno 1740. Helmstadii editam.

FEBRES REMITTENTES.

Mortoni sententia.

Art. 144. **F**ebbris $\Sigma\omega\upsilon\chi\eta\varsigma$, continens five remittens ex manifesta *exacerbatione* & *remissione*, singulis ut plurimum, vel alternis, diebus, statâ & certa hora, periodice recurrentibus, facillime dignosci potest; atque equidem ab intermittente inde duntaxat discriminatur, quod calor febrilis in intervallis hujus Febris nunquam penitus extinguatur, & singuli exacerbationis paroxysmi cum algore & horrore minoribus incipiant. Sub finem cujuscunque paroxysmi æger sudoribus plerumque perfunditur; & urina, quæ durante paroxysmo rubedine multa perpetuo tingitur, in remissionibus hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. Atque sic se habet typus Febris remittentis simplicis.

*Typus
Febris
remittentis
simplicis.*

Art. 142. In Febre verò remittente *spuria* gravia symptomata in genere nervoso suboriuntur, nempe: dolores in musculis, tendinibus, & membranis, rheumatismum, pleuritidem, colicam, ceterosque id genus morbos inflammatorios, & spasmodicos simulantes, & a partibus glandulosis enormes subsequuntur humorum excretiones; vomitio scilicet immodica, cholera morbus, diarrhoea, dysenteria, &c. unde typus $\Sigma\omega\upsilon\chi\eta\varsigma$ *spuria* multum obscuratur: paroxysmi periodici inde incerto, & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent: scilicet evacuatione, vel dolore aucto, calor, & pulsus minuuntur; his autem diminutis illi augentur.

spuria.

Art. 143. Febris remittens simplex, quæ talis, & quam diu talis, raro admodum, si unquam, est funesta; priusquam exitialis evadat, typum

Prognosis.

ac genium suum mutat, & transit in *Συβοχον malignam*. Spuria vero sive mixta, ut ut in se non sit funesta, ratione symptomatum adjunctorum ægrotantes haud raro e vivis tollit. Quo exacerbationes, & remissiones diei hora magis certa redeunt, & quo remissiones magis sunt protensæ, eo melius, & vice versa. Evacuaciones in *Συνοχῇ* a natura institutæ ferè semper sunt *infide*, atque ut plurimum *symptomata*: Evacuatio critica, & salutifera fit solummodo *per sudores*, vel *salivationem*; prior est magis cita; altera verò æquè certa, licet tarda & molesta. Durante morbi augmento pessimum signum est, si urina sensim in tenuem, & pallidam mutetur, & pulsus magis celer, debilis, ac vacillans evadat, &c. e contra pulsus fortis, & constans, urina rubedine multum tincta, & contentis saturata, multo magis, quæ hypostasim laudabilem deponit, ubi morbus ad statum pervenerit, optimum præsagium exhibet, ut ut reliqua symptomata contrarium prognosticon denunciare videantur.

Curatio. Art. 144. Febris remittens simplex viribus *corticis Peruviani* æquè certe cedit, ac ipsa intermittens; quippe fermentum febrile in utraque ferè idem est. Efficacia ejusdem Antidoti in *Συνοχῇ* spuria debellanda est propemodum æquè certa, ac in simplici (modo ritè ministretur, respectu ad symptomata vehementia habito) non autem adeo cita est, quoniam morbus est intensior, ideoque majorem remedii quantitatem postulat: in justa autem ac regulari hujusce antidoti exhibitione, atque repetitione, harum Febrium cura radicalis consistit.

Curatio Art. 145. „Curationem symptomatum maxime debet esse „ inè urgentium quod attinet, vel potius mitigationem, in his sicut in aliis febribus, ali-

bi

„ bi (*Articul. 63. &c.*) dictum fuit : Interim *Febris*
 „ fat erit in præsentiarum adnotare , quod , si *typum*
 „ quando Febris remittens , vel ex peculiari *mutaverit.*
 „ morbi genio , & indole , vel ex errore aliquo
 „ typum mutaverit , & in continuam vel mali-
 „ gnam migraverit , curationem tunc prorsus a-
 „ liam exposcit , ut infra videbitur. „

FEBRIS CATARRHALIS.

Benigna seu lymphatica acuta.

Art. 146. Febris hæc ad continentes sive re-
 mittentes spectat , ut ejus invadendi forma osten-
 dit , quæ plurimum ad quotidianam continuam
 accedit . Sed quas *Mortonus* continentes febres
 vocavit , has *Junckerus* continuas facit , ideo pa-
 rum solliciti de vocabulis ipsam rerum naturam
 prosequemur .

Junckeri Sententia.

Art. 147. Invadit hæc febris plerumque circa *Febris*
 vesperras tempore æquinoctii præcipuè autumnæ *cater-*
 lis . Præcedunt vel statim junguntur gravedo , *rhialis*
 aut coryza , raucedo , molestia deglutitionis , *signa.*
 immo intra collum erysipelacea quasi constitu-
 tio ; prægravatio pectoris , tussis satis quidem
 violenta parum tamen excernens , & per totum
 morbum ferè durans universi corporis languor .
 Invadit autem hæc febris , frigore horrido , im-
 mo rigore , præcipuè vero tensivis doloribus in
 dorso .

Art. 148. Durat hoc frigus per dimidiam cir-
 citer horam , aliquando integram , raro diutius ;
 & calor succedit protinus satis quidem lenis ,
 cum angustia tamen , & anxietate circa præcor-
 dia

dia conjunctus; quæ circa præcordia pathemata in paucissimis tantum subjectis nauseabunda, aut vomibunda observantur. Durat hic æstus pro gradu plethoræ per horas bene multas, ita ut primis paroxysmis vix altero mane notabiliter tepescat.

Art. 149. Pulsus est celer, & frequens, appetitus & vires labefactatæ, somnus imminutus, caput est magis debile quam dolens. Ad diarrhœas hæc febris valde inclinatur, interdum accedunt vomitus; sudores quovis tempore matutino æstum excipientes febrem sensim mitiorem reddunt, ac catarrhales hos morbos infringunt; elapso tamen primo vel secundo septennario febris cum symptomatibus cedit. Urina demum præter colorem aurantium febribus acutis familiarem hoc peculiare habet, quod pauca mora tenuissimam cutem vitro subtiliter adhærescentem ostendat lacteo-liventis coloris cum sedimento roseo-pallido.

Prognosis.

Art. 150. Hippocrates jam observavit a fluxione ejusmodi materiæ acris causticæ in pharyngem præcipue, oriri raucedines, cynanchas, erysipelata, peripneumonias, & quamdiu materia in tali intemperie existat, perdurare talia pathemata, si vero spissescat, & concoquatur, illa minui, & febrem solvi.

Art. 151. Nisi ergo mature, & placido successu, materia hæc sensim abstergetur, & dissipetur, ulceratio sanioso-ichorosa succedit, quæ promptè in sphacelofam, & funestam putredinem ruere solet, id quod satis confirmant ulcera illa externa, ex diuturno erysipelate vel phlegmonibus non discutiendis oriunda, quæ licet topica præsentiora admittant, pessimam tamen indolem exhibent.

Art. 152. Quo acrior igitur inflammatoria

Æstus

stasis subest, eo propior dicto eventui existit.

Art. 153. Quo magis autem febris *simplex* & *benigna* catarrhalis dici meretur, eo longior ab hoc eventu distat; magis autem in lentas, & hecticas febres propendet, præcipue quando nimis absorbentibus, & refrigerantibus tractatur.

Art. 154. Indoles hujus febris non est, ut *apostasies* formet, seu materiam semel resolutam extrinsecus in locum arctiorem cumulet, uti hoc in parotidibus, & angina contingit. Quando autem per intempestivas artis commotiones aliquid extrinsecus protruditur, adparentes tales *apostasies* pro criticis excussionibus vulgo venditæ, genio huic feбри proprio non debent imputari.

Art. 155. Multo lenius adhuc decurrunt *febriculæ* illæ catarrhalibus adfines, quæ hyeme tepida repentinis tumoribus e. g. glandularum sub auribus, tonsillarum &c. superveniunt.

Art. 156. Ceterum quam benigna etiam sit hæc febris catarrhalis, est tamen contagiosa, uti & ipsi catarrhi tenuiores, & coryza ejusdem indolis esse observantur. Quo magis autem contagiosa reperitur, eo certius petechiæ compli-
cantur.

Art. 157. Diarrhœæ, quando sub initium accedunt, minuunt impetum morbi; in statu quæ superveniunt, si moderatæ, & indolentes existant, non adeo sunt periculosæ. Alvi autem adstrictio hic æque ac in petechialibus purpuratis nocentissima est, & præcipue in statu, deliria, comata, convulsiones, inducit.

Art. 158. Indicatio est, ut vitium lymphæ in *Curatio*
mucositate consistens corrigatur. Resolvunt lentorem, (1.) Radices catarrhales alexipharmaco-diuretici: præcipuè rad. pimpinellæ albæ, vincetoxici, ari, helenii, Imperator. Angelic,

gelic. (2.) Effent. alexipharm. ex. gr. *Stahlii*,
tinct. antimon. tartarizat. (3.) salia colliquan-
tia digestiva e.g. arcan. duplic. tart. vitriol. ni-
trum antimoniatum.

Art. 159. Motus febriles secretorii, & excre-
torii eundem finem respicientes prudenti ra-
tione sunt adjuvandi; cui scopo antifebrilia tem-
perata ex. gr. effent. alexipharm. *Stahlii*, mix-
tura simplex, pulvis bezoardicus ex nitro, an-
timon. diaphor. ocul. cancr. acid. citr. saturat. &
sale digestivo satisfaciunt.

Art. 160. Tussis sicca tuto est mitiganda; in
quem finem conducunt (1.) Antifebrilia modo
commendata. (2.) Liquiritia cocta, syrup. vio-
lar. de eryfino *Lobelli* (3.) Emulsio. ex amygdal.
vel sem. card. bened. mariæ, parata. (4.)
Mucilago hordei, avenæ, (5.) ol. amygdal. (6.)
Trochisci beccihici.

Art. 161. Alvus semper aperta est servanda
(1.) per diætam liquidam ex prunis, passulis,
pomis, (2.) per potum sufficientem tepidum,
ex infusis thee, veronicæ, tussilag. teucris veri,
(3.) per clysteres emolientes cum stimulo sa-
lino (4.) per pilulas *Stahlianas*, vel *Beccheria-*
nas manè exhibendas.

FEBRES ACUTÆ STOMACHICÆ,

Et intestinales, a quibusdam mesentericæ dictæ,
a nobis autem malignæ
remittentes.

Heisteri sententia.

Ad ma- *Art. 162.* A plerisque hæ febres ad malignas
lignas, relatæ sunt, quia inusitata quædam ac gravia,
relata. vel mox in principio symptomata ipsas comi-
taban-

tabantur, vel per curationem consuetam diaphoreticam, & potissimum sudoriferam eas insequabantur, qua plerisque ægris præcordiorum angustia, anxietates, dolores circa ventriculi regionem, virium prostratio, deliria, exanthemata varia, & præsertim petechiæ aut purpura inducta; & in ipsum tandem vitæ periculum ii sæpè coniecti sunt.

Art. 163. Febres autem hæ in primis viis: hoc est in ventriculo; & intestinis potissimum, sedem suam habere videntur. Nonnulli easdem mœsentericas appellarunt ut *Baglivus*, & speciatim *Burchardus Medicus Rostochiensis*. *Sydenhamus* summus ille Medicus similes quoque febres descripsit in tractatulo *de novæ febris ingressu*.

De nominibus earum

Art. 164. Manifeste igitur ad hoc genus pertinent dysentericæ, & petechiales sive petechizantes, aliæve congeneres, ad malignas vulgo referri solitæ; præterea febres nonnullæ catarrhales dictæ, itemque continuæ quotidianæ, & quam maxime tertianæ, ut & febris semitertiana sive hemitritæus, quo nomine a Veteribus eæ intelligi solent, ubi ægri vel quotidie, vel tertio quovis die novam accessionem sive horrorem ac postea calorem experiuntur magis intensum, & ubi sæpè, quando corpus in lecto commovent, horrore quodam afficiuntur, unde & *pernoses* id est *horrificæ* veteribus dictæ sunt, atque *pernoses*, & *hemitritæi Hippocratis* synonyma sunt, quas veteres rursus pro symptomatum varietate in plures alias, ut *Typhodem*, *Assodem*, *Elodem*, *Epialam*, & *Lypiriam* subdiviserunt: quæ vero essentia omnes conveniunt, sed symptomatibus tantum nonnullis differunt.

Species febrium huc spectantium

Earum

Art. 165. Sunt itaque omnes hæ febres tales (i. e.) ut ægri eis correpti per vices horreant, sed

diagnosis

sed incertis temporibus (2.) *dentes*, *lingua*, & *fauces* viscida, & spurca pituita, ac speciatim *lingua* squalore sæpe luteo, fusco, vel nigricante, ipsis obfixa sint, ita ut adstantes plerumque fetorem oris, ægri vero ipsi adversum *saporem* gustu inde percipiant (3.) *alvi fluxus* ut plurimum adest, & excrementa, quæ per anum ejiciuntur foetorem sæpe pessimum spirant (4.) *hypochondria* tensa sunt, & sæpe simul valde dolent (sine dubio a copiosis, & turgentibus humoribus noxiis in ventriculo, & intestinis contentis) (5.) *pavores frequentes* in somno incidunt, ut propter eos dormire aut quiescere nequeant, qui sensibilibus etiam vigilando haud raro sunt molestissimi, ita ut ex levissima sæpe causa concutiantur, & vehementer expavescant: atque hos pavores in febribus acutis quibuscunque, haud sine ratione, pro certissimo indicio habet *Burhardus* mineram febris in intestinis hærare, quæ etiam ratio esse videtur, quare triteophyas febres *Hippocrates* terrificas dixerit, atque mali plerumque præsagii habuerit (16.) *dolores* quoque plerumque adsunt *capitis*, & *cervicis*, a spasminis, ut videtur, oriundi (17.) *urina* initio morbi ut plurimum naturali similis (forte quia tunc causa morbi nondum est in sanguine) in progressu turbida est, ac limosum sedimentum deponit, quod sæpius ita usque ad finem durare solet.

Prognosis.

Art. 166. Adsunt quidem sæpe adhuc alia signa, quæ vero non tam febres hasce, quam potius gravem, & periculosum earum statum, si adsunt, indicare solent, qualia (1.) sunt summæ *præcordiorum anxietates* (2.) *dolor ventriculi* aut *lateris* unius circa hypochondria acutissimus, pleuritidem mentiens (3.) *vires* valde prostrata, & lypothimix (4.) *ardor interne*, sed *exter-*

ne frigus (5.) *mōtus manuum tremulus, subsultus tendinum, mens vacillans, singultus, floccorum collectio, & sudor frigidus;* quæ ultima simul materiam morbi malignam atque summum vitæ periculum indicant, atque simul ex his indiciiis peti potest præsagium.

Art. 167. Sunt & quædam symptomata hisce febribus familiaria, quæ vero proprie non ex natura earum, sed potius & plerumque, sicut in aliis multis, ex malo ipsarum regimine, ac præsertim nimis calido vel sudorifero, dum scilicet eo ipso, ut supra jam dictum est, materia vitiosa ex intestinis ad sanguinem ac partes nobiliores propellitur, sed exhalare forte a sanguine in cute ob spissitudinem vel aliam rationem nescia, hinc inde in ea hæret, & maculas aut papulas rubicundas, aut lividas producit, quo casu tunc febris petechialis, vel purpurata dici consuevit; vel si ad aures interne deponitur, surditatem sæpe producit, vel circa glandulas parotides, vel maxillares, atque ibidem tumores inflammationes, & abscessus pessimos concitat; si ad cerebrum transfertur deliria, & phrenitidem: atque sic prout in partem corporis magis, vel minus nobilem impellitur, diversa necessario mala, & pericula: ut pleuritidem & peripneumoniam, hepatis, lienis, ventriculi, intestinorum &c. inflammationem producit; quæ diversissimam causam, & morbum diversum indicare videntur, licet revera unus, idemque sit morbus, & una eademque causa, atque vix nisi loco affecto, malisque accidentibus inde oriundis, differat.

Symptomata minus consuetata.

Quibus remediis evacuatio instituenda morbo causa.

Art. 168. Quare si hisce in malis alvi fluxus supervenit, isque per medicamenta cohibetur, ægri in pejus ruunt, quia materia noxa excernenda cohibetur; sed si sibi relinquitur, dum cau-

cau-

causa primaria in intestinis hærens sic e corpore expellitur, morbum plerumque minuit, aut omnino solvit. — Hinc *Duretus* antiquo medicamento purgante *hiera picra* dicto per aliquot dies in hujusmodi casibus foelici cum successu usus est, cujus primarium ingrediens est aloe, quod & *Baglivius* hic valde commendat: ideoque & alia aloetica blanda remedia, ut pilulæ *Frankofurtenses*, *Immanuelis*, vel *Becherianæ*, hisve similes, vel alia idonea aloetica compositio hic adhiberi poterunt. Alii decocto, vel rhabbarbari, cum aut sine manna utuntur; vel horum loco apte quoque tinctura, siue anima rhabbarbari ad morem *Degneri* ad cochleare j. vel ij. per intervalla dari apte potest, infantibus vero gutt. 20. vel 50. *Burchardus* sal anglicum purgans hic laudat, ejusque ℥j. puerperæ cuidam optimo cum successu exhibuit, quo sexdecim secuti sunt fedes cum perfecta febris hujusmodi intestinalis solutione, adeoque, & aliis cum fructu dari potest. Alii agro mannam cum cremore tartari, & nitro foeliciter dedere. Ego sæpius potiuncula ex leni decocto tamarindorum, & foliis fennæ cum manna, foeliciter usus sum, vel & anima rhabbarbari, vel etiam pulveris rhabbarbari ℥j. cum nitri ꝑ sem. vel in mulieribus ubi forte menses instant pilulis etiam *Beccherianis*: hisque & similibus evacuantibus dolores ventriculi, & hypochondriorum, itemque præcordium angustię ægregie tolluntur. Cum itaque evacuantia ejusmodi lenia ægregie hic profint, sudorifera autem, & quæcumque corrigentia alia hætenus tentata noxiam hanc materiam in primis viis non destruant haud male *Baglivius* indignabundus quasi in eos, qui febres tales solis alterantibus curare volunt, invehitur medicos, dicendo: *quantum ex ardeo, cum video*

Medicos ad corrigendam, & dulcificandam solum materiam occupatos; sed de humore peccante foris eliminando non cogitare.

Art. 169. Verum præter hæc lenia evacuan- *Quoniam alia adhuc conveniant.*
tia in eundem scopum simul quoque lubrican-
tia varia apte adhiberi, atque illis interponi ac
subjungi possunt: ut scilicet sunt potus feri la-
ctis, decoct. C. C. cum pomo citri paratum, de-
cocta ex hordeo cum pomo citri, & saccharo,
vel ex avena cum passulis confecta; decocta
prunorum dulcium, aut pomorum fragrantium
saccharo grata reddita; emulsiones ex amygda-
lis, & pineis, aut semin. 4. frigid. si recentia
sunt, quæ omnia etiam roborandi vi pollent,
immo & oleum amygdal. dulc. quoque in iis,
qui oleosa non averfantur -- itemque potiun-
culæ diluentes ex aquis temperatis, & syrupo
paratæ, atque acidulæ redditæ ad corrigendam
materiam acrem, putridam, alcalinam commo-
de etiam porriguntur. Pulveres ex absorbenti-
bus terreis cum nitro, & cinnabari &c. -- ve-
rum non ad scopum diaphoreticum, & sine re-
gimine fudorifero.

Art. 170. Quodsi laudata lenia evacuantia, & *Clysteres quoque utiles.*
lubricantia ad humores noxios extrudendos for-
te non sufficiant, atque æger de magnis præcor-
diorum angustiis, doloribus ventriculi, & hy-
pochondriorum conqueratur, clysteres quoque si-
mul lubricantes, & demulcentes qualia sunt:
ex decoct. avenæ cum ol. oliv. vel lin. vel de-
coct. fl. chamæm. in lacte cum ol. melle, aut
saccharo, quod ægregium simul est antipasmo-
dicum, & anodynum, in usum adhuc sunt vo-
candi -- Clysteres tamen semel, bis, terve, in
die reiterandi, quoties gravia mala, & cum
primis anxietates, aut dolores hypochondrio-
rum urgeant.

Quando
morbus
caput
impetit.

Art. 171. Quando impetus humorum vitiosorum versus caput ferri videtur, id quod ex capitis dolore, rubore faciei, mentisque alienatione &c. intelligitur, pedes calidis fovendi, superiores vero partes frigidiores, & parum tectæ servandæ sunt, atque ab omnibus calefacientibus, ac sudoriferis abstinendum. *Riverius* tunc quoque indusia mutare jubet, quod vero vix suaderem. Vesicatoria præterea furis, & rubefacientia, uti vel fermentum cum sale, & sinapi contuso, atque aceto plantis pedum calide impostum, ut sic vehementius a capite revellat. Quem in scopum etiam, præsertim quia vesicatoria tardius agunt, clymatibus quoque ex decoct. prunor. cum foliis sennæ, nitro impregnatis revulsio a capite procurari debet, eaque ratione sæpe quidem qui jam desperati videntur, præter spem adhuc resituuntur.

Quid in
singultu
facien-
dum.

Art. 172. Eadem ratione procedendum est si singultus incidat; aut si his non cedat, sal Anglicum Epsamense est propinandum, vel sicut *Duretus*, & *Baglivius* sæpius cum successu fecerunt, hiera picra. Potus Coffeæ etiam in singultu sanando singulari pollet virtute, eumque hic jam pro secreto commendavit *Baglivius*. Quando singultus ab inflammatione ventriculi camphoræ gr. ij. vel iij. pulveribus antispasmodicis misceri, & sp. vin. camph. ventriculo extus imponi cum fructu possunt.

Quid de
V.S. sen-
iendum.

Art. 173. Sanguinis missio, quam *Sydenhamus* fere promiscue in febribus commendat, apud nos raro, & nisi in valde plethoricis, aut qui vini copiosiori potui dediti sunt, prodest, & quidem tantum in principio.

Quid fa-
ciendum
in diar-
rhea.

Art. 174. Quando natura in his febribus alvi fluxum facit, tunc & ab evacuantibus internis, & a clysteribus abstinendum, atque solis ferè aqueis

aqueis tepidis diluentibus ac lubricantibus supra indicatis, ac potionibus satis largiter haustis, ea juvanda est. His terrea nitro adjecto interponenda. --- Interea tamen tincturæ rhabarbari quandoque etiam cum fructu cochleare j. interponitur.

Art. 175. Quod si vero natura fluxus alvi nimis vehementes, & colliquativos concitat, ita ut vires ægri valde prosteruantur, extrema frigida reddantur, aliaque prava symptomata inde subsequantur, ægro diascordii ℥j. ex aqua cinamomi sine vino, vel cydoniata ℥j. s. exhibenda, quod vires non solum roborat, & fluxum moderatur, sed & simul blandum somnum conciliat. Sed si alvus inde nondum quiescat, iterata vice post aliquod tempus exhibitum raro spem Medici destituet, quemadmodum præter nostram experientiam, & Sydenham & Burchardus pag. 29. sancte etiam id affirmant.

Art. 176. In anxietatibus præcordiorum, & doloribus ventriculi atque hypochondriorum evacuantia, præsertim rhabarbarina supra laudata dari, atque clysteres leniter evacuantes sæpius injici debent: ut sic materia noxia a superioribus evocetur, & per inferiora educatur.

FEBRES CONTINUÆ.

Art. 177. „ Febris Συνχως, continua, sive Febris putrida dicta, est, quæ per plures dies sine exacerbationibus & remissionibus usque ad ultimam & integram sui cessationem perdurat. Ejus causa ita perhibetur. Fermenta febrilia, seu fomes morbosus in febribus omnibus ante dictis, & in hac quoque gradu tantummodo differre videntur.

Art. 178. „ Febres continuæ putridæ plerumque

*Si alvi
fluxus
nimius.*

*Ubi an-
xietates
& ven-
triculi
dolores.*

*Febris
continua
quid.*

Fomes

Februm

harum

omnia

ferè i-

dem.

Vena se-

ctio.

„ que venæsectionem requirunt; intermittentes
 „ & malignæ rarissimè aut nunquam eandem
 „ admittunt. In Febrium progressu ad statum
 „ appropinquantium sanguinem detrahare nefas
 „ est juxta antiquorum præcepta; *Cælius Aure-*
 „ *lianus*, *Celsus*, & reliqui sanguinem mitti
 „ solummodo *primo triduo* requirunt, ultra ve-
 „ rò nunquam.

Non sine
 necessi-
 tate.

„ *Art. 179.* „ De venæsectione in genere dicen-
 „ dum est; in sanguine est *radix vite*, & san-
 „ guis est ipsius *vite thesaurus*; unde si aliis mo-
 „ dis ægro vel sine periculo, vel æquè commo-
 „ de succurrere poterimus, sanguini parcatur.
 „ Rariores sunt sanguinis emittendi occasiones,
 „ quàm vulgò creditur. *Itali*, *Galli*, & *Hispa-*
 „ *ni* sanguinem mittunt, non unciatim, sed
 „ libratim. In *Germania* non ultra quinque vel
 „ sex uncias emittunt. Inter hos nos *Angli* me-
 „ diam viam amplectimur.

In qua
 vena.

„ *Art. 180.* „ In brachio subter venam basili-
 „ cam jacet arteria, subter medianam nervus,
 „ subter utramque tendo; juxta cephalicam nul-
 „ la est arteria, neque nervus, neque tendo;
 „ Atque hanc ob causam hæc ultima minimo
 „ cum periculo aperiri potest.

Vuillisi sententia.

Quatuor
 stadia
 Febrium
 putrida-
 rum.

„ *Art. 181.* In Febribus putridis continuis qua-
 „ tuor numerantur stadia, viz. initium, augmen-
 „ tum, status, & declinatio; *in initio* plerumque
 „ adsunt symptomata sequentia: rigor aut hor-
 „ ror, lassitudo & perturbatio cum siti & vigiliis,
 „ dolor in capite aut lumbis, nausea aut vomitus.
 „ *In incremento* sequentia: sitis intolerabilis, do-
 „ lor capitis & vigiliæ pertinaces, deliria, phrœ-
 „ nitis, motus convulsivi, oris amaror, sapor in-
 „ gra-

gratus, linguæ scabrities, pulsus vehemens, & citatus, urina summe rubicunda, plerumque turbida, contentis saturata, sine hypostasi aut sedimento laudabili. *Status morbi crisin* continet, quæ in Febre continua ferè idem est ac paroxysmus intermittentium, qui non nisi statotempore, & post totidem horas, evenire solet, sic etiam motus critici in Febribus continuis a die quarto in quartum aut forsan a septimo ad septimum contingunt: Hæ *Crises* sunt plerumque per sudorem, vel hæmorrhagiam; sunt etiam aliquando *crises imperfectæ*, quæ morbum non solvunt, quales sunt per urinas, vomitum, secessum, exanthemata, bubones, &c. *Criseos* tempora sunt valde incerta. Si Febris in principio sit vehemens, plerumque intra dies quatuor expectanda est *crisis*; quod si tardior sit Febris in initio, circa diem septimum ad *auxilium* perveniet; si verò adhuc remissius incipiat, ad diem undecimum, aut decimumquartum, vel ultra protrahi solet.

Art. 182. Interea notandum est, quod sicut *Notabe-* paroxysmi intermittentium statim redeunt tem-
poribus, ita *motus critici in continuis*; (diem autem quartum ut plurimum observant,) nam licet *crisis perfecta* ad 14th 17th aut 20th diem prorogetur, tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia Febrilis velut per partes amputatur, donec plenior ejus discussionem natura aggredi valeat; *natura etenim ut plurimum, nisi alias perturbata, quarto quovis die partem oneris sui excutere tentat*; quare ut plurimum 4^{to}, 7th, 11th, 14^{to}, motus critici, non planetarum directione, sed ob naturæ necessitatem eveniunt.

Art. 183. Per declinationis stadium intelligo *Decl-* conditionem ægri & morbi, quæ statum sequi-
natio.

tur, sive in salutem sive in mortem tendat, vel alterationem, quam sanguis subit post crisin bonam vel malam, cum res adhuc in dubio versetur, quandoque etenim, crisi imperfecta existente, ægri diuturna imbecillitate labefactantur, & non nisi longo tempore, si omnino, convalescunt.

Ptyalismus.

Art. 184. Aliquando in declinatione Febrium *incrassatio* in partibus oris successit (quasi species *aphtharum*) & etiam adest *salivatio* copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum foetore anhelitus, item linguæ & gingivarum intumescencia.

Divisio in Febr. ardentem & lentam.

„ Ut instituaturs harum Febrium therapœia rationalis utilissima est earum divisio in *Febres ardentem & lentam*, utpote quoad medendum & methodum toto (quod ajunt) cœlo a se invicem discrepantes.

FEBRES ARDENTES.

Causus quid.

Art. 185. Causus seu Febris ardens ea est, quæ cum majori æstu, siti ferè intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis *phlogosin* arguentibus, cursum suum peragit; symptomatis magis horrendis stipatur; crisin habet difficilem & eventum periculosum. Calor ad tactum ferè urens est hujus Febris *signum pathognomonicum*; & ut plurimum, habet conjunctam insignem alicujus visceris *inflammationem*.

Lipyrria, Affodes, Elodes, &c.

Art. 186. Huic Febrium classi aliquo modo referri potest 1^o. Febris *lipyrria* dicta in qua interiora uruntur, exteriora verò frigent. 2^o. *Affodes*, in qua ægri decubitus eundem non ferentes jacendi situm perpetuo variant in lecto indefinenter jactitantes. 3^o. *Elodes*, in qua ægri profusissime sudant, sudore nihil proficiente, &c. Sed revera hæc sunt potius Febrium symptomata, quam novæ species.

„ Ejus-

„ Eiusdem quoque commatis est Febris *Calen-*
 „ *tura* dicta, quæ nihil aliud est, quam peculia-
 „ ris *delirii* species. „

Art. 187. „ Calentura est Febris nauticis pe- *Calen-*
 „ culiaris. Hoc morbo correpti singulari delirii *tura.*
 „ specie afficiuntur; nimirum ajunt se in vire-
 „ to, quod semper in conspectu habent, & præ-
 „ sto esse arbitrantur, ambulare velle; & nisi
 „ videtineantur, in mare profiliunt; atque hoc
 „ symptoma est *signum hujus morbi pathognomo-*
 „ *nicum*. In mari mediterraneo frequenter oc-
 „ currit; juvenes robustiores & temperamento
 „ sanguineo præditi huic Febri sunt magis ob-
 „ noxii. Larga sanguinis missione ut plurimum
 „ sublevantur. „

Boerhaavii sententia.

Art. 188. In Causo adest calor ardentissimus, *Sympto-*
 ficcitas in cute tota, naribus, ore, lingua; re- *mata*
 spiratio densa, anhelosa; cita; lingua sicca, fla- *frequen-*
 va, nigra; exusta, aspera; sitis inexplibilis; *tiora.*
 nausea, vomitus; anxietas, inquietudo, lassitu-
 do summa: tussicula, vox clangosa; delirium,
 phœnitis, pervigilium, coma, convulsio; die-
 bus imparibus exacerbationes.

Art. 189. Tertio & quarto die sæpe lethalis e- *Progn-*
 vadit, septimum raro transit, & perfecta; solvi- *sis.*
 tur sæpe hæmorrhagia (quæ, si tertio vel quarto
 die parca, lethalis;) hæc prænunciatur cervicis
 dolore, temporum gravitate tenebricosa, caligi-
 ne, præcordiorum contentione sine doloris sen-
 su, invitis lacrymis sine lethali signo alio; ru-
 bore faciei, pruritu narium, optima fit die de-
 cretorio; solvitur & die decretorio: vomitu, al-
 vo, sudore, urina, sputo crasso; accessio die pari
 pessima, si id ante diem sextum, urina nigra,

pauca, tenuis hic lethalis; lethale sanguinis sputum; lethalis sanguinis mictus; deglutitio læsa, mala; extremorum refrigeratio pessima; facies rubra & sudans mala; parotis non suppurans exitialis, alvus nimis fluxa lethalis; cum tremore abit in delirium, inde in mortem, transit in peripneumoniam sæpe cum delirio. „ In Fe-
 „ bre ardente (inquit Hippocrates) si tinnitus
 „ aurium cum visus habetudine fiat, & ad
 „ nares accedat gravitatis sensus, delirium por-
 „ tenditur. „

Inten-
 tiones
 curati-
 va.

Art. 190. In hoc casu integumenta debent esse minime aggravantia corpus; situs corporis paulò erectior; potus copiosus, blandus, demulcens, subacidus, aqueus, calidus; cibi leves, farinacei, hordeati, avenacei, ex fructibus subacidis confecti; requiritur venæsectio, si morbi initium, plethoræ indicia, inflammationis singularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, revulsio necessaria, symptomata urgentia; neque alio remedio facile superanda, hanc exigant. Indicanatur etiam quandoque *clysmata* blande *laxantia* & *refrigerantia*, prout vis ardoris, siccitas alvi, imperant; medicamenta *diluentia*, *nitrosa*, alvum lenissime *laxantia*, &c. Interim
 „ in animo probè tenenda est Vvaldschmidii ad-
 „ monitio; Febris maligna (inquit ille) in
 „ principio sæpe speciem Causi præfert; cautus
 „ itaque sit medicus, ne in errorem incidat:
 „ animadvertendum ergo est, an febricitans de
 „ cordis anxietate, virium jactura, aliisque gra-
 „ vioribus accidentibus conqueratur, & qualis
 „ sit urina, &c. nam longè diversa est harum
 „ Febrium curatio. „

„ Remedia particularia his intentionibus fa-
 „ tisfacientia a sectione de Febrium symptoma-
 „ tis petenda sunt. (pag. 18. & seq.)

FEBRES LENTÆ.

Ettmulleri sententia.

Art. 191. **F**ebbris *lentæ*, etiam si sint minus *Febres*
 acutæ, sunt tamen continuæ, in *lenta.*
 quantum continuo affligunt ægros, sed tardio-
 re motu sua absolvunt tempora; hinc diutur-
 niores sunt, & symptomata habent minus ur-
 gentia. De febribus his apud practicatos pauca
 prostant. A vitiis lymphæ (vel pituitæ) potis-
 simum oriuntur; & a Sylvio Febres lymphaticæ
 appellantur, forsan rectius pituitosæ.)

Art. 192. Inter has eminent Febres *catarrha-* *Febres*
les dictæ, quæ in principio & incremento con- *catarr-*
 junctum habent *catarrhum*, *coryzam*, *tussim*, *rau-* *rhales.*
cedinem, &c. Hæ Febres sunt plerumque len-
 tæ, interdum mites, vesperi vero aliquanto exa-
 cerbari solent: adest lassitudo artuum, durant
 symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque
 ad statum morbi, donec materia catarrhalis (ut
 vocant) coacta fuerit, & spissior mucus emun-
 ctus, & deinde cessat Febbris. Sedes morbi est
 in glandulis conglobatis.

Art. 193. In Febre catarrhali conducit deco- *Curatio.*
ctum ligni sassafr. (cum *rad. liquiritiæ* & *passulis*
 ad humorum acrimoniam) item *succus raparum*
expressus cum pauco saccharo; item *volatilia* &
sudorifera; solutio *gum. ammoniac.* &c. vid. catar-
 rhum, tussim, raucedinem, &c. alibi.

Art. 194. Præter dictas observantur quoque *Febres*
 Febres *lymphaticæ* (potius *pituitosæ*) vitio lym- *pituito-*
 phæ (pituitæ) glandularum conglomeratarum, *sa.*
 quæ in certam cavitatem suam effundunt suc-
 cum; inter quas eminent parotides & pancreas,
 quæ in os & intestina, & consequenter in mas-
 sam

sam sanguineam secretos liquores evomunt. Pec-
cant hi humores, quando sunt nimis visceri, falsi,
& acres, unde excitantur hæ Febres, (quæ quo-
que non simpliciter interdum Febres *scorbuticæ*
audiunt.) Acutæ continuæ, nonnunquam et-
iam intermittentes, in huiusmodi *lentas* degene-
rant, & quandoque in *hecticas* transeunt. Ori-
go harum Febrium est plerumque in stomacho ex
indigestione & cruditatibus.

Curatio. Art. 195. Ideoque tam in principio quam in
incremento mitius *vomitorium* ad curam optime
viam sternit, & postea visciditas vel acrimonia
pro re nata corrigenda est, & symptomata mi-
tiganda, & ventriculus roborandus, &c. Pro his
scopis consequendis aliquo modo valent reme-
dia sequentia, *Tartarus vitriolatus*, *pulveres te-
stacei*, *antimonium diaphoreticum*, *antihecticum*
Poterii, *tinctura coralii*, *salia volatilia*, &c.

Febres Art. 196. „ Febres *colliquativæ* sunt, in qui-
colliqua- „ bus corpus brevi tempore insigniter consumi-
tiva. „ tur, & emaciatur; partes solidiores & ipsa
„ pinguedo colliquescit, nunc per diarrhœam,
„ nunc per sudorem, nunc per urinam, nunc
„ solo ardore febrili sine ulla sensibili excretio-
„ ne; Febris aliquando *colliquativa* ex cancro
„ mammarum cum diarrhœa observata est.

Hecqueti sententia.

Species Art. 197. Urgent inter medendum quasdam
febris occurrere febres, dicas: an febriles pulsuum ha-
lente que bitudines, quæ nec *hecticæ*, nec *colliquativæ*
alios sunt, continuæ tamen, quæque gravium morbo-
morbos rum non raro appendices sunt; sub his pulsus
sequi- adest celer, frequens, & duriusculus, noctium in-
cur. quies, vigiliæ, sitis adest, & linguæ ariditas,
con-

constat appetitus, coctiones perseverant, interim ægrotantes ejusmodi non revalescunt, ad *eve-*
xiam non pervenientes, & in statu neutro ver-
 santes; licet ex pulsus conditione constanti fe-
 brem adesse pronuntiares: at amabo, qualem fe-
 brem, quæ si vel in annos plures abeat, nullum
 conatus dabit indicium, quo ad hanc vel illam
 propendeat evacuationem aut apostasin? Revera
 comperta est lenta febris, aut hectica, quam fer-
 me cum ante dicta misceres, sed hæc colliqua-
 tiva est, pulmonibus minitans, in sudores, sputa-
 mina, diarrhœas propendens, quæ risu exter-
 minantis signa sunt: igitur illam forte pro len-
 ta habendam voles? neque adversabimur, modo
 a colliquativarum numero illam arceas, proin-
 deque recognoscas conatus omnis exortem.

Art. 198. Inobservatæ febris forte genus est, *Febri*
 quæ tota in tonica partium evibratione spasma- *lenta*
 dica, aut spasmodico arteriarum *rithmo* confi- *spasma*
 sit, quam alit imbibitus stimulus, irritatio, *dica.*
 fremitus a prægressis febris succussionibus super-
 stes; solidorum anxietudo, instabilitas, aut in-
 constantia adest a sua cum fluidis inæquali fultura
 veniens, aut a perditis fluidorum premendorum
 cum solidis prementibus contactuum, resistentia-
 rum, & distantiarum commensu & proportioni-
 bus, unde male fultæ, spasmoque tensæ arteriæ in
 se celerius reflectuntur, seque motando fremunt.

Artic. 199. Hujus *ariologie* veritatem pro-
 mit curandi ratio, quæ istiusmodi febri mede-
 tur; hanc exasperant *cathartica*, *amara* læ-
 dunt, *diluentia nitrata*, & *absorbentia* juvant, *Ejus cu-*
 modo fatua fuerint, non *salina*, non *acria*, qui- *randi*
 bus addes *anodyna*, *fotus*, *balnea*; sed hinc abe- *ratio.*
 rit *cortex peruvianus* febrium ille Hercules, aut
 febrium debellator, a quo hæc febris novas acqui-
 rit vires; quæ tamen monita omnia cassa erunt,
 omissa

omissa corporis, & animi quiete; adeo quiete tractari amat hujusmodi febris!

Art. 200. Interim sub assiduo illius labore, arteriarum conatus mille tentari crederes, quibus in quandam materiem excernendam elutarentur, nitendo tamen jugiter, enituntur nihil, *critici* enim nihil, aut *judicatorii* observatum usquam est, quo expedire se sueverit hic morbus; irritus ergo, ecce inquierent, & impotens febrilis conatus? irritus quidem si materiem spectes, utilis si ordinem; ordinis autem est, non solum ut absolvat naturæ debitas fluidorum evacuationes, sed & ut tueatur nativi solidorum motus regulas, & leges, sicque servet solidorum cum fluidis amicabile commercium; porro ab hoc concentu recessus, & ab alienatio est isthæc febrilis inquieres, quæ proinde nihil aliud est, quam ad quietem conatus.

Art. 201. Spasmodica enim affectio est, sub qua partium elastica vis, suum ultra tonum extensa agitur: at ut suam ad quietem regredi contendit nimium dilatatus elater, sic suum ad tonum redire nititur spasmodicè tensa arteriarum elasticitas; hicque conatus erit illius, quam hic tractamus spasmodicæ febris. Ut ergo nulla febris est, quæ sit conatus expers, morbusque nullus, qui suam non habeat febrem, nullus quoque erit morbus, qui, aut sub quo non sit aliquis proprius conatus, conatus autem ad evacuationem modò, modò ordinem, sed semper ad æquilibrium, a quo totius animalis œconomiz concentus, felicitas functionum, ipsa sanitas.

FEBRES CONTINUÆ MALIGNÆ.

Ettmulleri sententia.

Art. 202. **F**ebbris malignæ primum signum est *Febbris*
subitanea virum prostratio citra *maligna*
causam manifestam cum pulsu debili; calor ex- *Diagno-*
ternus non adeo intensus ac in quibusdam aliis *sis.*
Febribus, potius interiora urens; adsunt vi-
gilæ pertinaces mox a principio morbi, inquietudo
anxiosa; conqueruntur ægri, & monstrant
regionem stomachi seu præcordiorum; urina est
sanorum similis; facies interdum solet esse te-
tra, & a statu naturali multum mutata, livida
interdum, aut plumbea. In his Febribus, quod
æstus & Febrilis ebullitio ut plurimum remissior
sit, malignitati, quæ sanguinem occupat, pror-
sus debetur, & spirituum magis *affectorum &*
quasi sideratorum, quam turbatorum humorum
indiciū est: aut saltem in humoribus, præser-
tim sanguine, fermentativam maligni miasma-
tis confusionem, & in textura & in motu inte-
stino eorum inordinationem indicat, & ita inca-
lescentia quidem, sed interne tantum gliscens,
non vero ad exteriora pergens accidit, unde
natura quasi oppressa non potens est symptoma-
ta illa magis regularia exercere, quæ morbo com-
petunt.

Art. 203. Ratione symptomatum adjunctorum *Magna*
magna est varietas Febrium *malignarum*; dum *varie-*
quædam cum certis, & insignibus cutis *efflore-*
scentiis, quædam sine iis, vel paucis admodum,
quædam aliis symptomatis stipatæ sunt. *tas.*

Art. 204. Nonnulli asserunt (ex observationi- *Vermi-*
bus microscopice) in omnibus Febribus malignis, *culi.*
& ulceribus gangrænosus talem adesse putredinem
san-

sanguinis, ut exinde copiosissimi generentur *vermiculi*, qui, ubique scaturientes, & corpus lancinantes, tam varia inducant symptomata, necesse est: Sed hi vermes non nisi putredine præcedente generari possunt. In Febribus malignis sanguis est nimis fluidus, vix aut planè non omnino congrumescit, sed hoc quoque est morbi *productum*. Malignitas aliquando est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo* ac *gangrena* correptas observare liceat.

Prognosis.

Art. 205. Audita Febre *maligna* homines contremiscunt; siquidem omnes Febres malignæ sunt admodum periculosæ, & quoad exitum valde incertæ, unde *Galenus* malignas Febres statuta ad iudicandum non habere tempora asserit. Surditas in principio periculossima, in statu vero morbi salutem portendit. Narium stillicidium, ut & alvi fluxus, quocunque morbi tempore, sunt pessima signa. Muscarum venatio, aut floccorum collectio est fere semper lethalis. Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimo erumpentibus morbus evanescit. „ Medicus (recte admonente Vvaldschmidio) nunquam ab ægro recedat, nisi prius inspexerit „ oculos, quorum insolita mutatio infaustum prædicat eventum; & dum pulsus explorat, semper attendere debet an manus ægrotantis sit „ tremula.

Cura.

Art. 206. Venæsectio in Febribus malignis locum non habet: quò malignior est Febris, eò magis nocet; & quò tardius instituitur, eò deterius. — Vomitoria in primo principio morbi præ cæteris omnibus maxime conducunt, antequam natura molliatur aliquam excretionem percutim; elapso vero primo principio elapsa est occasio: Et postea cura aggredienda est medicamentis sudorem moventibus; sudores etenim (ipsa

(ipsa natura monstrante viam) causam & morbi fomitem frequenter expellunt, hæc medicamenta *bezoardica* aut *alexipharmaca* appellantur : quo autem major est malignitas eo copiosius provocandus est sudor ; respectu semper habito ad morbi genium, diversitatem, ægroti vires, &c. *ter ad minimum in 24. horis sudorifera sunt propinanda* ; interponenda sunt *analeptica* & *blanda acida*, inter quæ eminet *spiritus nitri dulcis*, (item *tinctura croci cum spiritu nitri dulci extracta*) *succus citri*, *cydoniorum*, &c. *Camphora* est nobile alexipharmacum, sed omnes ejus usum ferre non possunt, præsertim mulieres & literati, quorum spiritus animales sunt mobiles & dissipabiles; est mirabile concretum, &, si cum cautela usurpetur, vix datur par remedium. *Rob. sambuci* est egregium sudoriferum pro pauperibus. *Cantbaridum* & *vesicantium* usus in statu morbi insigniter prodest. *Sal volatile C. C.* & *sal viperarum* sunt sudorifera, & malignitati resistunt: & hic locum habet *mixtura simplex* Paracelsi, viz. *℞. sp. theriacal. camphorat. ℥x. sp. vitriol. ℥ij. sp. art. rectificat. ℥vj.* digere in phiala hermetice obsignata ad tres septimanas, ut uniantur exactissime; dos. ℥j. plus minus in vehiculo appropriato, ciet sudorem. „ *Item decoctum sacrum* „ *Fulleri*, & *haust. diaphoret. ejusdem*, *bezoard.* „ *mineral. tinctura bezoardica*, *oleum Heinssij.*

FEBRIS PETECHIALIS.

Ettmulleri sententia.

Art. 207. **F**ebbris petechialis est Febris maligna, Febris in qua, præter symptomata reliqua Febribus malignis communia, adest insignis lassitudo totius corporis, dolor universalis con-

petechialis symptomata.

tunt-

tundens & lancinans; maculæ raro die quarto, sæpius circa septimum erumpunt, præsertim circa pectus & scapulas, hinc abdomen, crura, brachia (collum) ordinario facies solet esse libera: interdum non maculæ solum sed vibices apparent, in declinatione aliquando quasi *pyralismus* exoritur cum euphoria ægri.

Prognosis.

Art. 208. Maculæ hæ in morbo salubri efflorentes intense rubent instar publicum morsuum, (petechiæ differunt a puncturis pulicum, quod in puncturis in medio punctum apparet, quod semper manet etiamsi reliquum ruborem compressione vel frictione pellas.) Hinc pedetentim, pallescunt, flavescent, sicque evanescent, & quo magis rubicundæ sunt, eo melioris notæ; e contra, quæ ex rubore livescent, vel nigrescent, pessimæ sunt; si retrocedant, ingens periculum imminet. *Contagiosæ* sunt hæ Febres, & interdum *epidemicè* grassantur, admodum periculosæ sunt; plures moriuntur quam evadant.

Contagiosa.

Curatio.

Art. 209. Quoad curam Febrium *petechialium*, eadem indicationes, atque supra circa Febres malignas in genere, hic locum obtinent; si præmature & nimis cito maculæ retrocesserint, applicanda sunt *vesicatoria*, quæ etiamsi raro aut nunquam denuo apparere solent, earum tamen absentia vesicatoriis quodammodo suppletur, & symptomata nervosi generis ex earum retrocessione interdum felicissime præcaventur. Apparentibus *petechiis* nihil amplius in primis viis moveri debet; ipsa enemata sunt suspecta.

Donckersii sententia.

Symptomata.

Invadendi modus.

Art. 210. Febris *petechialis*, sive *continua maligna epidemica* in civitate agroque *Coloniensi* circa annum 1673. ad hunc modum se habuit; ex

im,

improviso plurimos occupavit anxietas præcordiorum, gravitas circa regionem ventriculi, appetitus dejectio, spontanea artuum lassitudo, nec non vertiginosus capitis dolor, præsertim circa originem nervorum opticorum; quibus omnibus postmodum cum virium subita prostratione accessit Febris putrida plurimum referens ideam *synochi*: utpote quæ præmissis brevi horrore vel rigore, universum corpus magno, & quem dicunt, præternaturali perfundebat calore, sequentiaque secum adducebat symptomata.

Art. 211. Pulsus in omnibus erat celer, & plerumque parvus ac debilis; sitis, invalescente morbo cum linguæ ficitate, inextinguibilis; urina in morbi principio ordinario quidem apparebat sana, aliquando tamen rubra & obscura, in fine vero augmenti, vel initio status turbata, in declinatione semper cum sedimento, saltem aliquali; alvus in aliis adstricta, in aliis laxa erat; infestabat ut plurimum ægros hypochondriorum præcipue sinistri dolor (quod notandum) per lumbos secundum spinam dorsæ ascendens, lancinans, ad scapulas extendebatur, & cui non raro se præbebat comes *pleuritis* vel *angina*; multos in principio augmenti defatigabat alvi fluxus, cum quo non raro lumbrici excernebantur; multi quoque alii in medio augmenti in aurium tinnitum, gravedinem auditus, & aliquando oculorum suffusionem, qui nonnunquam in omnimodam eorundem sensuum ablationem incidebant; omnes denique affligebantur perpetuis vigiliis, & delirio, quod in aliis levius, in aliis gravius fuit, concomitantibus semper rubris vel lividis aut subnigris maculis.

Art. 212. Horum similiumque symptomatum *Solutio.* *Syndromæ* in omnibus, quorum cura mihi commissa fuit, vel (quatenus ex aliorum relatione

potui colligere) quorum natura inversa curandi methodo non fuit plane consternata, septimum circa diem subsecuta fuit *crisis*, vel manifesta vel obscura.

Contra-
gium.

Art. 213. Hic morbus in primo sui ortu aliquandiu apud paucos veluti latebat, pedetentim vero symptomatum malignitate funerumque frequentia longe lateque sæviebat, & ad tertium usque annum plus minus invaluit, & nonnullis in locis tertiam incolarum partem e medio sustulit.

Prognosis.

Art. 214. Si delirium circa diem criticum vel primum accidebat, vel majus evadebat, concomitantibus diarrhoea, obscura voce, & difficillima (citra faucium tumorem) deglutitione, necnon digitorum manuum labiorumque tremoribus convulsivis, indubia instantis mortis erant indicia; in hac Febre quando alius aliquis morbus se illi conjunxit, multo periculosior fuit: lethalis fuit frequentius in cacochymicis, plethoricis, & valde obæsis; pulsus parvus celer in morbi principio male ominatur; Maculæ parvæ & nigrae aut lividae male portendebant: quibus vero floridæ tempestive prodierunt, nempe die quarto seu indicatorio, sub *legitima medicatione*, ut plurimum servatos vidi, alii autem, in quibus tales maculæ serius vel instante die critica sub cuticula obscure proreperent, septimoque die vel immediate post magis debilitarentur, ac pejus haberent non evasere; exitialis quoque ægro ut plurimum fuit, si præter pulsum a principio insigniter parvum, debilem & celerem, urina quoque semper maneat sani coloris & consistentiæ; si ægrotus mente consternatus se non ægotare aut bene habere & continuo esurire putet; si cum magna faucium linguæque ariditate parum bibat; continuaque adsit oculorum lacrymosa distillatio; hæc enim & similia symptomata, si non

Signa ut
plurimum
lethalia.

si non certum interitum, saltem extremum vitæ discrimen denotant. Certus denique pronunciat^r interitus, si circa criticum seu septimum diem, urina in eadem perseverante bonitate & claritate, delirium majus fiat; si sitis aucta sit cum tanta linguæ fauciumque ariditate, ut æger non nisi inarticulate loqui, neque nisi cum difficultate deglutire queat; si adsint convulsiones; insuper si, exiguis & fuscis sub cuticula obscure emergentibus maculis, alvi fluxus superveniat, mors in propinquo est.

E contra vero si pulsus non sit nimis debilis, & si sit mediocriter magnus, & non præter modum celer; si delirium leve & insomnio quam delirio similis; si lingua non admodum sicca, sitisque tolerabilis sit; si maculæ sint *rubrae, majusculæ, rotundæ, clare, & distinctæ*, si post tertium diem erumpant; & urina circa idem tempus rubra & obscura, vel cum nubecula spectetur, bonum hinc lætumque præsagire oportet eventum, qui sine dubio septimo die insequitur, quando scilicet erupto sudore quietoque oborto somno symptomata quæque graviora remittunt, & æger perfecte judicatur.

Art. 215. Cura ab *alvi purgatione* semper inchoanda est, si nempe nullum aliquid urgens symptoma aliter suadeat; sin vero morbus fuerit valde inflammatorius, pleuriticus, vel anginosus, &c. ante omnia præmissis clystere *venesectione* instituenda est, & remedia *antipleuritica* propinanda, & aliquando phlebotomia est iteranda (sed parce & non nisi cum cautela aperienda est vena in Febribus malignis.) Cathartica valida sunt vitanda, lenitiva, & quæ sanguinem minus exagitant, sunt eligenda. Factis his juxta indicationes particulares evacuationibus, sanguinis naturalis effervescencia confortanda est convenientibus

bus *Alexipharmacis*, sed non violenter, ac si hostis una vice expellendus esset. Ex innumeris remediis, quæ in hunc scopum apud authores inveniuntur, elegimus vulgatissima, atque ab omni ævo probatissima, & idcirco tutissima; *mithridatum* nempe, *theriacam*, *diascordium*, &c. Cavendum est imprimis ne sudorem expellere conemur sola vi medicamenti, antequam ipsa natura eum sponte excitare molitur. Potus debet esse neque nimis calefaciens, neque valde refrigerans; inchoante crisi cum sudore nihil convenientius & expertus sum, quam ut ægri aquam hordei calidissimam copiose bibant cum vino mixtam, & quandoque cum *flox. papav. errat.* & *rasur. C. C.* incoct. Cibus debet esse tenuissimus vel potius nullus.

Art. 216. Purgationis in morbis principio necessitatem, & bonos effectus non tantum inculcat ratio manifesta (de qua, si quis velit, videatur author) sed & experientia mihi confirmavit, adeo frequens, adeo certa, adeo clara, ut si hæc falsa sit, aut esse possit, nulla certa aut sit, aut fuerit, aut futura sit unquam.

Cathartica.

Art. 217. Remedia cathartica mihi usitata fuerunt vel huiusmodi apozema vel electuarium subsequens: ℞. Fot. sen. mundat. ℥iij. sem. fœnic. ℥i℥. crem. tartari ℥j. coq. in q. s. aq. font. ad ℥vj. in colatura dissol. pulp. tamarind. ℥ij. syr. ros. solutiv ℥j. m. sumatur partitis vicibus. Electuarium sic se habet; ℞. Pulp. tamarind. ℥i℥. confect. alkerm. pulv. jalap. ana ℥℥. resin. ejusdem gran. vj. diagrid. gr. v.

Alexipharmac.

cum q. s. syr. de cichor. cum rheo f. electuarium. Mifuram alexiteriam fore semper huiusmodi cochleatim bibendam propinare solebam; ℞. Theriac. andromach. diascord. fracaſtor. ana ℥j. sal absinth. ℥℥. ocul. cancrorum. ℥ij. aq. card. ben. meliss. ana ℥ij. theriacal. syr. papav. errat. ana ℥j. sp. sulph. q. s. ad gratum acorem, f. mixtura. Ex magno æ-

grotorum numero, quos sub mea habui cura licet aliquando quinque, sex, vel septem simul in eadem domo Febre ista laboraverint, nullus, quod meminerim, sit desideratus præter unum virum & unam foeminam. „ Fides sit penes auctorem.

Art. 218. „ In calce libelli historias LII. hac Febre decumbentium in medium profert, quorum duo tantum mortui sunt. Illius methodus est plane singularis; &, si dictis fides adhibenda sit, proculdubio curationes hasce laudando potissimum acceptas referre (ut mihi visum est) debemus: in omnibus enim fere præscriptis laudandum larga manu propinavit: exemplo sit locus sequens, *℞. Diascod. ʒiʒ. laudan. opiat. gr. ij. m. f. bolus* pro una vice, concessio eodem tempore in potu ordinario *syrupo papaveris errat. p. 467.* His expendendis haud mihi suppetit tantum otii, sed ad propositum revertendum est. „

*Sed in
dubium
vocan-
dus.*

DE FEBRIBUS ERUPTIVIS

in genere.

Inter legendum.

Art. 219. **F**ebres *Eruptivæ*, quarum *crises* per eruptiones cutaneas expectandæ sunt, (quales sunt variolæ, morbilli, Febris scarlatina, Febris cum rubeolis, crystallis, Febris miliaris, &c.) præter symptomata aliis Febribus communia hoc habent peculiare & sibi proprium, nempe, *ingentem pectoris oppressionem*, quæ harum Febrium est signum fere *pathognomonicum*; nimirum est quidam validus naturæ conatus materiam morbificam a centro ad circumferentiam propellendi; unde certamina gravissima, anxietas

*Febrium
erup-
varum
sympto-
ma pe-
culiare.*

tas præcordiorum, pectoris angustia & oppressio-
nes maximæ: facta autem eruptione, statim hæc
dura symptomata evanescunt. Ejusmodi *pectoris*
oppressio in aliis quoque Febris est *crisum præ-*
cursor (unde dictum illud, nox ante crisin est
molestissima) in his tamen serius accidit, scili-
cet sub morbi finem; in eruptivis vero non pro-
cul ab initio, imo frequenter propemodum in
primo insultu; quoniam *efflorescentia* in propin-
quo est.

Sympto- *Art. 220.* „ Præter symptomata aliis Febris
mata „ communia (inquit Mortonus) in Febris eru-
quædam „ ptivis adsunt signa quædam quasi *pathognomo-*
insignio- „ *nica*, talia sunt pulsus debilis, & celer, res-
ra & fe „ piratio cita & anhelosa, hypocondriorum op-
re præ- „ pressio & angustia, urina pallida, ac tenuis,
pria „ coma, seu vigiliæ pertinaces, subsultustendi-
„ num, nonnumquam spasmi manifesti, & de-
„ liria prorsus efferata, gravativa palpebrarum
„ debilitas, oculorum rubedo, punctura dolori-
„ fica, & lacrymæ involuntariæ, in gutture do-
„ lor ulcerosus, rauco clausa, tussis perpe-
„ tuo molesta.

Art. 221. In erysipelate, variolis, morbillis,
Febre scarlatina, &c. (inquit *D. Freind.* Hist.
Med. p. 75.) si symptomata vehementiora fue-
rint, si caput aut pulmones vehementius urge-
ant, aliæve partes ingenti dolore super modum
afficiantur; ratio postulat, ut vena incidatur,
ac tuto fieri licet. Et teste experientia (nihil e-
nim frequentius expertus sum) audacter affir-
me nunquam observare potuisse eruptiones istius-
modi ex venæsectione retroire.

Exan- *Art. 222.* Humores acres stimulant in cor-
themata pore retenti: ut urina sanies atrabilaria, can-
præbent crosa, herpetica, sphacelata, materiæ alias eva-
mate- cuari solitæ; vel cacochymia, atrabilis, materia
riam Erysi-

Erysipelatosa, ea febris intermittens, & continuæ *convul-*
 acutæ, atque malignæ ad nervorum principia dela- *sioni.*
 ta, convulsiones funestissimas suscitant: ita etiam
 materies podagrica, rheumatica ex articulis, va-
 riolosa, morbillosa, scabiosa, herpetica, Erysi-
 pelatosa, scarlatina a cute in caput delata; ve-
 rum ante horum eruptionem convulsio producta
 minus periculi portendit: scorbutica convulsio
 levi paralyti ut plurimum conjungitur: venerea
 vero doloribus circa noctem acutis jungitur, &
 aliis hujus morbi signis. *De Gorter.*

Art. 223. Vitio relicto ex febre intermitten- *Eadem*
 te, continua, maxime hæmitritæ, variolis, *inter-*
 morbillis, febre scarlatina, inflammationibus *dum he-*
 diuturnioribus internis, febribus putridis, & *cticam*
 ephemera protracta non bene sanata --- si vero *febrem*
 pus misceatur sanguini ex abscessu, vomica, ul- *produ-*
 cere interno quodam præprimis pulmonum, aut *cunt.*
 aliis ulceribus externis, & fistulis, produxerit fe-
 brem hæcticam, medicamentis antipuricis curan-
 dam. *De Gorter.*

Art. 224. In omnibus denique exanthematicis *Quod-*
 refrigeratio, itemque lecti, & indusii mutatio *nam Re-*
 summe sunt noxia, adeoque serio vitanda: nam *gimen*
 hæc facile mortem, ut sæpe vidi, aut gravissima *obser-*
 saltem mala inducunt. E contrario autem ni- *van-*
 mis calor quoque est perniciosissimus. Tran- *dum.*
 quillus vero decubitus in moderato, & æquali ca-
 lore, ad blandam, & æqualem transpirationem
 semper conservandam, quam utilissimus est,
 atque quam maxime commendandus, nisi forte
 in lenissimis Variolis, morbillis, scarlatinis &
 urticatis, ubi deambulatio in cubiculo tempera-
 to, clauso, ipsis concedi potest, quamdiu am-
 bulare volunt, aut possunt: *Heisterus*

FEBRIS SCARLATINA.

Sydenhami sententia.

*Febris
scarla-
tina.*

Art. 225. **F**ebbris *scarlatina* quovis anni tempore, sed ut plurimum sub autumnum, se prodit, infantes præ cæteris infestans; Rigent, horrentque in initio, ut in aliis Febribus, neque vehementer ægrotant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstinguitur, latioribus magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt in morbillis: ad duos tresve dies perdurat rubedo, & deinde evanescit, cutem relinquens aliquanto asperam & furfuraceam.

Curatio.

Art. 226. Quoad curam naturæ prorsus relinquenda est, vel, si medicatione opus sit, cum morbillis satis convenit.

*Efflorescentia
modus.*

Art. 227. „ Febris *scarlatina* (inquit Mortonus) a morbillis minime distat, nisi *efflorescentia* modo; *morbilli confluentes* dici potest. „ Idem postulat regimen, eandemque medendi „ methodum. *Efflorescentia* in morbillorum interstitiis figuram diversam viz. oblongam, quadratam, vel multangulam obtinet, unde cutis „ variegata est: in Febre autem *scarlatina* una „ continuata inflammatione & rubedine cuticula „ perfunditur.

Junckeri sententia.

*Historia
Scarla-
tina ac-
curata.*

Art. 228. Incipit & hæc purpuræ species cum leni horripilatione, quam temperatus subsequitur æstus, plerumque siti moderata, faucium ardore, & virium dejectione stipatus. Adest etiam oppletio pectoris, respirationem difficilem reddens, cum tussicula sicca. Accedit capitis

gravitas vertiginosa , aut dolor magis acutus : Die quarto tota facies intumescit , & erumpunt maculæ intensius rubicundæ , primo parvæ , mox vero latiores redduntur , & coalescunt , ac totam faciem summa rubedine tingunt . Circa hoc tempus in quibusdam , præcipue plethoricis superveniunt hæmorrhagiæ narium . Postea hæc maculæ latæ etiam in pectore , & dorso , tandem in artubus prodeunt , & totam superficiem tegunt . Postquam duos , aut tres dies ita subsistere , rubor ille insignis perit , facies detumescit , & squamulæ decidunt . Febris satis tranquille excurrit , & cum moderata diaphoresi salutarem eventum obtinet . Alvus ordinarie toto hoc tempore est clausa , uti etiam in reliquis speciebus , quæ tamen sub finem morbi sponte aperitur . De reliquo hæc febris sereno , & æstivo tempore usitatus affligit .

Art. 229. Febris scarlatina quando sibi relinquitur nihil mali portendit , & sponte interdum iterum cessat . Si autem imprudenter tractatur in primis per regimen nimis calidum , aut per alia sanguinem commoventia , mala plerumque confectaria habere solet . Sufficiens hæmorrhagia narium sub eruptione scarlatinæ contingens , morbum insigniter imminuit .

Art. 230. Methodus vero medendi hic eadem omnino est , ac quæ ad purpuram urticatam adhibetur , cujus ex eodem descriptionem mox subnectemus .

Heisteri Sententia :

Art. 231. Febris *scarlatina* cognoscitur , quando in febre acuta maculæ amplæ , rubræ , ad colorem scarlatinum accedentes in cute hinc inde prorumpunt , eæque mox primis diebus , im-
mo

*Diagno-
sis.*

mo quandoque antequam febris percipiatur, quæ supra cutem non elewantur, & quidem etiam in facie, ubi petechiæ vix unquam prodeunt.

*Metho-
dus me-
dendi.*

Art. 232. Per se quidem non adeo periculosa, & pueros fere solum aggreditur. Quando levior, sola natura, præsertim si aptum regimen accedat, sæpissime sine medicamentis curatur; sed si paulo gravior, causa morbi optime corrigitur, & quoque expellitur sufficienti potu diluente, temperante, acidulo, potiunculis, & mixturis temperantibus ac diluentibus, ut & pulveribus temperantibus, & blande diaphoreticis, quando ægri a pulveribus non abhorrent, vitatis medicamentis, & alimentis omnibus calidioribus, quia ab his morbus redditur gravior, servatoque eodem regimine & victu ut in ceteris exanthematicis, & speciatim variolis. Qua via maculæ post aliquot dies sensim disparebunt, cuticula serè tota per lamellas decidet, & ægri tunc reconvalescent: quo tempore purgandi, & postea adhuc per plures dies in cubiculis, præsertim si tempestas frigida est, conservandi, ut transpiratio aliquandiu libera conservetur, utpote quod ad sanitatem integram recuperandam valde hic est necessarium.

*Quomo-
do ana-
sarca
post scar-
latinam
curatur.*

Art. 233. Quodsi vero ægri aut parentes hoc negligant, post tres circiter hebdomadas *tumore ventris* immo totius sæpe corporis, sive *anasarca* cum vel sine febre corripuntur, immo & *tumoribus glandularum*, aliisque sæpius malis gravioribus; urina simul solet fieri fusca ac turbida, & multi inde moriuntur. Cum vero novus hic morbus, (quem quidam pro altera febris scarlatinæ periodo habendum esse censent) ex retentis noxiis humoribus in corpore ortum trahat, optime ei medetur remediis, quæ hos humores e corpore educunt: id quod optime fit:

fit: 1^o. alvum ducentibus, iisque per intervalla repetitis, 2^o. quæ eos per urinam, utpote quam viam natura, urina illa fusca ac turbida, indicare videtur, expellunt; qualis præ ceteris est tinctura tartari bis terve in die ad x. xv. vel xx. guttas exhibita; vel & huic liquor terræ foliatæ tartari, aut spiritus nitri dulcis commode admisceri potest; 3^o. quando infantes aut pueri purgantia assumere renuunt, clysteribus quoque & decocto fol. senn. satis apte purgantur. Sudoriferis vero hic nihil efficitur, dum sudor vix ulla ratione obtineri potest. Interea tamen partes tumidæ a frigore probe sunt defendendæ: nam si valde frigent, sæpe instantis mortis inditium præbent. Si febris combinata est, quæ frequentissimum hujus mali solet esse symptoma, mixturæ & potiunculæ temperantes ex aquis diureticis paratæ, horis pomeridianis, & vespertinis sedulo exhibendæ. Alia symptomata remediis suis propriis sunt oppugnanda.

FEBRIS cum PURPURA URTICATA.

Art. 234. Febris hæc invadit sæpius cum sub- *Diagnō-*
tili sensu refrigerii in superficie corporis. Sub- *sis.*
sequitur inde moderatus calor, hunc comitatur
fitis non tamen adeo intensa; jungitur etiam
aliqua capitis perturbatio, aut lenior ejusdem
dolor. Tandem cum multo pruritu, & superfici-
ali tensione, & rigore hinc inde exanthema-
ta tam in facie, quam in reliquo corpore e-
rumpunt.

Art. 235. Hæc exanthemata cutim superant, &
citò in notabile augmentum ad crescunt, ac pau-
cas quasdam eminentias, paulo latiores coloris
pallido rosei urticarum læsiones referentes, of-
ferunt. Nonnumquam cum tuberculis semi-ery-
sipe-

lipelaceis, & asperitate serpiginosa efflorescit, & aliquo modo erysipelatis indolem imitatur.

Art. 236. Febris si adest mitioris indolis esse solet, non tamen constanter permanent exanthemata, sed diurnis in primis horis evanescent, quibus etiam motus febriles remittunt. Circa vesperam vero, ubi febris revertitur, denuo prodeunt, & eo tempore etiam pruritus molestus, & ardens insigniter affligit. Totus morbus intra triduum, aut quatrimum finem suum assequitur, & si a febre immunis est, adhuc citius exitum fortitur. Una cum temperata diaphoresi exit, & post cessationem exilissimæ squamulæ ab affecta parte secedunt.

Curatio.

Art. 237. Si umquam alibi certe in purpura methodus medendi debet esse temperatissima. Hinc essentias alexipharmacas utut temperatas, durante morbo hic excludimus, & solos pulveres febriles cum potionibus diapnoicis, & emulsionibus adhibere commendamus. Immo in purpura simpliciore non maligna, sed chronica, nec antimoniatata quidem fixa adhibenda esse censemus, quoniam in sensibilibus plus commotionis excitant, quam imperitus forte crediderit. *Confer. Prefat. Illustr. Stahliz.*

Art. 238. Quando diarrhœæ accedunt pulvis corticis cascarillæ ad grana decem pulveri febrili miscendus est. Sudores spontanei, qui durante morbo non exigua incommoda efferunt, neque supprimendi, neque promovendi, sed prudente ratione moderandi, vel tolerandi sunt. In declinatione morbi essentiæ alexipharmacæ temperatæ cum lenissimis laxantibus locum habent.

Art. 239. Regimen coactum licet noxium sit, caveant tamen sibi decumbentes, ne exiguum etiam aeris accessum refrigeratorium admittant:

hinc

hinc necessarium erit per illos dies, quibus purpura durat, lectum non sternere.

Art. 240. Quando exanthematum recessionis metus subest, potus aquæ calidæ ex. gr. thee commendatur, extra hunc autem timorem pro potu ordinario cerevisia dilutior, bene tamen defœcata, usui esse potest.

M O R B I L L I.

Sydenhami sententia.

Art. 241. In morbillorum apparatu primo die calor & frigus se mutuò expellunt, die secundo Febris sensibilis adoritur vehementi ægritudine, siti, inappetentia, lingua alba (non verò sicca) ruficula, capitis atque oculorum gravedine, & somnolentia perpetua stipata, plerumque etiam a naribus & oculis stillat humor (*signum certissimum morbillorum ingruentium*) insuper maculæ latæ & rubræ in facie & pectore conspiciuntur; sternutat æger, intumescunt palpebræ (viz. paulò ante eruptionem) vomit, sæpius tamen laborat diarrhœa cum dejectionibus subviridis coloris. Ingravescunt symptomata ad quartum usque diem, vel aliquando ad quintum, quo tempore maculæ pulicum morsibus similes prodeunt, quæ tam numero quàm magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris variæ figuræ interstinguunt, quæ quidem maculæ a parvulis quibusdam papulis rubris haud longè ab invicem diffitis super cutis superficiem paululum elevatis conflantur, digitorum levi tactu deprehenduntur, oculis remotis fugiunt: a facie sensim ad pectus, ventrem, crura, &c. se diffundunt. Die sexto aut circiter asperescit facies emorientibus pustulis; octavo in facie penitus

Historia morbillorum accurata.

eva-

evanescent, nono vix ullibi inveniuntur; tunc temporis augetur Febris, & spirandi difficultas, urget tussis, &c. *Morbilli omni vacante periculo, si modo perire tractentur.*

Curatio. Art. 242. „Morbili ab Avicenna *variola cho-*
 „*lerica* appellati cum ipsis variolis coævi sunt,
 „& quoad curam his cum illis satis convenit:
Diacodium quotidie vesperi exhibendum est;
linctas quoque & *apozemata pectoralia* propinari
 possunt ad tussim leniendam. Sin verò ex ca-
 lidiorè regimine, vel aliter, febris, dyspnœa,
 aliave accidentia post morbillorum decessum su-
 persint, *venesectione* sola curantur, quæ sine
 metu in tenellis audacter celebranda est. In re-
 gimine intense calido exanthemata aliquando
 livescunt, & nigrescunt, in adultis phlebotomia
 & temperatiore regimine sublevantur aut pe-
 reunt; in peripneumoniam incidunt.

Art. 243. „Morbilli nonnunquam (inquit Syl-
 „vius & omnes hoc scimus) per aliquot dies di-
 „stingui non possunt a variolis, *ne quidem a me-*
 „*dicis peritissimis, atque diu in praxi versatis:*
 „longè proinde satius est in re dubia medicum
 „vel suspendere suum iudicium, vel dubiè dum-
 „taxat respondere.

Mortoni sententia.

Curatio Art. 244. Quoad curam morbillorum; in pri-
in singu- mo stadio, scilicet, ante efflorescentiam paucis-
lis sta- sima remedia sunt adhibenda, nisi gravissima sym-
diis. ptomata superveniant, uti spasmi, enormes hu-
 morum colliquationes, &c. Si spiritus nimis ir-
Spasmi. ritentur, & in spasmos rapiantur, remediis ap-
 propriatis compescendi sunt, nempe *jalapûs* &
aquis coephalicis cum tinctur. castor. pulvere de
Cutere, &c. Et si nixus spirituum inde non mi-
 nuta-

nuatur, guttæ aliquot *laudanî liquidî* propinari debent. Ad *diarrhœam* quod attinet, satius est palliativa curatione ejusdem molestiam, quoties *Alvi fluxus* insolito more sævit, minuere, quam contra naturæ legem eam penitus tollere, atque ita ægotantem occidere; abstineat æger a cerevisia, bibatque decoctum album, & exhibeantur pulveres testacei; non nisi extrema necessitate ad *laudanum* perveniendum est. Ad tussim ferinam ab acri lymphæ ortam quadantenus cohibendam conveniunt *mucilaginosæ, pectoralæ, oleum amygdalarum dulcium, &c.* (privatim *syrupus e coral. & tinctura ejusdem.*), In tussi morbillorum pathognomonica, sæpè permolesta, & convulsiva, & nonnunquam lethali nullum remedium præstantius novi (inquit *Harris*) quam *gummi tragacanthum* copiosius sumptum in linctu vel decocto pectorali solutum, & pulveribus testaceis mixtum. Id enim gummi catarrhum maxime lenire solet, tussimque inde prognatam, symptomata morbillorum primarium, si flere aut levare aptum natum est, longe melius tutiusque narcoticis, quantumcunque hæc laudantur a clarissimo Sydenhamo, &c.

Art. 245. Efflorescentia jam incepta, imo eruptione plena existente quandoque suboritur *peripneumonia* cum respiratione anhelosa, strangulatione suffocativa, deglutitione læsa, &c. quo in casu, multo usu fretus omnibus auctor sum, ut sanguis copiosius educatur, æque ac si æger morbilloso affectu correptus non fuisset. Idem in *ophthalmia* molesta ac periculosa faciendum *mo-* *Ophthalmia.* *Ad alvi fluxum* in hoc stadio compescendum non minus tutus quàm necessarius est opiatorum usus. Efflorescentia peracta, si Febris venenatis symptomatis adjuncta remaneat, actum est de ægro. Contra, si crisis fuit perfecta, cathar-

Ultimum Stadium. thartica hydragoga adhibeantur, ad lymphæ colli-
 quatæ affectus exitiales impediendos: non tamen
 præpropere massa sanguinis agitetur, antequam
 venenum fuerit omnino subactum. Quoties æ-
Tussis ferina superstes. ger post morbillos *tussi ferina, & perpetua*, vexa-
 tur; primo in loco *venæsectio* celebretur, &, si
 opus fuerit, post unum vel alterum diem itere-
 tur, & una cum *linctibus & medicamentis lenien-*
ribus (quemadmodum in catarrho exhibere sole-
 mus) *correx Peruvianus* copiose exhibeatur, &
opiarum hora decubitus pro re nata.

V. & *Art. 246.* „ Ad præcavenda dira symptomata
 „ in hoc affectu evenientia, ab authore nostro
 „ enumerata, *phlebotomia* mature, in morbi ini-
 „ tio, celebrata, & vomitorium exhibitum fœ-
 „ liciter plerumque succedunt.

Art. 247. „ Qui Variolis laborarunt, non sunt
 „ adeo morbillis postea obnoxii, quare ætate
 „ grandiores non ita promptè inficiuntur.

Hoffmanni sententia.

Morbil- losa fe- bris de- scriptio. *Art. 248.* Morbillofa febris est catarrhalis e-
 xanthematica, ut plurimum epidemica, qua
 motu vitali cordis, & arteriarum aucto, mate-
 ria acris caustica, inflammans, ex interioribus,
 nervosis maxime partibus, sub forma macula-
 rum rubrarum ad cutem pellitur.

Differ- a vario- losa. *Art. 249.* In scholis & scriptis Medicorum
 plerumque quidem morbilli simul cum variolis
 pertractantur. Nec negandum multum utrisque
 esse affinitatis. Utraque enim febris exanthe-
 matica contagiosa, & epidemica, omnibus ho-
 minibus perpetienda; utraque certis temporibus
 magis vel minus benigna, & sequitur quam ma-
 xime atmosphæræ statum, corporis dispositio-
 nem ac temperamentum.

Art.

Art. 250. Maculæ ut plurimum post tertium diem prodeunt, pro varia corporum, succorumque dispositione diversæ, in aliis latiores, & ampliores, in aliis minores, in quibusdam instar morfus pullicum, modo rubicundi & purpurei, modo pallidioris, & magis plumbei aspectus. Maculæ hæ non elevantur in pustulas, ut variolæ sed lenticulari aliquali eminentia planam cutis superficiem excedunt --- Petechias item amplitudine, & elevatione tantisper notabiliore superant, longe mitioribus etiam symptomatibus stipantur, & malignitatis ut plurimum sunt expertes.

*Morbilla-
lorum
chara-
cteres, &
differen-
tia.*

Art. 251. Interim Morbilli per se minus periculi habent, & sæpius, potissimum in plebeis sine Medici ope, debito tantum regimine, iterum discedunt. Interdum tamen ob præcedentem, anormalam, insalubrem, diuturnam, temporum constitutionem, malignam habent epidemici in primis indolem, vel accidentales etiam possunt accedere causæ, ægros in discrimen adducentes. Malignitatem autem prodit virium impensa prostratio, extremorum frigus, inquietudo summa, vomitus, deglutitio difficilis, mentisque alienatio. Malum dein quando aliæ maculæ, virulentia non expertes, uti petechiæ, purpura, vel etiam pustulæ scorbüticæ complicantur, vel in fine cum vitæ discrimine superveniunt. Tussis porrò continua cum alvi profluvio, & inquietudine magna, infausum præsagire solent eventum. Neque boni ominis sunt sudores largi præsertim in proventioribus, qui ob malam diætam, & spirituosorum potum, calidum alunt, & impurum sanguinem; ex facili enim admissio levi frigore, maculæ funesto plerumque eventu recedunt. Finito etiam morbo si tussicula cum raucedine

Prognosis.

persistit, nisi citò idoneis succurratur remediis, in phthisim, & hecticam fit transitus. Qui autem morbillis occumbunt, maxime ex infantibus nono plerumque die suffocantur; in quibusdam superato morbo remanet alvi fluxus ad aliquot hebdomadas durans tabem cum morte demum inducens.

V A R I O L Æ.

*Chicken
Pox.*

Art. 252. „ Nihil de Variolis ante *medicos Arabes* scriptum invenitur. Hic verò morbus antiquior est, quam vulgò creditur. Authores isti existentiam ejus usque ab initio septimi seculi temporibus *Muhammedis* investigarunt. (Vid. *Freind. hist. med. p. 188. vol. 2.*) Variolæ ita appellantur, quasi parvi vari, quod cutem varient. Homini omni soli, & semel convenit Variolis & morbillis affici: in hoc autem censu non supputandæ sunt pustulæ variolosis similes, quas vulgò vocant *the Chicken Pox*; pueris familiares sunt; Variolis veris quidem similes sunt, quoad magnitudinem & figuram, sed in eo ab iis distinguuntur, quod Variolæ cum rubore & inflammatione insigniori appareant, hæ verò albidiores sunt, & veluti vesiculæ seroso humore repletæ, quæ intra triduum disrumpuntur, & exsiccantur, nullumque asferre solent periculum, & plerumque sine Febre erumpunt. *Morbus est adeo benignus, ut nunquam sub curam medicam cadat.* Variolæ (inquit *Dolaus*) quoad ortum suum seminarium habent nobiscum connatum, quod aliquamdiu sepultum jacet, donec nacta emergendi occasione ex latibulo erumpat, & massæ sanguineæ commixtum symptomata terribilia, & sæpe mortem producat: inter multas homi-

„minum myriadas vix unus & alter per totam
 „vitam ab his immunis manet. Ex cadaverum
 „sectionibus patet viscera universa in corporis
 „cavitatibus contenta pustulis variolosis conser-
 „tim affici, æque ac cutis externa. „

Sydenhami sententia.

Art. 253. Variolæ sunt *distinctæ* vel *confluen-* *Variola-*
tes: *Distinctæ* seu discretæ cum rigore ac horro- *rum di-*
 re invadunt; sequitur calor intensus, capitis & *screra-*
 dorsi dolor vehemens, vomitum, dolor circa *rum hi-*
 scrobiculum cordis, somnolentia, in infantibus *storia.*
 præsertim; quandoque etiam paroxysmi epilepti-
 ci, qui Variolas mox prorupturas, easque futu-
 ras esse mites ac benigniores plerumque præsa-
 giunt; quarto ut plurimum die ab invasione e-
 rumpunt, & symptomata febrilia evanescent,
 nisi quod adulti in sudores sint propensi. In facie
 primo conspiciuntur pustulæ subrubræ, deinde
 collo, pectore, & universo corpore, quæ magis
 magisque inflammantur, & in dies elevantur, &
 subalbidæ fiunt, cutē in interstitiis satis flori-
 dum colorem exhibente; die undecimo faciei
 tumor ac inflammatio recedunt, & pustulæ exa-
 rescere incipiunt; in hac Variolarum specie (si
 quando) die 14. vel 15. pereunt.

Art. 254. Confluentes cum discretis sympto- *Conflu-*
 mata communia habent, nisi quod hic atrociora *entium*
 sint omnia; tertio die erumpit hæc species, ali- *historia.*
 quando citius, raro serius; interdum verò, licet
 oppido raro, ob gravius aliquod symptoma,
 lumbaginem doloremve lateris, &c. serius erum-
 punt, neque periculo vacant. Febris etiamnum
 durat, crescente morbo pustulæ non in spectabi-
 lem molem attolluntur, uti in discretis, sed
 sibi invicem implicisæ vultum omnem conte-
 gunt,

gunt, & illum in tumorem elevant, dein ad instar pelliculæ albæ in cutis superficie conspiciuntur. Præterlapso die octavo pellicula alba quotidie exasperatur, & ad colorem fuscum vergit, eoque magis quo Variolæ confluerunt. *Magnitudo morbi a facie maxime æstimanda est, potius quam reliquo corpore.* In hoc genere adest in adultis salivatio, in infantibus diarrhœa; salivatio nonnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit interdum post diem unum vel alterum; die ferè undecimo saliva viscidior facta difficulter excreatur, ægri suffocationem intentans, & circa id temporis ut plurimum cessat, & tumor faciei paulatim subsidet, & tunc ejus loco manus intumescere solent, aut debent; diarrhœa non ita mature infantes invadit; sub vesperam exacerbatur morbus. Variolis discretis laborantes octavo, confluentibus verò undecimo die maxime intereunt. Interdum accidit pleuritis, interdum coma; interdum maculæ purpuræ (*totidem quasi Sphacelis*) pustulis interspersæ (mortis ferè semper prænuntiæ;) quandoque mictus sanguineus, & aliæ Hæmorrhagiæ, quæ idem ominantur, nonnunquam urinæ suppressio.

Art. 255. In confluentium genere æger (ut dixi) maxime periclitatur (a primo insultu computatione facta) die undecimo viz. in maxime vulgari confluentium genere, in crudiori adhuc 14, in crudissimo 17, rarissime 21. Ego Variolosum ab usu lectuli interdum semper arceo usque ad sextum diem a prima morbi invasione, quartum ab eruptione, quo tempore omne pustularum agmen in conspectu est; posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem.

*Regula
ferè semper
per observanda.*

Curatio. Art. 256. „ In confluentibus (ut recte inquit „ *Dolæus*) periculosa plena res est, alæ, & medicus occasionem habet suas tentandi vires, & „ *osten-*

, ostendendi, quid in arte medica calleat. In-
 dicationes curativæ duæ sunt, nempe, 1^o ut æ-
 quabilis tenor ebullitionis conservetur; 2^o ut pu-
 stulæ debito modo sustineantur, regimen cali-
 dum vitandum est; *gradus caloris earum expul-
 sioni accommodatissimus naturalis omnino est*; non
 opus est, ut æger ante diem quartum (255.) le-
 cto addicetur; neque ut ad propellandas vario-
 las ullum remedium sumat; quarto vero die, si
 eruptio ex votis haud succedat, exhiberi licet
 cardiacum aliquod blandius. Discretum genus
 ex sua natura plerumque omni vacat periculo.
 In confluentibus æger a sudore, quantum fieri
 potest, prohibendus est, & ptyalismus in vigore
 conservandus; promovetur autem affatim biben-
 do cerevisiam tenuem vel liquorem alium non
 nimis calefacientem. Adultis propinare soleo pa-
 regoricum cum laudan. liquid. gut. xiv. vel syr. de
 mecon. ℥j. hora sexta vel septima vespertina sin-
 gulis noctibus post plenam eruptionem ad morbi
 usque finem; temporius autem *hypnoticum* quam
 pro recepto more præscribo, quoniam exacerba-
 tio caloris quotidie sub vespere ferè reperitur;
 ex quo non modo incommodi nihil, sed ma-
 gnum emolumentum, quod frequentius experi-
 entia didici. *In hoc genere diarrhœa in infanti-*
bus est salutaris, & non temere sistenda, contra
in discretis. De venæsectione die octavo, & de
 auræ liberaliori exponendo; si quis velit; au-
 thorem consulat. p. 153. &c. Cum saliva admo-
 dum viscida evadat, uti soleo gargarismate se-
 quente; ℥. Cort. ulmi ℥vj. rad. glycyrrhiz. ℥ss. pas-
 sular. enucleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. in q. s. aq.
 font. ad ℥ss. colatura dissolv. oxymel. simpl. mel. ros.
 ana ℥ij. m. f. gargarisma. Interdum *emeticum* pro-
 pinandum est. In urina suppressione æger electo
 debet eximi. Pustularum depressio & diarrhœa

Nota
bene.

in variolis discretis medicamenta *cardiaca* postulant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. adoritur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præcedit; nihil enim est aliud, quam *Febris putrida proprie dicta hæc Febris secundaria*; ad hanc autem fugandam nihil efficacius præstat, quam copiosa sanguiniseductio: non enim nunc cum variolis res est sed *Febre putrida*; mittendus est itaque sanguis ad ℥x. vel xij. & *anodynum* bis in die propinandum; ob immensam alvi constipationem præscribere soleo *elect. lenitiv. ℥iſs.* in aqua lactis solut. Nihilominus *anodynum* stato tempore continuandum est; si prima vice votis non respondeat, iteretur die proximo: atque hac ratione tam *venesectio* quam *catharsis* per intervalla repeti possunt, prout Febris mos atque ægri inquietudo postulare videntur, donec tandem res in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis confluentibus magna est virtus *spiritus varioli* a 5^{to} vel 6^{to} morbi die usque ad finem copiose in cerevisia ten. exhibiti; commoda & incommoda hujus remedii. p. 256. &c. ubertim recensentur.

Variola anomala discreta. Art. 257. Variolæ anomalæ: *Discretæ* hæc a legitimis discriminabantur, quod erumpebant die 3^a, illæ 4^a, pustulæ minores fuerant; sæviebant tamen magis, & ante maturationem frequentius nigrescebant, ptyalismus (ut in confluentibus) aderat immediate post eruptionem; *Confluentes* hæc ab aliis discrepabant, quod nunc die secundo, nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi, quibusdam in locis; in femoribus præcipue, vesiculæ, ambustorum ad instar, sero limpido distentæ eminebant, quod disrupta pellicula copiose affluebat, subjecta carne nigredine & *sphacelo* quasi affecta; periculo non vacant ante diem septimum, in aliis con-

fluen-

fluentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremo hæ calidioris naturæ & magis inflammatoriæ; ideoque temperato regimini indulgendum est. *Hydrogala* ex tertia parte aquæ & lactis una simul coctis ægri palato & votis ut plurimum respondet, & ptyalifinum foeliciter promovet.

Mortoni sententia.

Art. 258. Variolarum quatuor sunt stadia, viz. *Quatuor* apparatus, eruptio, maturatio, & declinatio, in *stadia* quibus varia occurrunt symptomata, quæ diver- *Variola-*
rum. sam medendi methodum postulant.

Art. 259. Primum stadium est a morbi ipsius *Primum* insultu usque ad eruptionem generalem. In hoc *stadium.* stadio urina tenuis & pallida, præsertim si adsit frequens micturitio, male ominatur; urina rubicunda & contentis saturata contrarium indicat (insolitus aliqualis dolor vehemens, præsertim colicum æmulans, est pessimum signum.) *Diar-*
rhœa. *Diar-* rhœa in hoc stadio non permittenda est, quin *rhœa.* decocto albo & repetitis *laudani* dosibus est cohibenda, vel astringentibus sistenda. Vomitio in *Vomitio.* hoc stadio non statim supprimenda est, sed potius (nisi valde enormis fuerit) cum repetitis haustibus liquoris possetrici carduati, vel cum paucosale Vitrioli leniter promovenda est: Evacuazione autem hac levi peracta, vel si vomitio ex morbi ipsius genio modum excedat, illico tumultum spirituum compescere oportet, eorumque vires conservare alexipharmaco aliquo remedio cum opiato commixto, & post justa intervalla repetito; sequens est formula mihi familiaris, ℞. *Aq. card. lact. alexiter. hord. menth. stephan. ana* ℥ij. *sal. absynth. gr. xij. pulv. rad. serpent. virgin. & chel. cancr. comp. lapid. Contrayerv.*

ana ℥℥. *syr. caryoph. vel menth.* ℥℥. m. f. julap. de quo capiat ægiotus coch. ij. iij. vel iv. quarta quaque hora, addendo singulis dosibus laudan. li-

*Dolores
(pasm-
dici.*

quidi guttas aliquot pro te nata. „ Sanguis (inquit *Lister*) in Variolis non proprie mittitur, sed ex accidente tantum ut symptomati ali- cui vehementiori succurratur. „ In dolore ca- pitis, artuum vel lumborum, item in dolore pleuritico, seu peripneumonico, ut etiam quan- doque in colico, necessaria est *venæsectio*, ut sym- ptomata ista averruncentur; *vesicatoria* etiam &

Vigilia.

opiota hic locum habent; præcipue autem in af- fectibus comatosi. Ubi vigilæ in hoc stadio per- tinaces fuerint, non raro in proximo stadio ex- anthemata confluunt, quorum eruptioni deliria, spasmi, cæteraque funesta symptoma superve- niunt, quo nomine hoc symptomata venæsectio- ne & opiatas, ut ut spirituum vires inde minuantur, opportune cohibere par est, adhibitis in- terea visicatoriis & alexipharmacis. „ Insolitus „ aliqualis dolor vehemens ante eruptionem Va- riolarum, privatim *dolor colicam passionem æ- mulans*; est pessimum signum, & fere semper „ lethale, ut plus semel observavi, præsertim si „ adfuerit etiam *miçturitio*. „

*Stadium
secun-
dum.*

Art. 260. In stadio secundo exanthemata par- va instar acupuncturarum primo in facie, collo, pectore, &c. erumpunt tumore renitente, & ro- tundo; die secundo bases suas ampliant, & tertio (ultra quem hoc stadium non excurrit) in summi- tatibus acuminantur; quo longius est hoc stadium, eo periculosior est eventus; in hoc stadio in beni- gniori saltem genere, ubi nullum adest funestum symptoma, haud par est ullo remedio naturam laceßere, utpote quæ propriis viribus instructa sine artis suppetiis satis valide suo officio fungi potis est.

Art.

Art. 261. Triduo eruptionis elapso variolæ, *Stadium*
 sicut alia quævis tubercula inflammata, concoqui *tertium*
 incipiunt, & lymphæ venenata per glandulas cutaneas naturæ lege colata acrimonia sua cuticulam a vera cute separat; unde apices exanthematum, paucarum horarum spatio, primum albescendo quadantenus intumescunt; dein lymphæ eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel serius in pus mutata flavescent, aut saltem colorem cineritium vel subfuscum obtinent, ubi definit hoc stadium. Durante maturatione variolarum benignarum nulla exsurgit indicatio, sic forsan adhiberi possunt *laudani liquidî guttæ* aliquot ad dolorem leniendum, & somnum conciliandum. Inter maturandas variolas, si tarde procedant, *℥i. Lentium crasse contus. ℥j. ficuum ping. par. vj. ras. C. C. ℥ss. coq. in liquore posset.* ℥ij. bibatur copiose ad libitum, & si adsit ptyalisimus commode usurpatur gargarisma sequens, *℥i. Lentium crasse contus. ℥j. rad. alth. ℥ss. ficuum ping. parv. vj. vel vij. hord. mundat. p. j. glycyrrhiz. ras. ℥ij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥ss. colatur. add. mel. ros. ℥iss. m. vel gargarism. variolos.* Fuller. Vitentur acida in gargarismatis, nisi in maxima deglutiendi difficultate; deficiente salivatione, promoveatur urinæ profluvium exhibendo dosin unam vel alteram pulveris *Æthiopici*.

Art. 262. Stadium ultimum Variolarum est *Stadium*
 earum declinatio, in quo exanthemata pure maturo, & laudabili referta primum incrustari, & *ul-*
 scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum *tim*
 vel alterum diem pure concrecente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescent. Raro quispiam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in variolis benignis; de his etenim
 ut

ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum ἀνυπεξία, & appetitu restituto optime significat. Petechiæ seu vesiculæ miliares in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigiliæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominantur, quam in præcedentibus: paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem sortitur eventum, quam ea, quæ de repente exarescit; variolæ, quæ scabie sessili & adhærenti obducuntur, male præfagiunt.

Variola benigna. Art. 263. Ubi Variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumcinctæ, neque petechiis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, inter punctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & die secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minus pellucidæ; & tertio materia in pus convertatur, eventus foelix duodecimo saltem morbi die incuturus expectandus est.

Variolarum malignarum gradus. Art. 264. Quatuor sunt variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verum admodum parvæ & cohærentes, maxime confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctæ. Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore (maculis nigris hic illic interspersis) cum æquali superficie quadantenus crassescit; post triduum cutis albescit, & pergamenæ speciem inducit; atque hæ sunt variolæ maxime exitiales; ægrum ultra secundum maturationis diem nunquam superflitem novi. Variolæ secundi gradus magis vulgares sunt, quando cutis faciei sola erysipelatosæ est, & primo maturationis die pergamenæ spe-

speciem refert, dum in artubus & trunco corporis exanthemata fuerint fere discreta non tamen regularia; vix enim oculo distinguuntur ab efflorescentia morbillosa, vix apices tollunt, sed sæpe livescunt, unde mortem instare certo prælagire licet. Variolæ malignæ tertiis gradus, ubi *Tertius.* quasi discretæ verum admodum parvæ & coherentes, quæ non acuminantur, sed in cute solummodo conspiciuntur, ac si ab urticæ plaga exasperatæ, donec sub initium maturationis albescentes confluant, & speciem pergamenæ exhibeant. Rarius quenkum hac specie affectum, nisi ope Ptyalismis diutius protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intumescentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum vel decimum quintum morbi diem supersitem novi.

Art. 265. Gradus ultimus est, quando Variolæ erumpunt quidem discretæ figura & magnitudine regulares, verum vesiculis aqueis, vulgo *the Whith-hives*, petechiis, vel maculis lividis in interstitiis, præsertim in collo, pectore, & artubus distinctæ; atque hæ non minus sunt exitiales quam confluentes. *Gradus ultimus.*

Art. 266. In Variolis malignis Febris continua mali moris post eruptionem remanet cum lingua arida, pulsu debili, &c. Neque prorsus exulat, ut in benignis solet: materia enim morbosa, vel propter malignitatem, vel morbi magnitudinem, per glandulas cutaneas satis protrudi nequit, unde dira symptomata evenire solent nimirum hæmorrhagiæ admodum periculosæ, quæ ut plurimum, (maculis purpureis & nigris eodem tempore in conspectum venientibus) funestissimæ sunt, & vix aut ne vix arte cohibendæ, nisi forsitan Vitrioli fræno præpotenti (aq. styptic. reg.) obsignari possint; *nihil tamen profecimus, sed non una possimus vesicatoriis & alexiteriis generosissimis* *Curatio symptomatum.* *Hæmorrhagia.*

Misturicio. *mis vires spirituum pene extinctorum denuo resuscitare*; venæsectio mortem accelerat. *Misturicio* licet non adeo formidabilis, pessime tamen ominatur; in hoc symptomate sublevando *cineres buffonum* egregias obtinent vires (ut mihi usu compertum est) dos. ℥i. cum aliis alexiteriis quarta vel sexta quaque hora. *Dolor gutturis.* *Dolor gutturis & deglutitio* impedita est symptoma quandoque maxime affligens & molestum; fauces itaque externæ ab aeris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis muniri debent, quæ plus valent, quam croceata, vel alia quæcunque amuleta; & usurpentur gargarisinata appropriata, &c. *Salivatio.* *Salivatio copiosa, & diu protensa cum insigni capitis & faciei intumescencia* bene significat; *ptyalifinus* vero brevis & de repente suppressus, nisi profluvio urinæ, aut intumescencia extremorum excipiatur, malum omen exhibet; *salivatio diarrhœa* excepta pessime significat.

Post Variolarum declinationem inappetentia & calor hecticus. *Art. 267.* Morbosi quidam affectus quandoque post Variolas suboriri solent, inter quos inappetentia primum locum vendicat, quæ frequenter cum calore hectico conjuncta est, quo in casu ego multo usu doctus *alexipharmaca* (quo cæteros professores serio moneo) ubi calor fuerit continuus jugiter ministranda duco; *corticem autem Peruvianum*, ubi calor statim periodis recurrit, cum felici successu exhibendum impero; & deinde postea ad alvum subducendam tuto progredior. *Parotides, &c.* Parotides nonnunquam sub finem variolarum suboriuntur, quæ diu tanquam strumæ sine calore vel rubore permanent; *discutientibus* non sunt tentandæ, sed potius *fotibus maturativem promoventibus* tractandæ sunt. Eadem via procedendum est in furunculis, scabie faniosa, ulceribus mali moris, impetigine furfuracea, &c. *viz. alexipharmacis & febrifugis* ab evacuationibus

religiose abstinendo. Gangræna & caries ossium post variolas nullo medicamento cedunt. Tumores œdematosi *frictionibus*, *fortibus lixivialibus* & more hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis post variolas.

Gangræna & caries.
Tumores œdematosi.

Freindii sententia.

Art. 268. Sunt nonnullæ Febres, quæ *purgantia* commodè recipiunt, sunt etiam, quæ omnino desiderant (sed de hac re nondum satis accuratæ ab auctoribus traduntur regulæ) ex quibus nullam aliam æque *purgationi* opportunam reperio, ac eam, quæ variolas confluentes, maturitate pustularum aut vigente aut jam inclinata, semper excipit; ea quippe Febris uti omnium maxime putrida est, & periculi plena, ita præ cæteris curationem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis medendi rationem in putridis hisce Febribus, quæ variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi quidem sæpius usu venit, ut in Variolarum statu, ubi pustulis exarescentibus Febris nihilo secius invaluerit, ad *purgantia* confugerem, quæ ita periculo vacare, ita commodè adhiberi posse expertus sum, ut multorum vitas ab hac maxime medendi via conservatas esse haud absurde dixerim. „ Doctrina de usu *phlebotomiæ* „ & *catharsis* in Variolis confluentibus post imperfectam crisin in literis a peritissimo D. Ca. „ de ad eundem datis succincte admodum continetur; en ejusdem summarium:

Purgationis
usus in
Febre se-
cundaria.

Art. 269. In Variolis confluentibus, quamdiu faciei tumor & inflammatio manet, & saliva recte fluit, a *venesectione* & *catharsi* (pari ratione ac furunculo maturante) prorsus abstinendum esse duco. Scilicet, ne istæ evacuationes, materiam morbidam a massa sanguinea separationem, & per

Quando
neque
venese-
ctio.
Neque
catharsis
conveni-
unt.

& per pustulas, tanquam per tot phlegmonas, (cui unico hoc tempore natura incumbit) ejectionem obturbarent. Insuper, procedente morbo, si eo tempore, quo facies detumere, & ptyalifinus decrefcere incipit (quod die nono vel decimo ab eruptione accidit) si his, inquam, diebus manus debito modo tumeant, & nulla malæ notæ appareant symptomata, haud omnino (me iudice) vel *phlebotomia vel catharsis*, adhuc indicatur; sed totum negotium recte committitur naturæ. Interim tamen in hoc morbi statu *enema* quotidie injiciendum præscribo, quo alvum facibus exonerare, & Febris furorem coercere curo.

Quando
utraque
evacuatio-
nes
sunt ne-
cessariae

Art. 270. Attamen, facie diebus prædictis criticis detumente, quoties (quod nimis frequenter evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pure, nec manus intumescunt; unde (nempe a materia morbida in sanguinis massa remanente eamque inquinante) ardens Febris nascitur; respiratio brevis & frequens oritur, corporis jactatio, & obstinata (narcoticis incassum exhibitis) vigiliæ urgent; quoties equidem diris his symptomatibus vexatur æger, medico incumbit per *venesectionem & medicamentalem purgantia*, sæpiusque debitis intervallis repetita, humorem peccantem detrahare, & eo, quo possit, modo, laboranti, subvenire. In Variolis denique confluentibus, licet facies & manus & pustulæ corporis debito modo, ac tempore, intumuerint, & saliva satis copiose statuto tempore fluxerit; si tamen, Ptyalismo desinente & dictis partibus jam subsidentibus, Febris utcunque (quod in hac morbi specie ut plurimum accidit) gravior assidue inhæreat, & symptomata, ex hac nata (utpote anhelosa respiratio, vigiliæ, anxietates, cum pallida & diluta urina indefinenter urgeant

geant ægrotantem, rebus sic stantibus, necesse habet medicus sanguinis quantitatem *venesectione* minuere, (nimirum ut exinde pars reliqua magis placide per vasa fluat) & materiam morbidam (quæ per pustulas, jam induratas & crusta obductas amplius transire nequit) *Catharsis* sæpius repetita evacuare: his enim evacuationibus omissis, semper evenit, ut vel memorata symptomata in dies augeantur, & inter diem duodecesimum, & vicesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravasetur, eorumque vesiculas corrumpat; unde ægrotus miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

Art. 271. Anhelosæ respirationi, crisi super-veniente *phlebotomia* foeliciter ac unice occurrit, quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægrotato, neque hoc in casu pulsus humilis & angustus me terret; quippe sæpius observavi vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse: unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædentis oneri, deberi. Venesectio tamen missum cruentum non modo non cohibet, sed augeat, & mortem in procinctu stantem accersit: hoc tamen funestum fati impeditis prænuntium (Camphora bis in die exhibita & acidis larga manu propinatis) amovi, ægroque brevi morturo ad tempus succurri: sed ut vera fatear, ne unum quidem Variolis affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem 16^{um} ab eruptione supervixisse notavi. De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. „ Atque ita *purgationis* „ methodum in Febre secundaria tanquam unicam salutarem venditat *D. Freind* & alii apud „ illum nonnulli magni nominis medici: Ego „ vero, qui sum tardioris ingenii, rurique de- „ go, de hac re aliquanto dubius adhuc hæreo.

In anhe-
losa re-
spiratio-
ne phle-
botomia
est uni-
cum re-
medium

In multu
cruento
est noci-
va.

„ Hi viri , ingentia certe artis nostræ lumina ,
 „ seculique ornamenta , satis ingeniose ratioci-
 „ nantur , omnesque fere summa eloquentia vi-
 „ cios in illorum sententiam facillime descen-
 „ dentes inveniunt : sed sola experientia duce
 „ caute admodum progredi decet . In praxi mea
 „ per viginti circiter annos *clysmatum* injectionis
 „ utilitatem deprehendi ; sed *cathartica non nisi*
 „ *rarissime propinare ausus sum* . Optandum erat ,
 „ quod viri præfati meritissimi numerosiore hi-
 „ storiarum seriem tam morientium quam viven-
 „ tium protulissent , ut in re adeo ancipit æquius
 „ iudicium ferre potuerimus .

Farrago sententiarum .

*Variola
 morbus
 novus .*

Art. 272. Variolas esse morbum novum satis demonstratur , quod in multis mundi partibus nunquam visæ fuerunt , ut apud *Indos occidentales* ubi nunquam apparuerunt , nisi postquam Hispani eo pervenere ; siquidem per contagionem *Æthiopis* cujusdam , illuc delati , magnam *Indorum* partem sustulerunt , ut testatur R. a *Fonseca* . *Helbigius* indubitanter affirmat incolas *Indiæ orientalis* Variolas nunquam tentasse ante commercium *Hollandicum* .

*Regimen
 frigi-
 dum .*

Art. 273. In Variolis *Alfaharavius* omnes in-
 frigidantes medicos nostri seculi multis para-
 fan-
 gis anteivit ; maxime in primo Variolarum tem-
 pore , nempe , in sanguinis missione ad synco-
 pen , & frigida immensa quantitate , & confer-
 tim exhibitæ , potione ; eaque sæpius repetita ,
 paucis horis ; at quantum video , sine successu ;
 his enim non obstantibus , venenum intra habi-
 tum corporis resistabat .

*Sanguini-
 nis tex-
 tura in*

Art. 274. Illud tantum (inquit *Lister*) curio-
 sius animadverti (in Variolato cum maculis pur-
 pureis

pureis hæmorrhagia narium & mictu sanguineo) *Variolis*
 sanguinem refrigeratum tenerrimum fuisse, & *malignis*
 ejus crassamentum rubrum quod molliori pennæ
 pluma percussum facile dividi potuerit. In aliis
 autem multis, quibus urina cruenta, sanguinem
 e brachio missum adeo aquatum, putridumque
 esse vidi, ut fluctuaret crassamentum in vase,
 non aliter quam ipsum serum; neque ullum ser-
 vatum memini in tanta pestilentia, (76.), „ Va-
 „ riolæ præcedente crapula accidentes, ut etiam
 „ luxuriæ & intemperantiæ deditis, plerumque
 „ graviores sunt, & pessimi moris, & fere sem-
 „ per lethales. „

Art. 275. In variolis confluentibus (inquit *Viresces*
 idem author) hunc in modum præscripsi; *rhinel.*
M. Croc. ℥j. cochinel. ʒß. sacchar. tantillum; m. pro in vario-
chart. viij. capiebat ægra unam quarta quaque hora lis con-
cum coch. i. vel ij. aq. theriacal. per triduum & postea fluentia
sexta quaque hora; item diacod. ʒj. mane & vespere
ri, & convaleuit; & pro alia fœmina ad eundem
fere modum, M. Croc. ʒß. cochinel. ʒß. sacchar.
cand. ʒj. m. pro chart. vj. cepit. unam tertia qua-
que hora.

Art. 276. Ego (inquit idem) neminem bis *Rarissi-*
 infectum memini, præter unam fœminam, quæ *me ali-*
 in hac urbe (*Eboracensi*) me teste, intra an- *quis bis*
 num variolis bis decubuit, & convaleuit. *infici-*
tur.

Art. 277. Nihil observatione dignius est (in- *Signum*
 quit *Etmüllerus*) quam anhelitus & vox in va- *saluta-*
 riolis; ubi enim prompte recteque agitur respi- *re.*
 ratio, vox facile sequitur, neque raucescit, ad-
 modum salutare signum est. *Stercus equinum* in
 variolis est sordidum quidem, sed egregium re- *Remedia*
 medium, promovet sudorem, præservat guttur, *Nonnul-*
 &c. a quibusdam etiam deprædicatur *Stercus ovium* *la singu-*
laria.
 „ Nee locum infimum obtinet oleum sem-
 „ lini, vel amygdalarum dulcium, ut practiceis

„ quibusdam peritis satis notum est. Quodnam
 „ sit istud remedium, cui vires supereminentes
 „ *Waldschmidius* & *Doleus* attribuunt, plane
 „ nescimus: optandum sane esset, quod tale me-
 „ dicamentum, de quo loquuntur in morbo tam
 „ exitiali, in rerum natura revera daretur. De
 „ hoc remedio hæc habet *Waldschmidius*; uti-
 „ mur *alio quodam remedio in forma liquida*,
 „ quod a primis statim diebus usque ad finem
 „ in adultis ad cochleare unum dari potest, quo
 „ ipso putò reconvalescentiam, divina adjuvan-
 „ te gratia, certe promitti posse, ut ut gravif-
 „ sima adsint symptomata; præcipue autem hoc
 „ remedium est dicatum *inflammationi*, quo &
 „ externe uti possumus. Et alibi; omnibus com-
 „ mendo *liquorem contra Variolas* a D. D. *De-*
 „ *laeo* & me millies expertum, quem & nos una
 „ invenimus. Multo uberior est *Doleus* in hu-
 „ jusce specifici laudibus, ut & videre licet,
 „ P. 574.

„ *Art. 277.* Variolæ acu perforatæ tardius cu-
 „ rantur, & crustas diutius retinent, unde ci-
 „ catrices foediores relinquuntur; ideoque natu-
 „ ræ satius sunt relinquendæ. „ Maculas a va-
 „ riolis relictas (observante Barbette) præprimis
 „ delet *oleum myrrhe per deliquium ex albuminibus*
 „ *ovorum paratum*, ut & *oleum vitellorum ovorum*.

„ Si quis linimentum velit, sequens in usu apud
 „ medicos *Londinenses* est elegans præscriptum;
 „ *℞. Ol. amygd. dulc. ℥i. cer. alb. sperm. cet. ana*
 „ *℥j. balsam. Gileaden. ℥ss. f. f. a liniment.* „ Ul-
 „ cera corrosiva (inquit *Bonetus*) in facie & alibi
 „ optime sanantur cum *spiritu vitrioli melle rosa-*
 „ *teo ad sufficientem aciditatem permixto*; semper
 „ respondet voto medentis, etsi dimidiam genam
 „ ulcus absumperit.

„ *Art. 278.* Remedia in hoc morbo insigniora,
 „ præ-

Ulcera
 corrosi-
 va.

præter jam memorata, sunt, quæ sequuntur :
Kermes, gum. lacca, viperina, cinnabaris anti-
monii, tinctura bezaordica, tinctura corallor., de-
coctum rubicundum, decoctum variolosum, garga-
risma variolosum, loboch rubrum, unguentum de
bismuth, ad foveas Bat. &c.

Art. 279. Merito admiramur omnium mor-
 borum frequentiore quavis in Regione tantam
 disputationum causam ministrasse, ut nondum
 de curationis methodo sententiæ conveniant. Ut
 ut verum sit in calidis Climatibus oportere,
 methodus curativa ab ea differat, quæ in fri-
 gidis, temperatisque optime cedit, fieri tamen
 potest ut de generalibus statim adhibendis con-
 veniratur. Sed quovis modo res se habeat ait
Dictionaire Medicinal Auctor Bruxellensis nunc
 eam traddam methodum, quæ diversis in Cli-
 matibus etiam ad invicem oppositis mihi foelici-
 ter experiri licuit, quam etiam quispiam ullo
 absque periculo ubivis locum adhibere poterit,
 addendo simul id, quod magis congruere aeri,
 in quo degit, observaverit.

Art. 280. Vix ac signa perspecta habentur hu-
 jus morbi ingruentiæ qualia sunt: Vomitus,
 Capitis dolor, alvi fluxus, dolor lumborum,
 sed præcipue dorsi & ad cordis scrobiculum (quod
 certius signum est) ægro venam secare necessa-
 rium est in brachio semel, interumve. Si vero
 somno lethargico æger teneatur, dandus ei tar-
 tarus emeticus cum manna in jure carniū,
 quia hisce in circumstantiis hoc præstantius nul-
 lum vomitorium datur, quod adhiberi ideo debet,
 quia genus nervosum concutere, & excitare
 aptum est; quod si multis cibis assuetus sit æger,
 vel hesternæ luce alimentis confertim indulse-
 rit, vel eadem aliquot supra diebus copiose in-
 gurgitaverit, sequens propinare ei Vomitorium

Menho-
duſ cu-
randi
vario-
las.

præferimus, ut inde stomachus a cruditatibus infarciens vindicetur.

℞. *Vini Emetici* unc. j. *ol. amygdal. dulc. unc. sem. syrup. violat. unc. j. aq. card. bened. unc. ij. aq. cinamom. hord. ℥ij. m. f. haustus* unica dosi pro adultis, *cujus dimidium* infantibus, & pueris ab ætate v. usque ad x. annor. inseruit, quarta pars junioribus, & $\frac{3}{4}$ partes ab ætate x. annor. usque

ad xvi. Hoc vomitorium nisi post binas saltem phlebotomias juberi non debet, nec porrigendum est, nisi ut memorata impedimenta tollantur.

Postea sequenti Ptisana æger utatur.

℞. *Radic. scorzon. Graminis ana man. j. bulliant per hor. quadrant. cum Aq. font. ℔iv., quibus add. in fine ebullitionis Glycyrrhizæ concisæ ℥ij. pro potu ordinario.* Si autem *Exilir Theriacale* paratum profuerit, de eodem exhibentur ter vel quater in die gutt. iv. pueris decimum ætatis annum non superantibus, gutt. viii. ab anno x. usque ad xiv, & gutt. ij. ætatem habentibus quarto anno minorem, cum supradictæ Ptisanæ cochleare uno. Loco hujus alexipharmaci exhiberi possunt nonnulla meri cochlearia cum paucis Croco, pulvere C. C. & succini, vel cum prædicta Ptisana gr. vi. xij. vel xx. pulv. viperin. vel Theriac. mixtim.

Art. 281. Quodsi Febris symptomata admodum non sint vehementia, opus Naturæ relinquendum absque sanguinis emissionem, purgatione, & vomitu suscipiendis, metu ne a surgente conflictu eadem turbetur, a quo victrix ullo absque auxilio ut plurimum solet emergere. Necessarium solummodo est, ægrum in loco decumbere, ubi aer temperatus adest, cavendo ne strangulis nimium obtegatur; tum igne mediocri cubile calefaciendum; quod inde aper-

tis fenestris circa meridiei horas, si tempus su-
dum, per unam vel alteram horam ventillabi-
tur, curando tamen diligenter ut, quamdiu
fenestræ apertæ manent, velis ductilibus ægri
lectum muniatur, quæ clausis deinde fenestris
ad ejus pedes contrahi poterunt, ut aerem li-
berius possit respirare; sic aer quotidie hac re-
gula diligenter, & scrupulose observata uti-
liter renovabitur, quia major ægrorum pars ne-
glectu renovationis aeris magis ac qualibet alia
de causa occumbit. Hoc sane regimen tutius est
quolibet alio, quod possit adhiberi in variolis;
in quibus tamen, si complicatæ sunt, & con-
fluentes, vel purpuratæ ad validiora item con-
fugiendum est auxilia, cujusmodi insigniores
Medici præscribunt.

Artic. 282. Quando pustulæ albescere inci-
piunt, abluendæ sunt urina pueri x. vel xii. an-
nis nati, qui sanus simul sit, & robustus, tum
sequenti inguine deliniendæ.

*Quid
præstan-
dum cir-
ca pustu-
las.*

℥. Adipis suilli aqua 24. vicibus diluti q. v.
stercoris vaccini tantundem, frixentur simul,
dein affundantur in sacculum a fumario suspen-
sam. Quod ab eo exstillat pluma albescentibus pustu-
lis illinitur. Hujusmodi inunctio cutem emol-
lit, atque laxat, unde minorem resistantiam
cum experiatur subjecta materia, sibi viam ape-
rit, & egreditur, nec tempus invenit carnem
errodendi, foveasque ibidem imprimendi. Ea-
dem item quovis alio unguento præstantior est
& commodior pro quavis ætate, & quolibet
ægro. Ceterum utile ac laudabile est alvum pur-
gare postquam omnes dies critici elapsi sunt,
qui ad 21. usque extenduntur, sed hoc ipsum
ultra diem trigesimum peragendum consulo.

Art. 283. Febres quæ variolas comitantur,
modo benignæ sunt, modo vero malignæ, quæ-

*Obser-
vatio-
nes.*

dam variolæ adeo parum malignæ dantur, ut sponte sua & nullo pharmaco foeliciter decurrant, quemadmodum in rusticis cernimus, quorum pueri hoc morbo dententi hac illacque vagari non cessant. In urbibus autem periculosiores sunt ob delicatulam vivendi rationem, cui pueri adolescendo ascuescunt. Ast adolescentibus ubique gravius periculum impendit quam pueris, quando hoc morbo corripiuntur, quia cum adultiores cutem duriores firmioresque habeant infantibus pustulæ ægrius in illis erumpunt, atque hinc sequitur humorem, potius ac externe putrescat, intus reverti.

Pustulas in morbillis rubescere bonum signum exhibet, malum vero viridescere, aut luteas fieri. Aliquando eadem pustulæ cæruleæ, lividæ, & nigræ observantur, quod pessime ominatur, non minus in morbillis quam in variolis. Satis tamen notum est, hunc morbum illo graviorem esse, & periculosiorem.

*Remedia
pro va-
riolis æ-
gre pro-
deunti-
bus.*

Art. 284. Quando variolæ satis copiosæ non erumpunt, frictionem totius corporis laudat *Brunerus* sequenti unguine instituendam.

℞. Ol. amygdal. dulc. Chamamel. ana unc. sem. aq. Chamamel. unc. j. coq. simul. ad unguenti consistentiam, ut in præfatum usum facecant.

Optimo successu sequens remedium adhibuisse *Ettmullerus* testatur, quando variolæ non prodeunt, ægrumque in præsens periculum conjiciunt.

℞. Camphor. gr. j. castor. Myrrh. ana gr. iv. stib. diaph. gr. xv. misce. Hoc pulvere gr. xv. vel xx. saepe ager utatur.

Addit *Forestus* se plurimos sequenti remedio sanasse, etiam morbillis & Variolis epidemice grassantibus.

℞. Cerevisia ℥ viij. caric. ping. man. j. coq. simul & colat. sit in potum ordinari.

Art.

Art. 285. Alia item remedia pro pustulis commendantur : quando videlicet ad maturitatem perductæ candescunt , sequenti liniri possunt unguento :

Ad pustulas putrescentes edulcorandas.

℞. Ol. amygdal. dulc. recent. expr. q. v. cremor. hord. tantundem. Conquassent. simul ad consist. Unguent. quo sæpe in die pustulæ obliniuntur.

Frustulum adipis suilli ad ignem accensi deinde extincti pro eodem usu adhiberi potest . Hoc pustulæ illiniuntur . Aliud item laudabile Remedium ab *Ephemer. M. N. C.* excerptum sic paratur .

℞. Myrrh. q. v. Vini spir. q. s. m. Hoc liquore pustulæ sæpe irrorantur uno, alterove die; dein eadem tepide foveantur aq. ros. cum Sacchar. saturni.

Art. 286. ℞. Aq. Ros. & plantag. quibus addito croco mixtura agatur. Hac vero & pluma palpebræ illiniuntur timore ne pustulæ affatim circa oculos congerantur. Quidam testatus est ad defendendos oculos a pustulis, numquam remedium omisisse, cujus vim præstantissimam expertus est frequenter. Hoc vero ita se habet.

Quomodo oculi a variolis defendendi.

℞. Aq. Ros. plantag. solatr. ana unc. j. Gran. Sumach. ʒj. sem. plantag. ʒ. s. coq. & colat. a principio morbi in oculos subinde instilletur.

Ut oculi a variolis tueantur quidam Aquam Plantaginis laudant, in qua sæpe extinctum sit frustulum ad ignem candefactum auri . Hanc guttatim subinde in oculos destillant . Alii etiam oculos sæpe in die foveant mixtura ex Aq. puræ part. vj. Aceti part. j. ad ignem prius calefacta , quod auxilium sæpiissime optimum effectum præstitit , modo caveatur , ne facies reliqua ab hoc mixtura abluatur , quia ejus virtute variolæ facile recederent , & æger vita periclitaretur;

tur; vel materia variolosa in fauces deflueret, quod sane haud minus esset funestum.

Quando variolæ oculos obsident, frustulum carnis vitullinæ recentis, & tepidæ imponatur; nam lymphæ acedinem in se recipere valet. Necessarium est autem singulo quadrihorio hujusmodi frustulum renovare, ejusque usum aliquandiu continuare. Quando interjectis impuritatibus palpebræ conglutinantur, easdem abluere sequenti juvat decoctione.

℞. *Semin. cydon. fœnugrac. lin. ana p. j. aq. font. ℥j. bull. & colat. servetur usui.*

Testatur *Lipsius* ope sequentis decoctionis adolescentulum, ab anno integro visum propter variolas amissum, recuperasse;

℞. *Rad. gentian. num. iv. vel v. Aq. font. Vin. opt. ana ℥j. Contuseradices bull., & colat. deinde ter vel quater de die in egri oculos instilletur.*

Ad maculas arcendas, quas aliquando variolæ in oculis relinquunt, *Forestus* jubet guttulam Ol. Mustellæ instillare. Ceterum, cum omnes Oculorum morbi ratione visus inter graves reputentur, nihil moliendum, aut suscipiendum est absque peritioris cujusdam, doctorisque Medici consilio.

Quomodo
de præ-
servandis
de na-
res.

Art. 287. Ut etiam nares a variolarum læsionibus tueantur, sequens commendamus remedium.

℞. *Ros. damascen. p. iij. camph. gr. viij. m. f. pulv. sæpe naribus sumendus per se vel aceto mixtus.* Quando in naribus efformantur escharæ: ut eadem facile decidere possint butyro recenti minime salito inunguntur. Eodem butyro aqua rosarum sæpe numero abluto, crustis fricatis, eadem frictionis vi facile concidunt.

Deci-
dende ad

Art. 288. Si variolarum impetus fauces obsideat.

deat suffocationis periculum ægris impendit, fauces quod ut evitent *Forestus* sequens remedium laudat.

℞. Aq. plantag. lactis caprill. ana p. e. m. pro gargarismate. Aliud item eadem de causa remedium laudatur, quod est: ℞. stercor. caballin. pug. j. aq. font. lb. j. s. aq. semper vivi major. cyath. j. infund. omnia simul, & colat. sit ad usum gargarism.

Art. 289. Quoad maculas faciei discessis variolis residuas, ut eadem tollantur. ℞. Farin. lupin. fabar. ana Zij. urinae bovis q. s. m. f. cataplasma. quo cubitum iturus faciem ager obducatur, & manu sinistra aq. flor. fabar. abluat. Sed ad cicatrices implendas nonnulli unctionem ex anguillarum adipe commendant.

Art. 290. Quando labia a variolis obsidentur, sequens mucilago utiliter in usum ducitur. ℞. semin. cydonior. pug. j. ebull. in aq. font. lb. j. usque ad consumpt. humid. mucilaginis residua obliniantur labia.

Præter remedia ad curationem variolarum opportuna, quorum meminimus, meliora, quæ iidem adhiberi possunt sunt, quæ sequuntur: gran. scarlat. guinn. laccæ; serpentar. virgin. cinab. antim. tinctur. bezoard. *Fulleri*, tinct. corall. *Bates* decoct. rubra ejusdem. Decoct. ad variolas *Fulleri*, gargarisma ad variol. ejusdem Auctoris, Lohoch rubr. ejusdem, unguent. bismuthi ejusdem, & similia.

Art. 291. Methodus curandi infantum variolas in hoc maxime consistit; ut nempè infans nullo alimento solido adhibito, jusculis ex carne vitulina, & volatiliū vel gelatinis similibus tantum victitet; ptisanam ex hord. mund. & rad. gramin. glycyrrhiz. cum passul. minor. in potum usurpet, & in cubiculo temperato de-

Pro ma-
culis in

faciere

siduis

Pro labiis
obsidentis

Methodus
curativa
variolarum
pro
infantibus

cum-

cumbendo, alvum clysteribus apertam referat. Si variolæ cum vehementi febre conjungantur, & difficilis respiratio adsit, leves phlebotomiæ celebrare, & in fine variolarum alvum quodam syrupo purgare juvabit.

Quomo-
do cu-
randa
pustula.

Art. 292. Statim ac pustulæ in eisdem prodeunt ol. amygdal. dulcium, vel lactis cremore, vel butyro recenti inungantur, ubi candescunt (quod ut plurimum nono die evenit) perforari debent, ut contentum pus evomant. Earum exsiccatione invalescente ægri facies recenti lactis cremore cum quo bolus alba mixta fuit, illiniatur, atque mane & vespere quotidie usque ad crustarum decidentiam continuetur. Oculi infantum a variolarum læsione incolumes servantur imponendo turundas aqua plantaginis, vel rosarum imbibitas, atque, ut respiratio liberior sit, non solum ægri nares a crustis intus natis subinde liberari debent; sed fauces etiam edulcorari, & refrigerari ptisana aliqua tantillo syrupi violati medicata.

Inter legendum.

Art. 293. Variolæ confluentes, eæque ex genere discretarum, in quibus pustulæ mirum in modum plurimæ accurrunt, semper summum periculum habent, quia symptoma aliquod gravius facile inferunt, & difficilis atque implicata evadit ægri tractatio, cum ii qui earum curationi assident, ancipites ut plurimum hæreant in auxiliis, quæ aptius conveniunt, eligendis. Hoc vero casu sequenti ratione se se gerere prudentius consulit D. Lobb in suo tractatu Anglice conscripto de variolis, quem Gallice Anonymus quidam vertit, & Parisiis edidit ann. 1749.

2. Can-
tiones.

Art. 294. 1°. Quousque nulla idea constat sta-

tus morbi, qui vos ancipites detinet, quoniam remedio impetere eundem debeatis, præstabit nullum jubere; nam tutius erit naturam sui juris relinquere, ac contrarium præbere remedium, quod pro abigendo symptomate, cui intenditur, aliud periculosius invehat.

2. Pulsus conditiones diligenter explore, gradumque caloris in ægro perpendite, ut ad eorum normam consilia dirigere valeatis.

Art. 295. Binæ quæ sequuntur regulæ sunt itidem magni momenti.

1^a. Si pulsui celeri ac valido una cum calore corporis insigniter aucto symptomata periculosa superveniant, concludendum: pulsus illi nimis celerem ac validum fore caloremque itidem nimium, atque adeo eorum iminutioni opus impendendum erit diligenter. Quamobrem ad usum diluentium affatim hauriendorum confugere præstabit, quæ acidiuscula reddi poterunt additione succi malorum aurantiorum, vel limonum, vel nonnullis spir. vitrioli guttis. Conveniet etiam serum lactis aceto præparatum interdum exhibere, quod tantillo sacchari edulcorabitur.

2^a. Si pulsui celeri, & debili una cum calore corporis aut naturali, aut naturali minore symptomata periculosa accedant, concludendum est pulsus illum, caloremque vitalem debiliores magis quam par est, fore; atque adeo opus esse eosdem augere. Quamobrem serum lactis vino canarino præparatum ægro exhibere præstabit, tum ei dandæ erunt panatellæ, avenacea, hordeacea &c. additione cujusdam aromatis: ut macis, vel nucis moscatæ conditæ; vel etiam merum cum aqua, & saccharo tepide; interdum quoque vini cocti cyathum instar cordialis, advertendo tamen ne aut meri, aut aromatum usus æquo gene-

generosior vel partior sit, quod ex pulsus debilitate, & caloris naturalis iminutione facile cognoscetur.

Quibus
atten-
dendum
in vario-
lar. cu-
ratione.

Art. 296. Ad tutius dirigendum iudicium de statu ægri, & de auxiliis opportune usurpandis consulit præfatus Auctor, ut practici memoriter semper retineant, tum favorabilia, tum quæ periculosa sunt symptomata variolarum, atque adeo ut sæpe perlegant duas, quæ subjungit tabulas, ideo concinnatas, ut utriusque speciei symptomata, quæ frequentius occurrunt, facile innotescant.

Tabula symptomatum quæ bene ominantur.

Beni-
gniorum
sympto-
matum
recensio.

Art. 297. Bene in variolis portendunt.

1°. Si in statu febris capitis, & dorsi dolor, calor, sitisque moderate urgent.

2°. Si nulla supervenit vomituritio, aut stomachi angustia, nec in infimo ventre ullus dolor percipitur.

3°. Si variolarum eruptio nisi circa finem tertii diei, aut initium quarti prodit.

4°. Si infantibus tertio die epilepticus paroxysmus accedit.

5°. Si pustularum eruptio gradatim evenit, earumque incrementum regulariter usque ad majorem gradum succedit h.e. usque dum convenientem magnitudinem acquisierint.

6°. Si suppuratione constanter regulariterque provehente pustulæ quæ sunt in facie decurrentibus diebus 7°, 8°, 9, 10°, 11°, maturescunt, quæ vero sunt in reliquo corpore diebus 12°, & 13°, cum sensu doloris subcutaneo, vel summa cutis sensibilitate, atque pulsatione in locis ubi pustulæ congerantur.

7°. Si facta eruptione symptomata febrilia evanescunt.

8°. Si

8°. Si circa octavum palpebræ oculorum inflantur.

9°. Si circa nonum caput inflatur usque ad undecimum.

10°. Si circa decimum aut undecimum inflantur manus atque digiti.

11°. Si rubicundus, & cinnabarinus color durante suppurationis periodo spatia pustulis interjecta tenet.

12°. Ubi respiratio libera sit & facilis.

13°. Somnus moderatus, & vires roborans.

14°. Appetitus ciborum bonus.

15°. Expulsiō copiosa materiæ lucidæ, & aquosæ, a sexto fermè morbi die usque ad ejus declinationem perseverans.

16°. Si cum pustulæ undecima die exsiccari incœperint, eadem mutantur sensim in crustas cinereas, vel obscure albescentes.

17°. Si alvi fluxus duodecimo, vel decimo tertio in confluentibus prodit, & hoc tempore in discretis summum obtinuit, maxime ubi pustulæ etiam interna obsident.

18°. Si urinæ, dum omnia prava symptomata absunt, colorem referunt vini canariensis, cum nubecula suspensa, vel levi sedimento albescente, & copioso.

Tabula symptomatum quæ malè ominantur.

Art. 298. Periculum in variolis minantur.

1°. Si in statu febris, capitis & dorsi dolor, una cum corporis calore admodum aucto vehementer urgent.

2°. Et fitis adest inextinguibilis.

3°. Et stomachi anxietates atque vomitus.

4°. Si vehementes dolores in imo ventre excruciant.

*Periculorum
symptomatum
recensio.*

5°. De-

5. Delirium si adest ac vaniloquium.
6. Necnon somnus immodicus.
7. Et insomnia vexantia.
8. Inquietudines, agitationes, revolutionesque frequentes per lectum.
9. Si hæmorrhagiæ ex naribus, per os, & per uterum prodeunt, velexcreatus, urinæque, aut alvi fluxus sanguinei cum pulsu debili, parvoque calore.
10. Si maculæ purpureæ erumpunt.
11. Quando variolarum eruptio primo secundo aut tertio a principio morbi die contingit.
12. Quando pustulæ præcipitanter, & magno numero erumpunt.
13. Quando eadem admodum parvæ sunt, & profundo rubore splendentes.
14. Si post eruptionem febris adhuc absque iminutione perseverat.
15. Si suppuratio repentè cessat, aut, lentius progreditur.
16. Si tempore maturationis dolor, qui corporis superficiem 6, 7, 8, 9, 10, 11, die morbi exercere debet, abest.
17. Si faucium inflammatio, & deglutiendi difficultas accedit.
18. Et saliva viscida fit, ac densa.
19. Quando Ptyalismus suo tempore non incipit, & quando citius quam par est, aut cessat, aut imminuitur.
20. Quando circa octavum diem, vel nonum caput non inflatur, vel nimis citò subfidet.
21. Si manuum, digitorumque inflatio circa undecimum, vel duodecimum diem non evenit, vel nimis citò desinit.
22. Quando lingua exsicccatur, & nigrescit.

23. Respiratio frequentior, difficilior, & interrupta evadit.

24. Alvi fluxus in aliqua trium periodorum accidit.

25. Et dolores in internis, aut vagi, aut fixi superveniunt.

26. Si pustulæ in centro depressæ quasi insculpta fovea prodeunt, vel facile evanescentes, vel lividæ, vel, ut ajunt, *crystallinae*, & *verrucales*.

27°. Si symptomata hysterica, horrores, & rigores superveniunt.

28. Urinæque nigræ apparent, vel sponte prodeuntes, vel nullo ægri sensu emanantes.

29. Quando alvus aut involuntario, aut nullo sensu deponit.

30°. Quando convulsiones, & tremores accedunt.

31°. Vel singultus declinante morbo, vel per os internum ulcuscula.

Art. 299. Hæc recensio symptomatum, quæ *Harum* frequentius accidunt in benignis, periculosisque *tabula-* variolis, inservit cuicumque ægri directio incum- *rum uti-* bit, ut æquius judicium ejus status concipere *litas.* possit, & aptioribus remediis eidem opem ferre valeat.

Art. 300. Qui plurimam in revolvendis scri- *Necessa-* ptoribus de variolis egentibus impendere ope- *ria ob-* ram, compertum habuere in hujus morbis cura- *servatio.* tione eosdem ad invicem oppositis sententis pugnare, quia alii regimen calidum cum alexipharmacis jubent, alii pariter instando regimen frigidum, & refrigerantia remedia consulunt. Utraque vero methodus ad extrema pertingit. Prior equidem quibusdam in circumstantiis convenit, altera in aliis: sed tutior via inter utraque extrema sæpe consistit.

Art. 301.

Art. 301. Perpendenda diligenter est, hac de re sententia *D. Lobb* ut etiam ejus verificatoris præfatio; tum quoque legendæ observationes quas utrique habent circa phlebotomiæ usum in quadruplici hujus morbi stadio; & circa ejus abusum qui (nescio quo fato) huc usque in Gallia plurimum invaluit. Ibidem quoque modum Lector reperiet narcotica, & purgantia utiliter exhibendi. Quare cum horum omnium recensio nos ab hinc longe evocaret, quemque ad laudati *D. Lobb* Opus ablegamus, cujus praxis (maxime quoad Phlebotomiæ, & Narcoticorum usum) naturæ regionum aptanda videtur. *Boudon.*

Inoculatio variolarum.

*Procer-
minum.*

Art. 302. Medicorum est morbos curare non inferre; dices tamen medicum peritum ac probum, humanarum infirmitatum providum, morborum futurorum occasiones præscindere, vel saltem leviores reddere, æque ac præsentis sanare, omni arte decere: Si hoc non concedatur, quomodo venæsectionem imperabimus, emetica, & cathartica adhuc sanis, & vegetis prophylaxeos gratia propinabimus?

*Nova
praxis.*

Art. 303. Inoculatio variolarum est nova praxis a *Constantinopoli* ad nos nuperis annis translata; & mirum est, quanta expectatione recepta quantaque industria exulta statim incredibiliter inclaruerit. In ipsa domo regia, in multorum procerum & optimatum familiis magna ostentatione celebrata fuit; ubi & foelici eventu successu eandem exercentes ediderunt. Nihilominus sub tantis auspiciis & tam magnis exemplis inter gentem popularem minus increbuit; nostrorum hominum genio, & cogitandi modo vix rite

qua-

quadrare videtur. Quoad fas, & an cum bona conscientia fieri posse multum varieque litigatur; de certitudine, & incertitudine variolas genuinas producendi, itemque an alios etiamnum morbos, & humorum contaminationes, una cum variolis, implantari posse vehementer ac strenue disputatur. Mihi quidem neque otium neque facultates suppetunt tantas componere lites.

Art. 304. Interim inoculationis operatio ad hunc modum facillimo negotio peragitur. Imprimis in *Opera-*
promptu comparandum est exiguum pus (guttæ *tio.*
v. vel vj. puta) ab adolescente variolis discretis decumbente, inter maturandum depromptum, quod parva phiala vel pyxide inclusum loco operationi assignato deportandum est, ubi omnibus præparatis inoculando vulnuscula duo infligenda sunt, unum in brachio, alterum in crure lateris oppositi; & pus prædictum penicillis applicandum, & ligaturis firmandum; non opus est, ut incisiones fiant profundiores quam per cutem, neque grano hordei longiores, penicilli ad finem 24. horarum removendi sunt, & ulcera emplastr. Diachl. vel foliis brassicæ operienda, & in futurum semel vel bis in die pro ratione quantitatis puris ibidem scatentis detegenda & medicanda. Hoc facto morbus sensum producet, & symptomata sequentia plerumque exoriri solent.

Art. 305. Circa diem octavum post operationem erumpere solent pustulæ, iis, quæ in discretarum genere ordinario contingere solent, haud *Sympto-*
dissimiles, præeunte febricula, & reliquis usitatis *mata*
symptomatis, sed mitioribus. Quoad loca incisa, *superve-*
4^o die rubescunt, & inflammantur, die 6^{to} ad *nientia.*
suppurationem vergunt, & pus ichorosum emittunt. Sub eruptione quidem pustularum invadente Febre ulcuscula paulo minus fluunt; post vero eruptionem, usque ad declinationem variolarum

pus in dies augetur, ex quo tempore iterum sensim diminuitur; ita ut spatio quinque hebdomadarum ulcera plerumque penitus claudantur. Quanto major est evacuatio puris per ulcera hæc artificialia durante morbo, tanto mitior erit morbus. In genere observatum fuit variolas per inoculationem inductas discretas esse, periculo ut plurimum vacantes, pustulas perpauca, cuti foveas rarò relinquentes. Subsequuntur sæpissime in variis corporis partibus tubercula, & abscessus, nonnulla quidem levioris momenti, interdum verò mali moris, & difficillimæ curationis.

Præparatio & regimen.

Art. 306. Ad corpus inoculationi præparandum multi multa loquuntur de Venæsectione, de usu emeticorum, & cathartorum, &c. Sed profecto, si inoculandus sit ætatis juvenilis, boni habitus, & absolute sanus, nihil horum necessarium videtur. Sufficit temperati regiminis ad tempus ante operationem observatio. Operatione peracta inoculato solitum vivendi morem persequi concessum est, nisi quod fortassis carniū nimis liberalem indulgentiam prohibere prudentis erit. Morbo incepto idem regimen ac in variolis discretis, modo ordinario contractis, observandum est, & si medicatione aliquali opus sit, variolæ inoculatione inductæ eandem postulant medendi methodum.

FEBRIS PESTILENTIALIS & Pestis.

Diemerbroeckii sententia.

Pestis definitio. *Art. 307.* Pestis est morbus peracutissimus, perniciosissimus, & maxime contagiosus, ex maligno & occulto spiritibus caloreque nativo tota

tota substantia infestissimo inquinamento ortus, a quo omnium viscerum, & imprimis cordis, functiones læduntur.

Art. 308. Pestis est diversum quid a Febre, & Febris est tantum ejus symptoma, ut multoties observavimus, ac proinde nonnulli Pestem malè per Febrem definiunt, cum Febris non sit de ipsius essentia, ut infra probabitur. *Diversum quid a Febre.*

Art. 309. Inter signa Pestem præcedentia & præsagientia sequens *Noviomagi* observatum fuit, nimirum, maxima & incredibilis insectorum copia, qualis vix unquam visa fuit, ut culicum, papillionum, scarabæorum, crabronum, cicadarum, omniumque maxime muscarum, quarum utroque anno stupenda ubique copia reperiebatur, ut ædium interiorum parietes undique muscis confiti viderentur, & foris ipse aer multis in locis quasi muscarum nubibus obfuscaretur. *Signum Pestem præsagens.*

Art. 310. De causis Pestis maxime ardua inter medicos quæstio movetur. In eo conveniunt omnes, illam excitari a cæca quadam pernicie, & inexplicabili aeris labe; sed unde labe illa emerferit, quomodo aer tantum vitium contraxerit, quid hoc elementum inquinaverit, de eo dubitant, & in eo inveniando laborant omnes. Prima & primaria causa est *justissima Summi Dei ira propter hominum peccata*; ab hac causa promanat illud τὸ θεῖον, quod pesti inesse animadvertitur, cujus etiam Hippocrates sæpe mentionem facit: & hoc omni ævo creditum fuit tam apud Gentiles, quàm apud Judæos, & Christianos; idem quoque sacræ literæ passim plus satis confirmant. Nos arbitramur Hippocratem per τὸ θεῖον intellexisse causam quandam morificam, præter naturæ ordinem ac potentiam, a diis e sublimi immissam, vel in & ex aere de novo ab ipsis suscitata, cujus essentia nec

in certa elementorum mixtione, nec in manifestarum qualitatum intemperie, nec in magna aliqua putredine, consistit, sed in novo quodam veneno, præternaturaliter a diis in hoc sublunari mundo suscitato.

Quomodo incipere solet.

Art. 311. Cum aer a venenoso inquinamento incipit alterari, pollui, ac ad venenositatem disponi, incipit simul etiam rebus sublunaribus valdè infensus & noxius esse, interdum armentorum magnas strages edere, interdum segetes & terræ fructus corrumpere, inter genus humanum Febres malignas & Pestilenciales generare, & mox ipsam Pestem.

Contagii communicatio.

Art. 312. Contagium est communicatio inquinamenti ab uno corpore in aliud, sive illa actio communicationis fiat per immediatum contactum, sive per medium; requiritur autem apta dispositio ad hujusmodi seminarium recipiendum, aliàs non communicabitur. Pestilens venenum cum vestibus, aliisve rebus ad alias civitates & regiones deferri videmus. *Inexplicabilis quidem est hominum dispositio, quoad contagium recipiendum, vel non;* in aliis talis est, ut a Pestilenti veneno statim afficiantur, in aliis talis, ut difficulter ab eo lædantur, in aliis talis, ut eidem sine ulla noxa resistere possint.

Febris pestilens unde.

Art. 313. Febris Pestilens, Pestis comes, non oritur a veneno Pestilenti, sed mediante putredine, id est, non generatur propterea, quod humores a veneno Pestilenti inquinantur, sed quod cor Pestilenti veneno irretitum, obrutum, plurimumque debilitatum, inquinatos humores debito modo neque coquere, ac dilatare, neque regere, & satis dispellere possit; qui hac de causa putrescunt; caloremque præter naturam concipiunt, sicque Febrem excitant; quæ ob dictam causam ordine posteriorem necessario est diversa ac

sa ac separabilis a Peste, ejusque symptoma. Hoc ipsum confirmant dogmata & auctoritas tam veterum quàm neotericorum, nec minùs quotidiana praxis, & obvia exempla.

Art. 314. Multa symptomata horrenda & gravia Pestem comitantur, quorum nonnulla sunt *Pestis sympto-
mata.* ei magis propria, ut bubo, anthrax, & exanthemata; alia autem aliis morbis communia, quorum primaria hæc sunt, capitis dolor, phrenitis, sopor, vigiliæ, anxietas, debilitas seu magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio, linguæ siccitas, vomitus, singultus, lumbrici, fluxus alvi, hæmorrhagia nasium, menstruorum profluvium, sanguinis mictus, sputum cruentum, dolores lateris, hepatitis, renum, aliarumve partium.

Art. 315. Bubones & carbunculi fiunt, a veneno Pestilenti, quod cor ex sese per arterias ad alias partes expellit. Bubo est tumor dolorosus earum glandularum, quæ sitæ sunt retro aures, & in collo, sub axillis, & in inguinibus. *Bubo.* Carbunculus a pustula plerumque ortum ducit, & est partis alicujus gangræna, dum est in fieri, & sphacelus, dum est in facto; nulla vi naturæ aut artis edomari, & in pus converti potest, sed integer a vicinis partibus separatur. Carbunculi non habent certa determinata loca, in quibus exoriantur, sicut bubones, sed in quacunque corporis parte excitari possunt: modò enim conspiciuntur in thorace, vel collo; modò in abdomine, vel dorso; modò in brachiis, vel cruribus; modò in manuum pedumve digitis; modò unus aut alter, modò plures simul, vel in una vel in diversis partibus: imo sæpe etiam in partibus internis oboriuntur, ut in pulmonibus, ventriculo, renibus, &c. *Carbunculus.*

Art. 316. Exanthemata Pestilentialia sunt maculae *Exanthemata.*

culæ purpureæ vel rubræ, vel nigræ, vel violaceæ, ut plurimum rotundæ, aliquando latæ, oblongæ aliufve formæ, in summa cute efflorescentes.

Signa prognost. Art. 317. Acutorum morborum (inquit *Hippocrates*) incertæ admodum ac fallaces sunt prædictiones. In Peste *Noviomagensi* observavimus sextæ diei crises semper certò lethales fuisse. Quicumque circa novilunium aut plenilunium Peste corripiebantur, ii maxime de vita periclitabatur. Prostratio virium in morbi principio, animi deliquia, & cordis palpitationes plerumque lethalia signa erant; pulsus intermittens semper lethalis; sopores, sternutationes, motus tremuli, delirium, dolor in gutture, & raucedo, anhelitus foetens, malè ominantur; Pleuritides semper lethales; suppressio alvi bonum signum, spem salutis exhibens; alvi fluxus contrarium, cum hoc vix centesimus æger evadebat; sanguinis per sedes vel urinas signum lethale, ut & menstruorum fluxus. Quo citius bubones prodibant, tanto meliores, si sine Febre, vel ante Febrem, prodirent, salutis magnam spem dabant, & contra; si in emundatoriis loco bubonum emergerent carbunculi, gravissimum periculum indicabatur. Si carbunculi tardiùs prodirent, malum, & si valde multi, pessimum; in locis carnosiss, meliores, in nervosis, periculosiores; maculæ purpureæ, nigræ, virescentes, violaceæ, quocunque tempore apparentes, semper lethales; cum rubris nonnulli evadebant, etsi paucissimi,

Prophylactica. Art. 318. Præstantissimum & certissimum prophylacticum a Peste est fuga cum timore Domini copulata; recessus circumstantiæ in sequenti versiculo continentur;

Hec tria tabificam tollunt adverbia Pestem.

Mox, longè, tardè, cede, recede, redi.

Nullum melius Pestilentis aeris correctorium *Diatæ* in rerum natura datur quam ignis, ut multiplex experientia comprobavit. Hippocrates famosam illam Pestem, quæ ex Æthiopia Græcos invaserat, olim per ignes edomuit, & extinxit; jussit enim per totam civitatem accendi ignes luculentos nocturnis præcipue temporibus, ut aeris inquinamenta purgarentur. Ignis ligno juniperino vel fraxineo nutritus ad venenatas aeris corruptiones emendandas multum valere creditur. Accensio *sulphuris & pulveris pyrii* aerem purificat, & ejus corruptionem abigit; idem facit crematio *succini, thuris, picis navalis*, &c. Item suffumigium *aceti* cum ferro candente vel ignitis lateribus excitatum. Quoad diætam consultum est Pestilenti constitutione temperantiam colere, quæ magnopere ad sanitatis conservationem prodest; omnia vero repentina mutatio periculosa est, quapropter a consueta victus ratione subito discedere maxime periculosum esset. Malum est vigente Peste jejuno stomacho in publicum exire. Carnes porcinae maxime damnosæ censentur. Omnia dulcia vitanda sunt, Vinum temperate usurpatum prodest; sed ejusdem abusus est valde periculosus: Mercurialis testatur Patavii & Venetiis se vidisse bibaces plurimos extinctos esse, qui existimabant vinis generosis se propulsaturos esse Pestem. Vestes lanæ & crassiores inquinamentum contrahunt, & conservant; præferendæ sunt itaque vestes ex serico tenuiore vel fatino, aliove simili. *Phlebotomiam*, quamvis a multis veteribus, & neotericis medicis summe laudatam, nos tanquam valde periculosam, & damnosissimam, plane rejecimus; experientia enim constabat Pestis invasionem brevi post

*venæ
sectio.*

Fonticuli. venæsectionem iis, qui præservationis gratia adhibuerunt, insecutam esse, quapropter omnibus prohibuimus. Cauteria seu potius fonticulos plurimi insignes medici summopere commendant, & eorundem insignem utilitatem nos quoque multoties vidimus. Prophylaxeos gratia in corporibus sanis & firmis sat erat, ut alvus servaretur libera, non fluida; in cacochymicis vero paulatim ac clementer alvum subducere necessarium duximus, & præ reliquis, cum Pil. Ruffi, utpote quæ tot sæculorum experientiis ad Pestilentem malignitatem comprobata sunt. „Ufu sulphuris communis *Hippocrates* Pestem illam famosam Græcia abegit: suffitus ejus pro aeris emendatione, & pro potus medicatione perquam laudatur, uti quasvis corruptiones & alterationes, ita sanguinis putredinalem alterationem præcavet. In graviore malignitate indusum, & vestimenta imprægnari possunt fumo sulphuris.“ *Ettmuller.*

Antidoti. Art. 319. Quoad antidotos; inter simplices imprimis duas commendavimus; prima erat *tabacum*, nempe illius fumus per tubulum seu fistulam ore attractus, & post paucam retentionem inde rursus dimissus, quemadmodum ordinarie a fumi suctoribus sumi solet, illius usum in hac peste tam in meipso, quam in plurimis aliis, insigniter profuisse observavimus. Altera erat *radix Heleniæ*, vel sicca masticata, vel in pulvere sumpta, vel saccharo condita; de antidotis aliis compositis consulatur auctor Cap. x. Pauperibus consulimus, ut quotidie mane duo vel tria cochlearia *aceri vini optimi* biberent, atque illud in hac Peste animadvertimus fuisse unum ex optimis præservativis; quamplurimis etiam sporgiam *aceto theriacali* ebriam naribus frequenter admovendam dedimus.

Art. 320. Quod ad meipsum attinet, mirabantur quidem multi, quod ego, qui quaslibet ædes infectas indiscriminatum invisebam a tanta contagii violentia non læderer; imprimis, nec terrori, nec iræ, nec mœrori, locum concedebam; si forte meipsum aliquo modo contristatum perciperem, tum tribus quatuorve vini haustibus assumptis cor exhilarabam, atque ita tristitiam fugabam. In victu utebar cibus euehymis; potus mihi erat cerevisia communis, ut & vinum album tenue vel mediocre, quo interdum usque ad hilaritatem, nunquam ad ebrietatem, utebar. Mane inter horam quartam & quintam ægros invisurus nihil omnino cibi aut potus aut medicamenti assumere potui, sed *oblatis Deo precibus* solummodo aliquot grana Cardamomi minoris masticando jejunos primos ægros invisebam usque ad horam sextam: Tum vel *theriacæ* vel *diaseordii* pauxillum, vel *corticem aurant. conditum*, vel ut plurimum *radicum helenii* conditarum tria quatuorve frustula comedebam; circa horam septimam vel octavam frustum panis cum butyro, & caseo ovillo viridi jentaculabam, superbibendo haustum cerevisiæ; quandoque haustum *vini absynthiti* bibebam; circa decimam, si per otium liceret, fistulam unam *tabaci* exsugebam, & post prandium duas tresve, nec pauciores post coenam; sæpe etiam intermediis horis post meridiem duas tresve fistulas sumebam: Si autem ab ægrotorum foetore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis, qualicunque diei hora foret ad *tabaci* usum fugiebam: nam, ut verum fatear, *tabacum* pro primario præservativo semper habui, & revera tale esse, non sola ratione doctus sed experientia edoctus comperi, neque aliud melius pro ordinario usu hætenus inventum fuisse existimo;

fed

*Authoris
vivendi
modus.*

sed observatu dignum est, quod non nisi insuetis auxiliabitur fumisuctio; quapropter ego solo tabaco contentus nullis aliis suffumigiis utebar, & postea ejus usum rursus dereliqui.

Curatio.

Art. 321. Circa Pestis curationem semper plurimum hallucinati fuerunt omnes medici, dubii causarum, dubii remediorum. Causa enim morbi adhuc latet, neque ullum hactenus remedium proprium inventum est par tanto malo. In Peste actu laborantibus a *venesectione* religiose abstinendum est; *purgantia* quoque & *vomitoria* maxime fugienda sunt; alvi constipatio non est metuenda, etiamsi in longum protrahatur, utpote quam nullis nocuisse animadvertimus. In ipso morbi principio statim ad *antidota* & *sudorifera* confugiendum est: hæc autem remedia *alexipharmaca* dicta multa sunt ac varia, quæ variis modis miscentur, & componuntur pro morbi ipsius genio & reliquis circumstantiis, quarum decisio ex medici judicio dependet, neque certis regulis determinari potest. Simplicia primaria sunt quæ sequuntur: *radix petasitidis, aristolochia, helenii, bistort. zedoar. gentian. angel. ering. scorzoner. serpent. virg. fol. scordii, rutæ, card. ben. absynt. rorismarin. flores croc. calendul. sambuci, fructus berber. pomacydonia, citrea, aurant. limon. eorumque cortices, acetum simplex, sambucinum & calendulatum; aromata, myrrha, camphora, succinum, vipera, &c.* Compositiones sunt fere infinitæ, quamplurimarum. formulæ apud authorem videri possunt. Author suspectum habet *crocum*, quoniam cerebrum petere solet; *camphora* a quamplurimus valde laudatur, item *flores sulphuris*, & *sal absynthii*; commendatur etiam *oleum vitrioli* & *oleum sulphur. per campan.*

Methodus
medendi.

Art. 322. Curationem sequenti methodo instituimus; imprimis cubicula nitida servari, & ter

ter quaterve de die aerem suffumigiis alterari
jussimus, & statim ægris (morbi primo, secun-
do, vel tertio die) *potiunculam sudoriferam* ex-
hibuimus, iisque bene stragulis contextis, sudo-
res copiosos per duas tres pluresve horas (habi-
ta semper virium ratione) promovimus; qui, si
difficilius prodirent, arenam calefactam siccam
lineis faccis infusam pedibus, axillis & inguini-
bus apposimus. Si a primo sudore non levaren-
tur ægri, post paucas horas sudoriferum de no-
vo repetendum est; si post secundum sudorem
Febris cum aliis symptomatibus adhuc incresce-
ret, nec quidquam levarentur ægri, pessimum
erat indicium: post decem vel duodecim horas
& sequentibus diebus adhuc quater vel quinquies
(prout necessitas exigere videbatur) *sudorifera*
reiteravimus. Intermediis autem horis varia *an-
tidota* ad veneni violentiam extinguendam, ut
& *condita corroborantia*, ac *putredini resistentia*,
vel *apozemata convenientia*, aliaque quæ mali-
gnitatem a centro ad peripheriam pellebant, nec
non cibos quosdam liquidos facilis digestionis,
& antidotali condimentorum qualitate alteratos,
exhibuimus. Symptomatum quoque morbo con-
junctorum diligentem rationem habuimus, de
quibus proximo loco dicemus.

Art. 323. Inter symptomata, quæ Pestem co-
mitantur communissimum est Febris maligna pe-
stilens, quæ ut plurimum gravis, & periculosa
existit. Hanc nos, durante hac constitutione,
eodem fere modo, sicut ipsam Pestem, tractavi-
mus, & *sudorifera* atque *antidota* ad illius cura-
tionem maxime profuisse observavimus, dum-
modo abstineremus a calidioribus, vel, si iisdem
uti placeret, *alia frigida*, ut *acetum*, *succum ci-
tri*, &c. admisceremus. Vigiliis in Peste non
magnopere metuendas esse docuit experientia;
sed

*Curatio
sympto-
matum
Febris.*

Vigilia.

sed sopor in principio maxime damnosus, & *Sopor.* mali ominis erat; si ad somnum nimis proclives essent (quod admodum familiare erat) illos primo die a somno studiosissime prohibuimus; usque dum alexipharmaco assumpto prius bene sudassent.

Anxietas, virium debilitas, vomitus. Ad anxietatem, virium debilitatem, & vomitum, miraculose profuerunt remedia pauca sequentia: primum erat hæc mixtura; *℞. Con-*

serv. rosar. rub. ℥i ss. diascord. ℥iij. vel iv. aq. nostr. theriacal. inf. descrip. ℥iv. succ. limon. recent. ac cinnam. ana ℥i ss. m. stent per horam unam aut alteram; deinde per linteum colentur, colaturæ add.

confect. de hyacinth. sine mosco ℥j. m. Secundum erat hoc linimentum: *℞. Ol. unc. moscat. express. ol.*

scorpion. vel laurin. theriac. androm. ana ℥j. ol. junip. ℥ss. succia. ℥j. caryoph. vel cinnam. gut. iij. m. f.

linimentum pro scorbic. cordis, & ventriculi regione inungendis, bis terve de die superponendo hanc pastam ad ignem calefactam; *℞. Rad.*

calam. arom. nuc. moscat. ana ℥j. caryoph. benzoin. ana ℥ss. fol. menth. ℥ij. pulverizatis add. mic. pa-

Siccitas Lingua. *nis secabin. ℥iij. vel iv. acet. rosac. q. s. f. pasta.* Ad linguæ ariditatem post varias alias collutiones tentatas solam aquam simplicem plus profuisse animadvertimus.

Hæmorrhagia. Nihil perniciosius quam hæmorrhagia narium, & menstruorum, & sputa cruenta; quæ citissime omni arte sistendæ sunt, secus actum erit de ægris.

Illud sæpissime observavimus, si alvi fluxus in principio non sisteretur, postea, plane incurabilem in omnibus fuisse.

Eubonum curatio. *Art. 324.* Bubonum curationem per suppurationem omnino tentavimus; quamprimum igitur ægri, sive in ipso morbi principio, sive in progressu duritiem aliquam cum dolore sentirent pone aures, in collo, sub axillis, vel in inguinibus, huic plerumque ad citiorem tumoris provocationem, & maligni ichoris extractionem,

vesicatorium in inferiore ejusdem parte applicavimus, ita ut *vesicatorium* ipsam duritiem attingeret, ut hoc modo ulcere facto locus apertus teneatur, & damnosi ichores melius effluant (*cucurbitulas* minus approbamus), secunda die ut noxia materia ad bubones attrahi, ibique digeri, ac suppurari posset, toti tumori *cataplasmata attrahentia & emollientia*, ac *suppurantia* imposuimus, quibus præter alia etiam *cape*, *stercus columbinum*, *fermentum panis acidum* & similia admista erant; nonnullis etiam *solas capas sub cineribus aliquantum assatas*, & deinde contusas, pauco *theriace* & *butyri insulsi* admixto cataplasmatismatis forma biduo vel triduo imposuimus; cum autem tumorem jam satis magnum esse, atque ad maturationem tendere videremus, tunc attrahentia amplius non addidimus, sed *solis maturantibus* usi sumus, ut tumores citius ad suppurationem perducere possent. Sæpe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuimus, quod omnibus intentionibus satisfaciebat, eoque solo tumores ad integram sanationem non raro perveniebant; *℞. Gum. galban. acet. dissolut. empl. oxy. croc. diachyl. cum gummi ana ℥j. misceantur*. Notandum tamen nos quibuslibet tumoribus non imposuisse fortiora attrahentia, sed tantummodo iis, qui sub axillis, & in inguinibus oriebantur: tumoribus autem, qui prope aures vel in collo prodibant, talia non conveniebant; nam taliam usu eodem, cum maximo suffocationis periculo, imo cum multorum exitio, sæpe paucis horis enormiter increvisse observavimus; quapropter *sola emollientia, vel leviter tantum attrahentia* his impenebantur; aliquando necesse fuit, cum tardius procedebant, tumores scalpello incidere, sed hoc antequam fere ad perfectam maturationem per-

pervenissent, non est faciendum; sequenti digestivo usi sumus, ℞. *Scord. subtilissime pulv.* ℥ij. *vitel. unius ovi*, *terebinth. Venet. mel. unguent. Apostolorum ana* ℥ss. m. Caveri debet ne ulcera nimis cito occluderentur. Videatur in annotationibus methodus experientissimi Pauli Barbette de curandis bubonibus per *emplastrum magneticum arsenicale*.

Carbunculorum Art. 325. In carbunculis tractandis sæpe prima & secunda die imposuimus *folia brassicæ rubræ o-*
Curatio. *leo raparum inuncta*, quod apud vulgares in frequentissimo usu erat. Postea statim, imo ut plurimum ab ipso principio, frequentem pulticulam applicuimus, qua nihil invenimus, cum quo carbunculorum separatio, & curatio citius ac melius perageretur; ℞. *rad. consolid. maj. sicc. herb. scord. ana* ℥ij. *rad. alth. farin. sem. lini, tritic. ana* ℥ss. *coq. in q. s. aq. font. ad pulticulam*, deinde add. *mel. terebinth. unguent. apostolor. ana* ℥iij. *pic. liquid. ung. Basil. ana* ℥ij. *vitel. unius ovi* *croc.* ℥j. m. interdum etiam addebantur *theriac.* ℥ij. Apud vulgus in usu erat *pix navalis cum equali parte picis liquidæ*, cum qua sola sæpius vidimus anthraces citissime separatos, & dolores optime sedatos. Quo mitius tractarentur, eo melius & citius curatos fuisse mil-
Exanthemata. lies observavimus. Exanthemata mortis instantis præagia erant, neque curationi tempus dabant, quam si admisissent, per *sudorifera & alexipharmaca* curari debuissent.

Sydenhami sententia.

Proœ- Art. 326. *Acuti morbi ut plurimum Deum ha-*
mi. *bent authorem, sicut chronici nos ipsos.* Pestis vix Britanniam frequentius quam post annorum circiter quadraginta revolutionem devastat; „ jam
 „ vero

„ vero ex peculiari Dei clementia plusquam quinquaginta annos immunes viximus.

Art. 327. Pestis primo insultu rigorem ac horrorem, quemadmodum & Februm intermittentium accessiones, fere perpetuum habet comitem; mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, (ac si torculari premerentur) Febris ardens ægros indefinenter divexant, donec aut mors aut benigna bubonis vel parotidis eruptio, quæ materiam morbificam foras ablegat, eos a luctuosissimo discrimine liberet. Rarius quidem accidit, ut citra ullam Febris præsentationem ingruat, ac homines de improvviso e medio tollat, maculis purpureis præsentanei interitus nuntiis, etiam dum in foro versantur erumpentibus, quod tamen nisi in Pestis admodum funestæ exordio vix contingit; fit etiam nonnunquam, ut tumores prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo symptomate prægresso.

Art. 328. Aeris dispositio quantumvis λοιμός Aeris Pestis excitandæ per se impar videtur; nec Pestis epidemica erit, nisi accedente idonea aeris diathesi.

Art. 329. Vel per sanguinis missionem vel per sudores Pestis expugnanda videtur; posterior methodus sæpe funesta fuit: *venesectio* vero larga manu & repetitis vicibus celebrata, nullo tumore protuberante; nemini adhuc, (quod scimus) unquam funesta; tumore vero conspicuo instituta, semper damnosa, ratio in propatulo est, nempe quoniam motui naturæ adversatur. Plures & gravissimi scriptores *venesectionem* probant, præcipue Botallus, sed tam largam *venesectionem* paucissimi admittunt. Alia est itaque methodus therapeutica, nempe, mittatur sanguis in lecto, & statim æger stragulis quamplurimis obruendus est, & caput obtegendum ad sudores

ciendos ex tegumentorum pondere, & cum sudor promanare incipiet alvi profluvium, & vomitiones ultro sedabuntur, & tunc sumat æget bolum sequentem cum Julap. cardiac. sexta quaque hora, sudorique indulgeat; *℞. theriac. androm. 3ss. elect. de ovo ʒj. pulv. gascon. gr. xij. cochinel. gr. viij. croc. gr. iv. syrup. kerm. q. s. m. f.* bolus: omnique arte continuandus est sudor ad viginti quatuor horas, nec prius indusium mutandum est utcunque madidum; quod si sudatio citius abrumpatur, illico symptomatum sævitia recrudesceat, & omnia in pejus ruunt. In sequenti luce commune *catharticum* exhibere soleo; atque hac medendi ratione, anno a peste proximo quamplurimis Febre pestilentiali correptis sanitatem restitui, adeo ut nec unus quidem ex eo morbo mihi desideratus sit, postquam eandem exercere inceperam. Vinum liberalius ingurgitatum, aliaque fortiora præservativa statim horis dierum assumpta, complures, quia alias salvi intactique verisimiliter permansissent, in hunc affectum conjecerunt. ,, Temperantem sobriumque Socratem ,, gravissima Pests Atheniensium non attigit; ,, neque ullo fere ævo *eidem similes* attinget.

Villisi sententia.

Pestis causa prima *Art. 330.* Pro castigandis hominum sceleribus Pestem primitus a Deo immissam ipsi agnoverunt ethnici; ideoque pro extirpatione ejus, precibus & piamentis, æque ac medicamentis insistebatur.

Prophylaxis. *Art. 331.* Ad prophylaxin recordandum est Hippocratis præceptum; *labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia sint mediocriter.* Plures novi, qui (*Helmontii* verbis) vino & confidentia
for-

fortificando Archeum, nec aliis antidotis usi inter infectos sine contagii noxa versabantur.

Art. 322. D. Hen. Sayer in praxi medicus foelix; plerisque aliis hanc spartam renuentibus, peste laborantes audaciter invisebat. *Londini* anno 1640. ut seipsum a contagio muniret, antequam domos infectas adiret, solummodo vini generosi haustum pleniorē ingerere, deinde perambulatione sua peracta, idem antidoton repetere solebat, tandem ad castrum *Vvallingfordie* occubuit cum duce quodam in eodem lecto discumbens. Illius medendi methodus sic se habuit; si, priusquam exanthemata aut bubones exterius apparerent, vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit ex infusione croci metallorum cum vitriolo interdum Romano; vomitione finita, diaphoreticis statim exhibitis in sudorem coniciebat ægros; & deinceps intervallis quibusdam pro refectione virium concessis, usque ad morbi declinationem diaphoresin continuabat: sin post stigmata apparentia accerferetur, vomitione posthabita tantum subdorificis insistebat.

Methodus D. Sayer.

Joannes Langii Sententia.

Art. 333. Ex Epist. 19. lib. 1. Jam tu probe nostis, me multos, de quibus etiam conclamatum erat in hac pestifera lue hac methodo curasse. Primum si alvus, aliquot dies ante morbi initium, parum, vel nihil excreverat, tum glande imposita, aut levi enemate eam exoneravi. Postea alexipharmacum sudoriferum exhibui, quod pro ratione ætatis ac virium, sudorem duas vel tres, aut plures horas promoveret. Cordi epithema applicui. A sudore hora sexta, vel septima (refectis tamen aliquo juscule

viribus) venam opportunam secui, ac mox ab alexipharmaco aliis singulis diebus mane, & vespere propinato alterantia, quæ una qualitate, & substantia veneno resisterent, exhibui, & cor quoque confortarent, qualia sunt quæ ex succo citri, limonum, aurantiorum, acetosæ & jugulæ cum momento aceti, & saccharo decocta conficiuntur. In morbi declinatione si appetitus edendi languebat ad reliquias morbi extirpandas, medicamentum ex rhabarbaro, agarico, cassia, aut rore Syriaco, sive manna, & tamarindis Indorum exhibui. Postremo Chirurgis, ne ulceris aut carbunculi consolidationem præcipitarent; coquis vero ut præscripto tempore commoda esculenta, & potulenta ægro suppeditarent, edixi. Qua curationis ratione ingens ægrorum numerus, Deo optimo auspice, convaluit. — Bubonibus vero, & carbunculis si circa emunctoria, juxta aures parotis, sub axillis abscessus, in inguinum adenibus bubo, virtute expulsante eruperit, aut interim carbunculus in brachiis aut carnibus effloruerit, tum festinanter veluti in vulneribus virulentis medicamenta quæ venenum extrahunt ad locum applicato, vel cucurbitulas aut emplastrum ex fermento, theriaca, farina, sinapi, & cepa sub cineribus cocta conficito, additis opopanax, & galbani gummis, acerrimo aceto solutis, imposto, & abscessum ante maturationem scarifica, aut aperi, vel cauterio adurito. Si vero patiens ignem veretur, cauterium potentiale ex cantharidibus, & fermento confectum, aut contusam ex oleo flammulæ radicem applicato, quæ sua virtute calorifica, & ardente non modo noxios humores attrahunt, sed & non raro fascias ex his collectiones apperiant.

Friderici Hoffmanni Sententia.

Art. 334. Neque tamen in peste unius ejusdemque indolis semper sunt symptomata, sed multum utique secundum temperamenta, & constitutiones corporum variant. Quam diversitatem probe cognoscere, & scrutari oportet Medicum. Id vero omnes qui de pestilentiali morbo scripserunt unanimi suffragio confirmant, corpora, quæ spongiosioris, rari, & porosioris, nec non obesi sunt habitus, temperamento sanguineos, & phlegmatico-sanguineos, sexu feminas, ætate juniores ac infantes, animo timidos, & abjectos, vitæ genere pauperes, insalubrem diætam colentes, crapulis deditos, & comestationibus in seram noctem indulgentes, longe celerius corripì, & gravius decumbere hoc morbo, quam qui animo fortes ac intrepidi, corpore macilenti, nervosi, & amplioribus vasibus dotati, viri, senes, fluxu hæmorrhoidali obnoxii, item qui fonticulos, & ulcera gestant aperta. Neque minus per observationes compertum, nihil ad suscipiendum, & deleteriam miasmatis virtutem intendendam aptius esse metu, timore mortis, animique consternatione, adeo ut etiam quosdam solo terrore peste affectos, & extinctos esse constet. Nam hi animi affectus sunt inter omnes præcipui, qui vitalem cordis & arteriarum motum cum sanguinis circulo minuunt, destruunt, & vires tam vitales, quam naturales, & animales dejiciunt, quum tamen motuum beneficio venenum conceptum sit exterminandum.

Art. 335. Cujus autem porro indolis ac specificæ naturæ sit venenum, quod pestem excitat, a priori accurate determinate admodum difficile

*Subjuncta
febri pe-
stilentia
obnoxia.*

*Miasma-
tis na-
tura.*

facile, quia sensibus minus obvium. Quantum tamen ratione assequi, & a posteriori judicare licet, duplicis esse videtur, partim sulphuræ putridæ multiplicativæ, instar fermenti, partim subtilis valde acris, & causticæ plus tamen alcalinæ, quam acidæ naturæ. Putrida enim valde, & peregrina sulphurea indoles ex eo patet, quod omnes maligni ejusmodi morbi præcipue suam originem ab exhalationibus putridis, quæ ex cadaveribus inhumatis, aquis stagnantibus, putrescentibus, & aliis foetidis excrementitiis sordibus trahant, & quod ipsum hoc miasma illico contaminet nervorum fluidum, motum solidorum systalticum sistat, & corruptionem sphacelosam succis inducat. Causticam autem subtilem acrimoniam inesse miasmati ex eo concludendum, tum quod contagiosorum morborum ingressum ut plurimum antecedit copia insectorum sale caustico prædictorum, & ex putredine genitorum, tum etiam quod nerveas fibrillas vellicando, & rodendo dolorem, ardorem, tumorem, & inflammationem causetur conspicuam satis in bubonibus atque anthracibus.

*Soluntur
ur. cri-
tica. per
sumores.*

Art. 336. Pestilentielle hoc intus susceptum venenum, illico, ut supra diximus, omnes omnino in corpore functiones turbat atque pervertit, ac nisi cito ab internis ad externas partes propellatur, certissime necem infert. Neque tamen hoc ut in aliis malignis fit per largos sudores, neque per alvi, aut urinæ fluxum, neque per hæmorrhoidum aut mensium profluvium, neque etiam per narium stillicidium spontaneum æque ac arte procuratum, ut potius tales præsertim effusiores excretiones minentur exitium. Sed salutaris, & critica, qua perfecte solvitur pestilentialis morbus, excretio, absolvitur

vitur per tumores in externo corporis ambitu prodeuntes; ita quidem, ut non secus ac in erysipelate, intra tertium, & quartum diem eadem contingat, & quo citius ac melius eo magis morbi indemitescat atrocia. Formale enim venenum his humoribus contineri, atque excerni, vel ex eo patescit, quod si Chirurgus lancetta qua eosdem aperivit venam sani hominis incidat, is illico etiam corripiatur peste.

Art. 337. Quibus autem lethalis est pestilentialis morbus, ex his nonnulli primo statim vel secundo die syncope pereunt, procul dubio ex Panico quo percussi sunt timore. Sed plurimi quando venenum vel non expellitur, vel expulsum subito relabitur, & nervosis tunicis nobiliorum partium pleuræ, œsophagi, ventriculi, & intestinorum, nec non meningibus inhærens, inducit sphacelum, qui ocyus ad omnia viscera ipsumque sanguinem serpit, quo fit ut cadavera illico mire foeteant, intumescant, & citissime putrescant. Quandoque etiam quando nimia tumorum pestilentialium copia prodit, ob inflammationem, dolorem, & ardorem intolerabilem, ex febre symptomata, non secus ac in variolis fieri solet, occumbunt.

Artic. 338. Quoad remedium, usum nihil perniciosius esse, ait, quam radices sic dictas alexipharmacas; oleo volatili calido turgidas, carlinæ, angelicæ, petasitidis, zedoariæ, serpentariæ Virginianæ, Imperatoriæ, vincetoxici, pimpinellæ, nasturtii, & ex his præparatas essentias, elixiria, theriacam quoque & Mithridatum, ceu genuinam antidotum, liberaliter offerre. Multo vero magis detestandi adhuc illi tantopere laudati spiritus volatiles, urinosi, & oleosi, ut cornu cervi, viperarum, fuliginis, item salia volatilia, nec non balsamum sulphu-

*sphacelum
necat.*

*Alexi-
pharma-
ca sola
nocent.*

ris. Tantum enim abest, ut iisdem noxiis expellatur, ut potius intus detineatur, & partibus nervosis altius infigetur. Perpetua quippe hæc lex est, secretionis quæ antecedunt excretionem recrementorum in corpore, melius sub liberiori, & moderatiori ad emunctoria appulsu succedere, quam ubi humores impetuose acceleriter commoventur.

Sed acidis nupta profunt.

Art. 339. Neque tamen penitus radicum, & herbarum sic dictarum alexipharmacarum usus damnandus. Tunc enim non nocent, quando miscentur cum iis, quæ vim earum commoventem nimis, & calefacientem cicurant, & quasi ad temperamentum reducunt, uti sunt maxime acida cum nitro.

Optima acidet a bezoardica fixa.

Art. 340. Inter ea vero, quæ præsentissimæ in pestilentiali morbo efficaciam communi omnium suffragio, sunt maxime acida & terrea. Fracastorius lib. III. pag. 246. de morbo contag. tam ad præservationem, quam ad curationem commendat hoc ℥. succ. acetosell. unc. ij. citri unc. j. diascord. Fracast. 3j. Specier. cordial. ℥ij. Aceti unc. j. Mindererus de pest. cap. XV. disertis scribit verbis: *nulla est putredo, nulla infectio, nulla humorum depravatio, quæ per acida non superetur. Sane ut liberrime loquar, si mihi vitriolicorum remediorum usus vel interdicaretur, ego ad curationem pestis numquam, vel certe inermis accederem.* --- Ex terreis vero, & bezoardicis fixioribus singulari virtute pollent antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, lapides cancrorum, cornu cervi usum, & philosophice præparatum, succinum, terra sigillata, bolus Armena, & cinnabaris. Ex quibus variæ concinnari, eademque vel sola, vel acidis nupta in usum vocari possunt.

Item emetica.

Art. 341. Deinde inter remedia plurimum in

in pestilentia conducibilia præcipuum fere locum tenentur analeptica. Vires enim in atroci hoc morbo, tam propter gravem animi metum, & consternationem, quam ob ingentem malignitatem summopere sunt prostratæ; hinc Medico maxime enitendum, ut removeat ex rebus moralibus, & non naturalibus omnia, quæ easdem offendere possunt, & in medicatione fugiat anodyna, & valde vaporosa, graveolentia. Ad reficiendas autem vires præstabit aqua confortans nostra methodo sic paranda.

℞. Meliss. Turcic. man. iv. rosar. cum sale contus. flor. lil. convall. ana man. i. corticum citri recent. unc. js. cinnamomi acuti unc. j. macis unc. semis, affund. Vin. Rhenan. mensur. j. Aq. commun. mens. iij. & leni igne abstrahere mens. ij. f.

Art. 342. Nec minus proficua sunt emetica. Nam prima & præcipua in medicatione indicatio est, ut venenum susceptum celeriter e corpore pellatur. Jam vero miasma contagiosum primo omnium salivali sese immiscet latici, cum hoc ad ventriculum descendit, & inde ad sanguinem transfertur, Hinc optimum utique consilium, ut venenum brevissima, qua subiit via, iterum exturbetur, simulatque cruditates primæ regionis, quæ deleteriam ejus virtutem mirifice intendunt, per stomachi os everrantur. Sed opus est ut cito id fiat, simul ac quis se infectum, & languorem cum cardialgia sentit. Sic subjuncto congruo sudorifero prima quasi in herba jugulari posse morbum, multiplici constat experientia.

Ant. 434. De venesectionis utilitate non æque inter omnes convenit, sed sunt qui laudant, sunt qui damnant. Optime præcipit Celsus lib. III. cap. 4. desiderat, inquit, propriam animadversionem in febribus pestilentialibus casus. In hac

De venesectione quid.

minime utile est, fame aut medicamentis uti, aut alvum ducere. Si vero vires sinunt, sanguinem mittere optimum, precipue si cum dolore febris est. Neque minus fidem facit. Riverius in opp. tit. Pestis. — Nos quid de ea censeamus supra jam exposuimus. Omnia autem huc redeunt: nunquam in principio post invasionem statim, ubi terrore, & metu æger jactatur, habet locum, sed secundo vel tertio die, si urget plethora, & vires sinunt, admittenda moderata.

Quid de nitro. Art. 344. Sic etiam de nitri usu ambigunt medentes. Qui rejiciunt, putant illud nimium refrigerare, & expulsionem veneni ob id resistere, pestis etiam venenum jam tum esse stupefactivum, putredinosum, ac diarrhæas inde metendas ferre lethales. Qui probant illud non secus ac in aliis exanthematicis inflammatoriis, & malignis febribus diaphoreticis nuptum egregie prodesse contendunt. Sed lis facile dirimenda. Spectanda sunt individua, eorumque natura, & temperamenta, & expectanda morbi symptomata. — Sempertamen tutius est, si nitrum sociatur camphoræ, quo connubio camphoræ vaporosa, & nitri refrigerans indoles optime cicuratur, & medicina emergit non modo alexipharmaca, sed & inflammationi efficaciter resistens.

Bubon. & an- thrax. etatio. Art. 345. Exterior in bubonibus si tardius prodeunt, attrahentia imponere jubent, cucurbitulas, quin vescicatoria. Si protuberant, suppuratio promovenda cataplasmate ex ficibus, radice liliorum alborum, cepis sub cineribus coctis cum farina lini, melle, & croco. Vel imponenda suppurantia simul atque discutientia, emplastrum diachylon tam simplex, quam cum gummatibus, de mucilaginibus, nec non de meliloto. Ubi suppurarunt aperiendi, & balsamo *Arcei* nonnunquam unguento basiliconis re-
mix-

mixto mundandi, & consolidandi, ita tamen ut non nimis cito coeant, sed aliquandiù materiæ saniosæ concedatur effluxus. Anthracibus, quia humor jam corruptioni obnoxius, non admovenda suppurantia, sed curandum, ut crusta decidat, quem in finem Loimiatri confinia digestivo inungere, & acre emplastrum superponere jubent. Crusta delapsa unguento Ægyptiaco, vel fusco *Vurzii* cum melle rosato tractandi. Quod si autem corruptio sphacelosa adest, & latius serpere videtur, prohibendum hoc sufficienti scarificatione, & applicatione liquoris, qui potenter inflammationi ac putredini resistit, expertæ sæpius a me virtutis, parandi ex sp. vin. rectific. unc. iv. camphor. ℥ij. croci ℥j. nitri artificialis tantundem hoc est ℥j. quod ex spir. sal. armoniac. urinoso & spir. nitr. conficitur, ac a vini spiritu perfectè dissolvitur.

Art. 346. Demum quoad regimen in genere *Regimen*, adhuc tenendum, quod sicuti in omnibus acutis exanthematicis morbis, nimius lecti, & conclavis calor omni studio, ceu summopere noxius, vitandus, ita multo magis ipsa in pestilentia. Vicissim vero arcendum etiam frigus, ne tumorum eruptio, & difflatio subtilioris venenosæ materiæ per cutis poros ullo modo intercipiatur. Temperata potius sint omnia, uti jam in antecedentibus passim monuimus, iterumque monemus.

Farrago sententiarum.

Art. 347. Si quis, (inquit *Bonetus*) cum *Præser-*
ægris conversatur, qualicunque morbo affectis, *varia*
nunquam, quamdiu intra sphæram vicinitatis ta- *varia.*
lium moratur, salivam deglutiat, sed semper eandem expuat, sic ab omni infectione, Deo & natura
juvan-

juvantibus, erit immunis. „ Observatum fuit
 „ scabiosos & lue venerea laborantes peste minus
 „ tentari. Frustulum myrrhæ in ore detentum
 „ in locis contagiosis versantibus optimum præ-
 „ servativum censetur. Quidam medicus, sæ-
 „ viente peste, sibi ipsi & quibusdam aliis seta-
 „ ceum in utroque inguine comparavit; unde
 „ morbo intacti tutò evaserunt, „ Observarunt
 „ *Forestus, Diemerbroeck, Galli, Angli, Germa-*
 „ *ni*, „ omnes Smegmatopolas, Lotrices & omnes
 „ qui ex officio sapone utebantur, immo qui
 „ saltè indusia sapone elota gerebant in peste
 „ illico mori. *Boerhaave.*

*Vires li-
monum.*

Art. 348. Peritissimi (inquit *Piso*) nonnulli
 Indiæ medicastrum plus præsidii in limonibus po-
 nunt, quàm in lapide Bezoar, aut theriaca con-
 tra malignos morbos, & pestilentes Febres, at-
 que ipsa venena. Ego autem sine jactantia af-
 firmo me ex nullo aliquo remedio simplici tot
 foelices affectus in tota praxi mea observasse,
 quàm ex limonibus.

Communis Turcarum praxis (inquit *D. Har-*
ris in tractatu de morbis infantum p. 88.) in
 curanda Peste fit per succum limonum in omne
 jusculum liberius instillatum, per frusta limo-
 num saccharata ore frequenter masticata, & per
 potum apud nos vulgatissimum dictum Sherbett,
 hoc est, per ipsum regimen frigidissimum: ut-
 pote quibus alexipharmaca nostra calidissima bo-
 nis auspiciis sunt planè incognita, aut in nullo
 numero saltem habentur.

*Vires
campho-
ra.*

Art. 349. Ex regno vegetabili supereminet cam-
 phora, quæ ab omnibus practicis extollitur (in-
 quit *Ettmullerus*) undè nobile expertissimum o-
 leum pestilentielle *Heinsii*, medici Veronensis,
 qui cum hoc mira præstitit, adeo ut ipsi post
 mortem Veronæ statua fuerit erecta: Composi-

tum

tum est ex ol. camphoræ succini & cort. citr. ana p. æ. quæ oleo invicem benè juncta constituunt hoc mirabile remedium; pro præservatione dos. gut. 5. vel 6. pro curatione a gut. vj. ad xv. in vehiculo idoneo expectando sudorem, *Sal viperarum* & *Rob. Sambuc.* laudantur.

Art. 350. In usu etiã sunt quamplurima alia remedia composita ad præcavendum & curandum gravissimum hunc morbum, ut.

Aqua prophylactica.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. petasitid. ℥j. fol. rut. m. iv. meliss. scabios. flor. calend. ana m. ij. nuc. jugland. immatur. concis. ℔ij. succ. pom. citr. (vel aurant. acid.) ℔j. acet. vin. opt. ℔xij. digere per noctem & distilla lento igne ad siccitatem. Optimum alexiterium habetur.

Acetum Pestilentielle, Bat.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. bacc. junip. ℥ij. rut. m. iij. acet. opt. ℔ij. macera, ac cola. Pro suffitu, & oris collutione grassante Peste.

Aqua theriacalis. Diemer.

℞. Rad. nastrutii, petasitid. angel. carlin. valerian. ana ℥ijss. enul. campan. cort. aurant. sicc. ana ℥iij. herb. scord. absynth. ana ℥ij. card. ben. ℥iij. flor. ros. rub. ℥ss. stechad. ℥iij. bacc. junip. ℥iijss. cardamom. min. ℥v. cinamm. ℥j. vin. Rhenan. vel Gallic. tem. ℔xxij. aq. ros. ℔ij. vase bene obturato stent. in infusione dies x. deinde add. fol. rut. m. vj. tanacet. m. iv. rorismarin. pimpinel. ana m. iß. maneant simul in infusione adhuc per octo vel decem dies, quotidie baculo commovendo, postea affunde succ. citr. ℔ij. stent. adhuc per 3. 4. dies, postea super ignem leviter ebulliant, & colentur, ac in torculari fortissime exprimantur, collatura destilletur in b. m. & servetur ad usum.

Cataplasma Pestilentielle. Bat.

℞. Stercor. columb. ℥iv. croc. ℥ss. *Mithridat. theriac.*

riac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. s. m. Pro bubonibus rumpendis invenienda.

Item *Spiritus theriacalis camphoratus*, *tinctura bezardica Ratean.* Et alia innumera apud scriptores medicos.

Officia
& præ-
cautio-
nes Ma-
gistra-
rum.

Art. 351. Morientium numerus, quo loca tali miasmate infecta horrescunt, & cadaverum multitudo in sepulchretis congesta, cum oculos animumque terrore conficiant, merito quisque alibi querit asylum, ubi a tam contagioso malo tutus ac immunis vivere possit, cujus tam subita & periculosa est communicatio, ut homines halitu sibi ad invicem morbi semina dicto citius aliquando transfundant.

Art. 352. A Magistratibus locorum, in quibus morbus grassatur, tentoria citra tormentorum bellicorum jactum imperanda sunt, in quæ transvecti ægri methodo infra tradenda curari debeant. Ex publico ære lignorum viridescantium, & fœni strues parandæ, ut diu & jugiter vel ardeant vel effluent, etenim per media tentoria, & per urbem tali modo aeris communicatio intercipitur. Si circumpositum solum herbis aromaticis, & balsamicis ditescat eadem evulsæ super ardentes strues cremari debent, ut earum fumo infectus aer corrigatur. Tales quidam ignes per plateas, & latiores vias multiplicare præstat, cum ab eis tutior præservatio, quæ expectari possit, comparetur: sic Hippocratem fartam tectam insulam *Coos* a Peste crebris & magnis ignibus passim accensis præstitisse accipimus. Præterea Magistratibus ab initio usque incumbit, ut sordes, impuraque, & foetida aliunde transferri jubeant, quippe quæ virus pestilentielle & fovere possunt, & abditum diu conservare; fimum aliasque impuritates a plateis atque magis frequentatis viis longe arcere; extra tem-

templa cadavera, sepulcris procul ab Urbe dif-
fisis recondita vel calce absumi; coetus omnes &
publicos conventus, atque adeo commercium &
societatem cum urbibus, in quibus morbus vi-
get, & quæ suspectæ sunt, interrumpi; nulla
prava alimenta inferri, sed tantum quæ laudabi-
lem nutritionem, & succum ministrant, atque
demum statim ac morbus primo erumpit, cito
sanos ab ægris discriminari.

Art. 353. Sequentibus autem signis pestis se *signa &*
se manifestat. Corripit primo ægros rigore, & *sympto-*
horrore, qui paulo post internum ardorem va- *mata*
lidumque percipiunt. Quamvis vehementer hunc *Pestis,*
ardorem percipiant, ut plurimum tamen mini-
me alterati apparent, subinde levi febricula te-
nentur, & siti tantum inconsueta. Major aut
minor sit febris, interdum lingua sicca atque
fusca apparet: urinæ subinde a naturali statu
non recedentes, quæ in nonnullis tamen rubi-
cundæ ac flammæ prodeunt, in aliis limpidæ
atque crudæ, in quibusdam demum turbidæ &
sedimentosæ; & identidem eodem die sæpe mu-
tantur, nam modo sanorum urinis similes, mo-
do sanguinæ videntur. Quandoque ægrum pro-
fundo somno detentum vel etiam delirio, sæpe
atroci capitis dolore, vigiliis sociato, oculis ar-
dentibus, & cordis angustia oppressum offendes.
Pulsus ejus interdum validus ut in statu natu-
rali apparet, interdum vero debilis, parvus, &
frequens, modo æqualis, modo inæqualis; & in
quibusdam etiam intermittens. Continuis agi-
tationibus ægri exercentur, qui timore quasi
perculsi toti contremiscunt, nam & tendinum
subsultus eos vexant, & convulsivi tremitus per
artus, visum item obfuscatum habent, atque tin-
nitu & aurium susurro conqueruntur. Quidam
reperiuntur a principio usque viribus fracti, alii
con-

contra quorum vires usque ad obitum valentes satis persistunt. In nonnullis alvi fluxus quibuscumque remediis pertinaces observantur, in quibus egestiones crudæ interdum sunt, & frequentes, ut plurimum tamen aquam impuram referunt, in aliis etiam vermes. Hæmorrhagiæ per nares diffusissimæ vel per os, vel per oculos, aut aures, aut virgam, aut uterum in quibusdam occurrunt, in aliis etiam continui vomitus. Sunt qui nauseas, anorexias, Cardialgias, & singultus patiuntur, & qui maculas in cute rubras, purpureas, violaceas, nigras modo majori modo minori numero referunt, quarum figura subrotunda, magnitudo vel major vel minor, situsque vel in una aut altera parte, vel per corpus universum. Plurimi item dantur ægroti, in quibus bubones retro aures, ad mentum, vel collum, sub axillis, & ad inguina prorumpunt, vel in quibus carbunculi exoriuntur a diversis corporis partibus, quæ ubi apparent signum certissimum grassantis pestis exhibent, maxime si febrem comitem ducunt, aut eidem superveniunt.

*Definitio
Pestis.*

Art. 354. Ex his omnibus liquidum est definiri posse pestem, morbum esse epidemicum, contagiosum, acutissimum a veneno subtili productum, quod per aerem diffusum corpora nostra subit, bubones, carbunculos, maculas vel exanthemata aliæque graviora symptomata producendo. Hic sane morbus insigni, miraque corruptione sociatur, in qua itidem ejus naturam atque essentiam consistere affirmamus.

*Generica
observa-
tiones
circa
remedia
antipe-
stilentia-
lia.*

Art. 354. Quantum ad remedia huic flagello propria, notum est, ea de quibus olim utiles experientiæ captæ fuerunt, in aliis occasionibus reperta fuisse inutilia. Nam miasmate venenoso eodem jugiter non existente mirum non est, si ad

si ad nova experimenta confugere necessarium existimetur ; tum etiam si in contagiosis morbis : ut in variolis, purpura &c., in quibus aer minimam partem habet , ratione habita ad causas intus operantes, remedia specificè efficacia uno anno reperta, subsequente vel inutilia, vel nocua deprehenduntur. Quid, amabo, concludendum erit, de *Analepticis*, *Alexipharmacis*, *Cordialibus*, aliisque remediis feliciter adhibitis, & summa laude adversus flagellum hoc usurpatis, maxime ubi perpenditur hujus fomitem plus in atmosphæra aeris quam in corporibus eandem inspirantibus latere ? Præstantius quod hac in re consilium commendari potest, est profecto illud, quod omnia remedia, quæ hisce in occasionibus utiliter adhiberi possunt in usum trahantur, eadem plurimis, diversisque ægrotantibus porrigendo, indeque productis effectibus diligenter attendendo. Ceterum quæ deinceps prescribemus, vel jam experientia comprobata, vel saltem consentanea sunt principiis omnium consensu admissis, atque adeo digna videntur, ut tentamini subjiciantur.

Art. 356. Inter tutiora præservativa compositio *Acetum quatuor latronum* dicta, primas equidem obtinet, ideo conveniens erit ut tempore, quo Pestis grassatur, Magistratus jubeant, insignem ejus quantitatem singulis maxime pauperibus gratis erogari, unde unusquisque secum ferre possit præservativum ore & naribus subinde admovendum, cujus compositio habito respectu proportionis partium, si quantitas augetur, hujusmodi est.

*℞. Acet. alb. ℥iij. s. allii concis. unc. iv. Ass. Acetum
foetid. unc. j. rad. gentian. unc. ij. mithrid. unc. j. bacc. quatuor
junip. man. j. infund. super cin. calid. vel ad solis latro-
num.
calor. per hor. 24. in vase claus. dein facta percolat.*

lat. & express. servet. usui. Singulo mane stomacho jejuno cochleare deglutiatur. Sed hujus aceti compositio secundum Pharmacop. Paris. ultim. edit. ita se habet. ℞. *summit. recent. absynt. maj. & min. rorismar. salv. menth. ruta ana unc. j. sem. flor lavendul. unc. ij. allii Zij. calam. aromatic. cinamom. caryophyl. nuc. mosc. ana Zij. acet. opt. lib. viij. infund. & macer. per dies xij. ad solis calor. vel ad ign. aren. in vase vitr. optime clauso, dein liquore decantato, & forti express. resid. filtr. demum add. camph. in vin. sp. solut. unc. sem.*

Adversus aeris corruptiones eximias virtutes habet acetum hoc, cujus inventio quibusdam tribuitur furibus, qui specie auxilium ferendi ægrotantibus in Peste Massiliensi magnas opes furtim congeffere. Historia narrat: ex iis quempiam in carcerem conjectum, & suspensioni damnatum, vitam oblato arcano remedio sibi redemisse. Hinc hujusmodi acetum post sæpenu-mero servata vita per naturalia mortis pericula, etiam a furca nequam hominem vindicavit. Ceterum ad valetudinis tutelam præstat in ipso cubili, ubi morari datur, juniperum, roremmarinum, lavendulam, & hyssopum vel alios aromaticos frutices accendere non solum vespere dum cubitum itur; sed mane etiam dum surgitur. Post hæc duo alia præservativa hic insuper sistimus.

Infusum antipe- stilentia- le. ℞. *Summit. genistr. caulic. rub. pug. ij. contund. par. & infund. in vin. alb. per dies ij. hujus infusio- nis singulo mane ante egressum duo tresve digit. transvers. e cyath. hauriuntur.*

Aliud præser- vati- vum. ℞. *Salv. maj. ruta, fol. sambuc. rubi ana man. j. gingiber. unc. j. vin. alb. ℥iij. infund. per hor. viij., dein ebull. per horæ quadrant. & colat. servetur usui, cui add. gingib. pulv. unc. sem. Dosis duor. vel trium digit. in cyath. sing. mane per novem dies conti- nuanda.*

Art.

Art. 357. Si pestilenti morbo laboratur, the-riacæ drachma cum cyatho dimidio aquæ buglossi assumenda est, indeque bis in die remedium supra descriptum hauriatur; & si *carbunculus* vel *Bubo* proruperit eidem imponenda sunt folia sambuci, & rubi cum semine synapeos contusa.

Art. 358. Perraro admodum purganda est alvus, quod si opus, nisi lenioribus preservationis gratia subduci debet, nam validior purgatio omnes corporis humores commovet, eodemque suscipiendo viro pestilenti idoneos reddit.

Art. 359. Corrigi potest aer, non solum ignibus, & flammis: ut superius meminimus; sed *Quomodo aer etiam suffumigiis ex sulphure, & nitro simul purificatur.* mixtis; quare pulvis pyrius optimi correctivi, vices præstat; sed juniperus, thus, pix nigra, & camphora veluti validiora preservativa ad suffumigia paranda commendantur.

Ad abigendum igitur malum aerem, quod sequitur, suffumigium valde præstat.

℞. Vitriol. Zij. ruta man. j. acet. destill. unc. xiv. macerent. simul per hor. 24. additoque vitrioli pulver. versatur liquor super lateres ad ignem candefactos, atque fumus inde exhalans malum aerem corrigit.

Art. 360. Nec e domo quisque egrediatur jejunos, & uta peste immunis abire possit, panis frustulum ex cyatho vini absynthiti quotidie devoret.

Vel. ℞. Frustulum camphoræ magnitudinem pisi exequans, quem ad flammam accensum in cyathum vini plenum deice, si in casu extinguatur, toties idem accende, quousque totum absumitur. Hoc vini cyathum antequam e domo egrediaris propinato.

Tamquam validum præservativum habetur quoque spongia aceto imbuta, & naribus admoda. Præservationis gratia sequens item valet remedium.

℞. Rad. angelic. cortic. citr. q. v. macerentur in aceto per hor. 24. Hujusmodi radicis vel corticis frustulum saepe ore detineto, & masticato.

Remedia curativa Pestis. Art. 361. Ad curandam pestem sudoriferis, alia sistimus remedia, quæ magni estimantur, maxime vero, quod sequitur Opiatum.

Opiatum antipestilential. *℞. Croci, rad. cyperi, tormentill. semin. synap. ana unc. j. hisce radicibus, & seminib. seorsim pulveratis misceantur, & cum mithridat. unc. iij. atque acet. optimi tantundem diu agitentur in mortar. marmor. opiatum hoc in vase probe clauso conservatur, ne evaporet.*

Statim ac quis percipit se a morbo correptum hujus opiati ℥ unam cum cyatho dimidio vini albi tepentis solutam propinet, & per bihorium incessum abeat, postea in lecto cubet calefacto, & stragulis optime coopertus sudet, sudorque ejus pannis lineis calefactis identidem abstergetur, & corpus fricetur. Tempore quinque vel sex dierum vino se abstineat, & ptisana tantum utatur ex rad. scorzoner. graminis cum hordeo. Sed aquam antipestilentialem itidem addimus.

Aqua antipestilentialis. *℞. Herb. sclarea vel chelid. maj. man. ij. salu. minor. artemis. centaur. min. ana man. j. rad. cyper. scabios. cann. montan. peterfil. fœnicul. ana man. j. concis. infund. in acet. fortiss. lib. x. per hor. 24. dein alembic. destillentur, cujus aque destillatæ duo vel tres digiti transversi in cyatho ei exhibentur, qui sese a morbo correptus percipit; quique postea diu ambulabit donec plurimum incalescat, atque inde decumbendo sudabit, & sudorem calide a se abstergere jubebit. Aliud item remedium contra pestem est.*

℥. Rad. cyperi, fol. & rad. scabios. rasur. inter. cort. nucum avellandar. ana man. j. rad. flor. & sem. cardui bened. man. iij. infund. in acet. opt. per 24. hor. Postea decantet. acet. exsiccata species pulverentur, pulvisque per densum setaceum trahatur, cuius cochleare plenum dabitur ægro cum vini rubri parvo cyatho, cubitum ituro. Pulvis antipe-
stialis.

Art. 362. In curatione Pestis per sudorifera cavendum, ne æger fluente sudore dormiat, quia somnus salubres evacuationes inhibet. Quodsi vigiliæ urgeant, & timor adsit, ne delirium insit, nonnullis placet: duo saltem grana laudani sudoriferis addere, quibus delirium compescatur, & finitis sudoribus æger somnum capiat. Habenda autem est ratio virium ægri, dum sudor promovetur, idcirco satis est, una vel altera hora post sumptum remedium sudare.

Art. 363. Incipiente Pestis invasione utilia admodum sunt Emetica; sed cavendum est, ne vomitorium æger assumat, quin ejus Buboni unguentum suppurativum applicatum sit metu ne vi vomitionis materia noxia retrocedat. In hujus morbi regimine nec phlebotomia, nec purgatio, nec clysmata temere sunt præscribenda, & præservationis gratia balsamum apoplecticum quisque secum ferre potest. ℥. Sp. volat. sal. armoniac. aq. reginæ hung. vel malum citreum caryophyll. conditum, aut simile aliquod aroma, quibus auxiliis non tam olfactus recreatur, quam eriguntur spiritus atque roborantur.

In cura Pestis, quæ Londini grassata est, sequens pulvis ægregia præstitit beneficia. Alius.

℥. Ranam marem seu bufonem, quem exenteratum exsiccabis cum jecure, indeque pulverabis. Hujus pulveris drachmam cum meri cyatho exhibeto.

Remedia
pro Bu-
bon.

Art. 364. Inter remedia quæ utiliter bubonibus applicari possunt commendanda sunt *Emplastr. Diachylon* cum gumm. Vel *emplastr. divinum cataplasma. ex Ceba, rad. lil. alb. & oxalid.* sub cinerib. coctis additis *ung. basilico, & fermento.* Aliud item quod plurimum laudatur remedium est.

℞. Ceba magnæ num. j. remotis externis involucris cum adnexis foliis nucleus projiciatur, pro quo ingerantur fol. plantag. rutæ, salv. min. menth. nig. ana p. æ. cum mithridat. ad eandem quantitatem. Singulæ herbæ contusæ, clausæque intra cepæ involucria humida circumducta tela sub cineres calidos coquantur. Cum satis coctasprehendes in cyathum vini albi demerges, ubi etiam comprimes, & liquorem per filtrum exprimendo trajicies, sic quod exhibit propinabis, & reliquum applicabis tepidum tumori, ubi aderit: sub axillis, ad collum, aut alibi, imposito & super plantaginis folio. Hoc præstito decumbat æger calide, & probe sudet. Ubi sudor eruperit, linis calidis obster-gatur.

Licet etiam pestilentialibus tumoribus sequens admoveere cataplasma, quod inter attrahentia excellit.

℞. Ceba magn. num. j. caput allii sem. synap. cochlearia ij. contund. simul in mortario, & Bubonibus admoveantur.

Ad eundem obtinendum effectum aliud *Cataplasma.*

℞. Bacc. herb. a Paris dictæ, fol. scrophul. ferment. ana man. j. m. & f. cataplasma. bubonib. applicandum.

Plurimum etiam celebratur sterco humanum forma cataplasmatum tumoribus imponendum.

Art. 365. Suppuratis tali pacto bubonibus ulcus exurgens abstergendum est, atque consolidandum.

dum. Huic scopo quod sequitur remedium facere potest.

Rad. consolid. maj. man. j. conteratur & ulceri imponatur donec solidescat.

SUDOR ANGLICUS.

Vvillisi sententia.

Art. 193. Sudor anglicus cœpit anno 1585. circa initium mensis Augusti, duravitque usque ad finem Octobris; & quamvis Sennertus dicat, hoc malum deinceps 40. annos regioni huic familiare & perpetuum fuisse, tamen nostrates, & medici, & historici, qui tunc aut prope ea tempora vixerunt, eum perfecta & magna intervalla habuisse observabant; cumque 66. annorum spatio solummodo quater redierit, viz. anno 1506. 1517. 1528. 1551. vix unquam supra sex menses deferuisse, & nonnunquam spatio trimestri terminatum fuisse, eumque tempestatem valdè humidam semper præcedaneam habuisse. At vero singulis quibus increbuit annis, maximas ubique edidit mortalium strages; ut ab unoquoque ejus regni quibusdam in locis tertia pars hominum brevi desideraretur. Tanta fuit ejus malignitas, ut quamprimum urbem aliquam invaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet; & ex ægris primo vix centesimus evaderet.

*Morbi
historia.*

Art. 367. Morbi typum a Sennerto compendiose & methodice descriptum, etiam nostris authoribus consonum, hic inferere visum est. Morbo hoc correpti statim sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languore dissolvebantur, & animo deficiebant cum fumino virium languore, inquietudine *καταγυμῶ*, capitis dolore, pulsu crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione

*Morbi
typus.*

maxima; sudore vero diffleuebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solveretur, quod intra 24. horas contingebat; nam qui *sudorem* non proliciebant, neque *cardiacis* utebantur, & qui impatientius calorem ferebant, auramque frigidam captabant, ii omnes subito intra 24. horas moriebantur. Postea ubi morbi hujus ratio innotuit, ut ægri *Sudores* elicerent, ac *cardiacis* se munirent; pauciores moriebantur.

Curatio describitur. Art. 368. Circa curationem paulo accuratius scribit *Polydorus Virgilius*: post ægrotantium plurima experimenta & observationes, a juvantibus, & lædentibus factas, ita usu venit; ut remedium unicuique promptissimum inventum sit, quod hujusmodi est. Si quis interdum sudore corripitur, cum vestitu protinus cubatum eat; si nocte, tum quiescat, nec se a loco moveat usque ad 24. horas exactas; interim ita se stragulis oneret, ut non provocetur Sudor, sed sua sponte molliter stillet, cibi nihil capiat, si tam diu tamen tolerare possit; neque plus potionis consuetæ, ac calefactæ hauriat; quam modice satis sit ad sitim extinguendam; inter hanc curationem imprimis caveat, ne manum quidem aut pedem suum refrigerandi, recreandique causa extra stragula proferat, quod facere lethale est. Addunt alii toto isto nycthemeri spatio a somno prorsus abstinendum fuisse. A sudatione hac Pestilenti recuperati postquam aliquamdiu sani perstitissent, quandoque in eam rursus, imo interdum vice tertia, incidebant.

Cajus apud D. Freind. Hist. Med. p. 333.

Vol. II.

Sudor Anglicus. Art. 369. Sudor Anglicus fuit morbus temporarius, *magna Britannia* indigena. Cœpit primo anno 1483^o in exercitu regis *Henrici* septimi

quum

quum ad portum *Milfordiensem* appulisset, *Londoni* sæviebat a 21o Septemb. ad finem Octobris. Et exinde quinque aliis vicibus in insula nostra comparuit, idque semper æstivo tempore primo in 1485, deinde in 1506, & tunc tertia vice in 1517, ubi tanto impetu æstuabat, ut in instanti quasi, tribus nempe horis, mortem inferret; inter optimates multi, & populares plurimi moriebantur; in quibusdam oppidis incolarum dimidiam partem abstulit. Tum demum in 1528 quarto redibat, quando ægri inter sex horas perierunt; vita ipsius regis *Henrici* octavi valde periclitabatur; plurimi inter *Aulicos* interibant. Anno sequenti, viz. 1529. semel tantum *Belgium* & *Germaniam* infestabat, apud quos multi occubuerunt. Postremo anno 1551 *Angliam* ultimo invasit; *Westmonasterii* centum ac viginti in dies moriebantur. *Salopia* speciatim, ubi *Cajus* author noster commoratus est, ingenti hominum clade invaluit, & tanquam *Pestis Athenis* tremenda est ejusdem descriptio, hoc oppido per septem menses deflagavit, quo tempore mille hominum trucidavit. Maxima proprietate ab illo vocatur *Febris Pestilentialis contagiosa unius diei*.

Art. 370. Modus invasionis sic se habuit. Imprimis singularem aliquam partem affecit; symptomata concomitantia fuerunt calor internus & ardor, sitis inexplibilis, anxietas, ægritudo ventriculi ac præcordiorum (raro tamen vomitus) cephalalgia, delirium, deinde languor & somnolentia gravis, pulsus celer & vehemens, respiratio cita & laboriosa. Infantes, pauperes, & senes cæteris huic morbo minus obnoxii reperti sunt: reliquorum autem pauci a contagione liberi, & inter correptos paucissimi convaluerunt. Exules patriæ in *Galliam*, aut *Flandriam* prophylaxeos causa fuga minus sospitali freti pariter eo-

Symptomata.

dem fato cum contrerraneis suis obierunt. Et insuper, quod dictu adhuc mirabilius est, peregrini tunc temporis in *Anglia* hospitantes contagio immunes extiterunt; cum *Angli* peregre existentes morbo correpti sint.

*Methodus
medicandi.*

Art. 371. Medici hujus novi morbi adeo exitialis aspectu terrifico perculsi primo obstupuerunt, nec quid faciendum esset bene norunt: Experientia vero a juvantibus, & lædentibus petita paulo maturius docti eundem debito regimini & medicamentis temperare didicerunt. Indicatio curativa primaria, ac præcipua fuit *sudorem liberum promovere & diutius sustentare*: Sudor enim quoquomodo imminutus, abruptus, vel suppressus mortem accelerabat, quocirca ægroti omni opera a frigore muniendi fuerunt, & si sudores sponte sua haud satis copiosi fluxerunt, medicamentis diaphoreticis, & stragulorum plurium impositione provocandi fuerunt, & vires cum cardiacis, & vino sustentandæ. Morbus hic acutissimus quindecim horis ad *acmē* exsurgebat, sed non ante hor. 24. res in vado fuit. In quibusdam necesse fuit sudationem repetere, immo in robustioribus quandoque ad duodecimam vicem. Nonnulli, qui sudoribus haud sufficienter indulserunt, *in Febres mali moris* inciderunt. Primis quinque horis potus omnino prohibendus erat; hora 7^a morbus increvit, qua delirium superveniebat; somnus per totum morbi decursum sedulo excutiendus erat, & carnes non concedendæ.

Sive Fasciculus Morborum secundus .

I N F L A M M A T I O .

Art. 372. **I**Nflammatiō in genere est tumor re-
nitens ad tactum cum rubore, ar- *Inflam-*
dore, dolore urente, tensivo, pulsatili, puncto- *matio in*
rio, & gravativo, quibus semper accidet Febris *genere.*
plus minus acuta . Tumor vel resolvitur, vel
suppuratur, vel in scirrhum abit, vel gangræne-
scit, & mortem infert.

A N G I N A .

Hippocratis sententia.

Art. 373. Anginæ non una sed tres sunt spe- *I. Spe-*
cies . In prima specie febris corripit, & rigor *cies An-*
& dolor capitis, & maxillæ intumescunt & spu- *gina.*
tum æger difficulter deglutit, expuit autem &
salivas duras, & paucas, & infra in faucibus
stertit & si apprehensa lingua inspexeris, gur-
gulio non magnus est sed mollis, fauces autem
intrinsecus saliva viscosa plenæ sunt, & non
potest excreare, & decumbere non sustinet, ve-
rum si decumbat suffocatur, & oculi affecti
sunt, & prominent velut in strangulatis, & in-
tente per ipsos videt, & ipsos commovere non
potest & anxius est, & exilit frequenter, & fa-
cies ac fauces ardent, imo etiam collum . At
videntibus nihil mali habere videtur, & videt
ac audit obtusius, & præ suffocatione non in-
telligit, nec quid dicat, necque quid audiat, aut
faciat, verum hians decumbit salivam fundens.

Qui

Qui ita se habet quinta aut septima aut nona die moritur.

II. Species. *Art. 374.* In secunda specie febris, & dolor adest & fauces inflammantur; itemque maxillæ, & salivam deglutire non potest æger, sputat autem crassam, & multam, & difficulter loquitur.

III. Species. *Art. 375.* In tertia specie linguæ posterior pars inflammatur, itemque locus sub tonsillis ad guttur, & neque salivam neque quicquam aliud deglutire potest æger, si vero coactus fuerit per nares ipsi effluit.

Observationes. *Art. 376.* Duo humorum species Anginam faciunt altera nempe a glutinosa, & frigida fluxione facta est, altera ab acri & calida. Prior fluxio in latiores decumbit venas; secunda in tenuiores; Prior quæ pituitosa est hyeme vel vere defluit, secunda Autumno & vere. Fiunt & Anginæ in pluviarum multitudine, & quadam constitutione vigente; in liberis raræ erat, & mitissimæ; in servis vero exuberabant, quibus vehementissimæ contingebant, & ab eis celerissime peribant.

Prognosis Angina. *Art. 377.* Ab angina habito si tumor fiat in collo bonum, aut tumor, & rubor in pectore superveniat bonum est. Anginæ quæ neque in collo neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, verum suffocationem vehementem, ac spirandi difficultatem inducunt eadem die, & tertia occidunt; quæ vero tumores, & ruborem in collo accipiunt, & in cæteris quidem consimiles sunt, verum diuturniores; quibuscumque vero & fauces, & cervix, & pectus simul rubuerint diuturniores sunt: at ex ipsis maxime servantur si non recurrerint rubores; si vero dissipentur neque tuberculo foras converso, ac collecto, neque pure leviter ac sine dolore

lore excreato, neque in diebus judicatoriis perniciosæ sunt; num etiam suppurati fiunt? Securissimum enim est ruborem, & abscessum quam maxime foras verti. Erysipelas vero foris quidem accedere commodum est, intro autem converti lethale. Convertitur autem intro, quum disparente rubore pectus gravatur, & difficilem spirationem habet. Quibus vero anginae ad pulmonem vertuntur partim in septem diebus moriuntur, partim evadentes suppurati fiunt, si educatio pituitosa sursum ipsis non fiat. Quibus per pulsationis venarum vehementiam stercus de repente per alvum secedit lethale est. In angina sputa gracilium subarida malum, anginosi in lingua tumores citra signa disparentes perniciosi. Et dolores disparentes citra manifestam causam perniciosi sunt in anginis; Qui non brevi concocta expuunt perniciose habent. In angina dolores ad crura citra notas cum febre perniciosi. Ex anginis citra indicationem præcordii dolor cum impotentia, ac torpore oboriens occidit occulte, etiam si mansuete se habere putent. Ex anginosis citra notas attenuatis dolor ad pectus, & ad alvum progressus concitatus, pus egerere facit; alias autem ejus qui exsolvitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestum dolorem faciunt, sed & ad crura dolores diuturni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa viscosa, crassa, valde alba, quæ violenter educuntur mala sunt, & omnis ejusdem maturatio mala. Ex angina subarida frequentia sputa cum tussi, lateris dolorem inducentia perniciofa; itemque ea quæ inter potandum per tussim submerguntur; sed deglutitio in anginis violenta mala est.

Art. 378. Si angina aut aliquis alius lateris *Angina* morbus ægrum divexarit medicamentis, quæ de- *Curatio.*
lin-

linguntur repurgato; fin vero detracto copioso sanguine æger debilior videatur, infusum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis, donec in tuto æger fuerit, & fame opus habeat. Quamobrem sanguinem ex brachiis detrahes, mox venas quæ sub lingua sunt secabis, sed in prima, & altera specie cucurbitulas ad verticulum in collo primum affigito: deinde in capite præarso, & juxta aurem ad utramque partem apponito, & ubi cucurbitas affixeris ad multum tempus eas adærere finito, deinde calida exhibebis gargarismata, caput abrasdes, ceratumque tum capiti tum collo circumpones, lanisque circumvoves, mollique spongia ex calida aqua expressa fovebis. Bibat autem aquam, & mulsam non frigidam, cremoremque assumat.

Aræti sententia.

*Duplex
Angina
species.*

Art. 379. Dux Anginæ species reperiuntur, altera cum caliditate, & magna tonsillarum inflammatione, & extrorsum versus tumefactione, quin etiam lingua, gurgulio, & omnes adjacentes particulæ in tumorem efferuntur; altera iisdem locis collapsis, & submissis efficitur, sed interius compressio majore strangulatu discutiat, ut interna inflammatio ad cor usque pertingere videatur. Huic vero celerrime occurrendum est nam, & hac celerrime ægroti rapiuntur.

*Quæ cly-
steribus
curanda.*

Art. 380. Igitur si crapula, & ebrietas incausa sunt; eodem die clysterem imperato, isque duorum generum sit, alter usitator, quo stercore educantur; alter ejusmodi, ut aliquas a tonsillis pectoreque humiditates evellere possit; neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto, sed centaurii, & hyssopi decocta infundenda sunt;

sunt; hæc enim etiam pituitam educere solent.

Art. 381. Si tenuis autem victus præcesserit; *Que
phleboro-
mia.*
scindere cubiti venam expediet, & latior sectio
facienda est, ut majori cum impetu copiosior
sanguis emanet. — Haud ignobile quoque ad-
jumentum præstat, si ad animæ usque defectum
ægrum perduxeris, usque eo tamen ne anima de-
ficiat.

Art. 382. At si deglutiendi via expeditissima *Quæ ca-
thartici-
cis.*
sit elaterium, & cum mulla, & cum sero lactis,
quantum ad purgandum hominem satis est pre-
beatur, aliis enim purgatoriis elaterium in his
ægotis præstantius est. Conferunt etiam thy-
melea & synapi, siquidem hæc ambo ventrem
repurgant.

Art. 383. In quibus vero inflationes degluti- *Quando
secunda
ranula*
tionem impediunt, lingua ad palatum reflexa
ipsius venas (h. e. raninas) rescindito, quod si
prompte multus sanguis defluat inter alia reme-
dia magis proderit.

Art. 384. Irrigationes utique seu gargarisma- *Garga-
rismata.*
ta locis inflammatis, primum quidem adstrin-
gentes ut retrorsus materiæ labantur, conve-
niunt, quamobrem lanæ sordidæ hyssopi vino
madentes, aut oleo ex immaturis olivis expres-
so accipiantur. Quia etiam cataplasmata irriga-
tionibus similia sunt ex. gr. palmulæ vino ma-
defactæ, & cum rosarum foliis contusæ, & si vi-
scidum ac molle cataplasma desideretur etiam
hordei farina admisceatur aut lini semen, & mel
& oleum, quorum omnium mixtura fiat.

Art. 385. Quod si tumor ad suppurationem ve- *In sup-
puratio-
ne Angi-
næ.*
niat, calida admovenda sunt: quibus & in al-
tera angina specie utendum est. Adesto igitur
foenigræci farina, & manna, & resina, quæ li-
quari possunt, & poli coma inspergatur, nec
non & fomentum calidum adhibeatur spongiis
in

in decocto lauri baccarum hyssopique madentibus. Ad movendum pus autem efficacissimus est columbinus fimus tenuiter per lineum sacculum instar pulveris transmissus ac super inspersus ; iddem & caninus eodem modo præstat.

Ad reprimendam inflammationem .

Art. 386. Ex mulsa vero cum lentis , aut hyssopi aut rosarum , aut palmularum , aut simul omnium decocto collutiones fiant. Illinendum præterea totum os est ut & ad intimas fauces mororum , aut malorum punicorum aqua maceratorum succo , aut palmularum decocto , vel etiam compositis medicamentis ut Diamoro , aut eo quod ex ruta sylvestri , & succo rhei componitur , aut Diachelidonio idest: ex hyrundinibus confecto medicamento .

Ad faucium ulceræ .

Art. 387. Sin ulcera crustosa sint, collutiones , & gargarismata fiant ex hyssopi in mulsa , aut pinguium ficorum in aqua decocto : præter hæc amyllum percolatum in mulsa , aut in ptisanæ tragive cremore .

Altera Angina species .

Art. 388. Si Angina cum concidentia , quæ erat altera species occupet , ab interioribus extrorsum omnia vocanda sunt — proinde calidæ irrigationes sunt cum ruta , & anetho nitro insperso , & cum his superius memorata cataplasmata . Proficit etiam ceratum ex nitro , & synapi ad calorem excitandum superdare , calor autem exterior hujusmodi vitium tollit , Tumor enim foras in sublime elevatus a pulmonis inflammatione liberat, intus vero abditus anginam periculosam facit .

Laryngotomia .

Art. 389. Quicumque strangulationem ab angina verentes , quo laxius spiritus duceretur , asperam arteriam secuerunt , experimento sane rem comprobasse non videntur , nam vulneris ora in unum coalescere nequeunt quia ambæ cartilagine inter se inglutinabiles sunt . „ Id

„ ve-

„ vero nostra ætate post plurima habita experi-
 „ menta nullam facit difficultatem; instituta e-
 „ nim laryngotomia vulnus optime glutinatur. „

Cælii Aureliani sententia.

Art. 39 **I** Nflammatio faucium, *synanche* di- *Angina*
descri-
ptio.
 sta, est difficultas respirandi (cum

suffocationis periculo) ob vehementiam tumoris
 faucium ; in morbo nascenti adest querela sine
 ratione, atque difficilis motus colli, & guttu-
 ris, item saliva plurima, subdolens & faucium
 sensus cum asperitate sensibili, difficultas deglu-
 titionis salivæ, tum respirationis, velut impedi-
 mentum tanquam obstantis crassioris humoris.
 Crescente malo partes affectæ rubent & tument,
 uti tonsillæ & summitas gutturis fere ad suffo-
 cationem; dehinc intumescit collum atque vul-
 tus; humores evadunt crassiores, oculi promi-
 nent sanguinolenti; demum lingua ultra den-
 tes ad exteriora prolabitur, siccescunt fauces,
 gelidus torpor articulos invadit; pulsus est celer
 & densus, locutio cum summo dolore, neque
 articulata, postremo amputata, livor vultus,
 recursus poti liquoris per nares, gutturis atque
 pectoris stridor, & quibusdam quasi *sonitus ca-*
ninus, pulsus defectio, quibusdam oris spuma-
 tio, mors.

Art. 391. Lanis mundis ac mollibus, & non *Curatio*
 infectis, dulci atque calido oleo infusis protegen-
 dum est collum cum thorace; adhibenda est phle-
 botomia intra biduum. Aqua calida pro potu
 ordinario præbenda est.

Boerhaavii sententia.

Art. 392. Angina duplex est: Species prima *Angina*
sine tu-
more
 sine ullo tumoris externi internive signo, altera
 cum

fere sem- cum tumore aliquo; prior in fine morborum diu-
per le- turnorum, maxime post ingentes & repetitas eva-
zhalis. cuationes, contingit; pallorem faucium & sicci-
 tatem, & tenuitatem, comites habet; quare *ner-*
vos & musculos resolutos plerumque habet; fere
 semper est signum imminentis mortis. „ Angi-
 „ næ gravissimæ sunt (*inquit Hippocrates pro-*
 „ *gnost.*) & celerrime interimunt, quæ neque
 „ faucibus, neque in cervice quicquam conspi-
 „ cum faciunt, plurimum vero doloris & *or-*
 „ *thopnœæ* inducunt. “ Remedia vasa vacua bo-
 no succo vitali replentia, calefacientia & corro-
 borantia indicantur; sed raro curatur. Quando-
 que etiam oritur subito sine signis manifestis præ-
 gressis ullius morbi; vix capit medelam; & fere
 semper post mortem suppuratum pulmonem de-
 monstrat.

Angina
cum tu-
more.

Art. 393. Angina cum *tumore* accidens varias
 occupat partes, uti linguam, eju s que musculos,
 palatum, tonsillas, uvulam, pharyngem, laryn-
 gemque earumque musculos, ossis hyoidis mu-
 sculos, fistulam pulmonalem, œsophagum ejus-
 que musculum, &c. quo plures harum partium
 inflammantur, eo sævior est morbus & pericu-
 losior, decurrit enim consuetum *inflammationis*
generalis iter, eosdemque facit ac patitur mu-
 tationes in *resolutionem*, *pus*, *gangrenam*, *scir-*
rhum.

Indica-
tionēs
curati-
væ.

Art. 394. In specie hac inflammatoria omni
 arte tentanda est resolutio; 1. *Venesectione lar-*
ga, &, si opus fuerit, aliquoties repetita. 2°. *Pur-*
gantibus ore haustis, vel *clysmatibus*. 3°. *Victu*
potuque tenuissimo. 4°. *Nitrosis subacidisque me-*
dicamentis. 5°. *Vapore tepido* assidue hausto.
 ℞. *Acet. sambuc. rosar. calendul. ana ℥j. aq. stil-*
lat. sambuc. ℥vj. misce. Vapor calidus hauriatur
 infundibuli ope in fauces. Fomentis, epithema-
 tis,

tis, epispasticis, &c. His successu carentibus, renuntiata prius acerba prognosi, celebranda erit *bronchotomia*, de qua operatione consulatur auctor, ut etiam de *Angina œdematosa*, *catarrhosa*, *scirrhusa*, *suppuratoria*, *gangrenosa*, singulatim.

Art. 395., In illa Anginæ specie, quæ Cy- *Laryn-*
 „ *nanche* appellatur, ægro suffocanti *Laryngoto-* *gotomia.*
 „ *mia* institui potest. Morbus ipse periculosior
 „ est, quam hæc operatio, quæ hoc tempore
 „ magis ad praxin esset revocanda. Circumspe-
 „ ctione nihilominus hic summa opus est, nè,
 „ si aliæ quoque partes pulmo scilicet, pleura,
 „ gula, &c. inflammatae, aut jam pure repletæ
 „ sint, irritus sit labor, & calumniandi ansam
 „ præbeat. Omnibus igitur bene consideratis
 „ operatio hoc modo est aggredienda: reclinetur
 „ aliquantum caput, quousque in conspectu ma-
 „ gis prodeat trachea, annulique ejus cartilagi-
 „ nei a se invicem magis recedant. Incidatur
 „ deinde cutis secundum longitudinem laryngis
 „ usque ad foveam. Hæc utrinque ministri di-
 „ gitis deducatur, quo oculis chirurgi occur-
 „ rant muscoli duo longi sternohyoidei, cultro
 „ ligneo vel osseo a se invicem parum remo-
 „ vendi, mox, larynge sese exhibente, sectio in
 „ ea fiat ope phlebotomi, loco inter anulum
 „ cartilagineum tertium, & quartum medio,
 „ sedulo cavendo ne cartilagines ipsæ lædantur,
 „ Flatu prodeunte cultellum aufer, vulnerique
 „ fistulam argenteam infigito, bene prospicien-
 „ do, ne, longior justo, posticam trachæ par-
 „ tem attingat, unde tussis continua. Suffoca-
 „ tionis periculo cessante, quod die tertio aut
 „ quarto plerumque contingit, vel saltem con-
 „ tingere oportet, fistula ablata vulnus ordina-
 „ rio modo secundum artem curetur, nam ab
 „ aliis non differt. Chirurg. Barbet. p. 498.

Ettmulleri sententia.

Angina divisio. *Art. 396.* Angina est faucium & colli inflammatio; dividitur in *synanchen*, quando interni faucium seu pharyngis muscoli inflammantur; *parasyanchen*, quando dictæ externi afficiuntur; *incynanchen*, quando internæ laryngis partes sunt inflammatae; *paracynanchen*, quando dictæ externæ patiuntur. In *cynanche* pulmones quoque sæpius afficiuntur, unde insignis respirandi difficultas, tanquam in *peripneumonia*, adeo ut ægri canum more ore hiante respirent. Tonsillarum inflammatio ex lymphæ vitio Febrem habet conjunctam, sed magis lentam, & omnia symptomata sunt remissiora, quam in *Angina*; fauces rubent, & tonsillæ tumidæ insigniter prominent. Periculosus est Anginæ in *Pleuritidem* transitus. Anginosi spuma circa os apparens est lethale signum.

Tonsillarum inflammatio.

Curatio. *Art. 397.* In cura omnia ea conveniunt, quæ *pleuritidis* in usu esse solent, speciatim animalium stercore, ut equinum, caninum, &c. quæ morbum in prima herba detruncant; externe conducit cataplasma ex *nido hirund.* . . . *nid. hirund.* N. j. cep. sub cineribus assat. N. iiij. flor. sambuc. p. ij. coq. in lact. & trajice per cribr. deinde add. alb. græc. ℥β. ol. cham. stillat. ℥β. lilior. alb. q. s. m. *Venesectio* aliquoties repeti debet pro ratione circumstantiarum; omittenda est tamen in *angina maligna*, in qua *sudorifera* & *specificæ* sunt usurpanda, & ipse medicus caveat sibi ab halitu ægrotantium: Convenit *vomitum* in principio anginæ malignæ, modo mature administretur. *Purgantia* locum non habent in angina, sed *enemata* & *vesicatoria*: Inter gargarismata *urina propria* valde commendatur, item *succus sedi majoris*,

ris cum spiritu vini & sal. armoniac. & stercore canino. Præ reliquis convenit gargarisma ex decocto raparum cum paucis sal. armoniac. Ad rumpendum abscessum convenit gargarisma ex sem. sinap. in hydromel. coct.

Art. 398. In angina notha, alias alba dicta, *Angine notha curatio.* non opus est venesectione nisi in plethoricis; conducunt potius in principio sudorifera, & post hæc purgantia leniora cum externis resolventibus, gargarisma ex decoct. origani, rad. pyrethri, sem. sinap. cum aceto, &c. & postea succ. sempervivi cum syr. e maris.

Barbeyraci sententia.

Art. 399. Angina affectio est gutturis vicinarumque partium respirationem, vel deglutationem impediens, modo solidorum, modo liquorum, ulla sine labe Asperæ arteriæ vel pectoris. *Angina definitio.*

Art. 400. Dividitur in spuriam, & veram. *Eadem in veram & spuriam dividitur.* Angina spuria quæ ordinario sine febre ingruit, evenit: quando materia quædam puitosa ad Pharyngem, vel ad glandulas laryngi circumpositas descendit, vel quando colli vertebra quædam luxatur, adeo ut ab ejus pressione, nec per trachæam libere respirare, nec per oesophagum alimenta deglutire liceat.

Art. 401. Angina vera ea est quæ ex insigni inflammatione musculorum Laryngis vel Pharyngis carniūque vicinarum oritur, & cum vehementi febre sociatur. Hæc vero in quatuor itidem subdividitur species habito respectu partium, quas impetit; nam si interiores tantum Laryngis musculi inflammantur, dicitur Cynanche; si musculi externi Paracynanche; si vero

inflammantur muscoli interni Pharyngis *Synanche* vocatur; si externi *Parasynanche*.

Angina vera causa interna. **Art. 402.** Harum quatuor specierum interior causa eadem quidem est, ac quæ aliarum omnium inflammationum quamlibet corporis partem corripientium, videlicet sanguinis effervescentia, qui a carotidibus vehementer, & ingenti copia refluus mirifice has ipsas partes distendit, & nonnullis dilaniatis fibrillis extravasatus impedimentum facit subsequenti, ne per easdem venas ad cor pervenire possit; quare noviter superveniente ibidem loci sanguine, partes illæ in tumorem crescere coguntur, donec extravasatus dissipetur, vel a præterfluente in vasa iterum rapiatur, vel fermentando putrescat, quod ubi contigerit tumore disrupto pus effluens, per os emanat vel in aspersam arteriam descendit, ni reclinato capite cito expuatur.

Causa ejusdem externa. **Art. 403.** Inter externas causas recensentur: aeris summum frigus, præsertim corpori valde calefacto superveniens, potus algidi, prava Constitutio aeris, tempestatum anomalix, videlicet: ut quando modo calor, modo frigus eadem die se se alternative excipiunt; insolatio cum capite nudato, ingentes vocis conatus cum exclamatione, similiaque.

Quoad spurix Anginæ causas, jam satis meminimus ubi partitionem hujus morbi in spurium & verum dedimus, quare necessarium nobis non videtur, eadem in re diutius immorari.

Angina Diagnos. **Art. 404.** Symptomata, quæ prosequuntur Anginam, adeo eam compertam reddunt, ut irritè tempus absumeremus fusius clariusque ejus diagnosin perscribendi. *Vera* autem a *spuria* discernitur, quia illa semper cum febre conjungitur, in quæ etiam major deglutiendi, aut respi-

spirandi difficultas adest, dolor locum affectum exercet; & rubor denique interdum foris apparet. Quæ a cujusdam vertebræ luxatione producit facilius ceteris cognoscitur. Si inflammatio partes externas Pharyngis, vel Laryngis occupat, deglutionis respirationisque difficultas major est, ac ubi internas partes tenet; hoc itidem casu dolor profundior est, & inflammatio non raro ad externas usque partes circa collum se se manifestat.

Art. 405. Inevitabilis necessitas respirationis, *Progn.*
& alimentorum satis evincit Anginam ex per-*sis.*
riculosis morbis esse, quia vetando, ne utrumque præstari possit, necessario sequitur ex defectu respirationis sanguinis circulationem inhiberi, unde eodem in pulmonibus accumulato suffocatio iminet vel ex alimentorum defectu, quibus corporis partes nutriantur, & spirituum animalium jugis absumptio reparetur, mortem fores pulsare; quin possibile sit ut alio modo vitari possit. Angina ex vertebrarum luxatione ferme semper lethalis est; aliæ vero ejus species plus minusve periculosæ ratione magnitudinis, & gravitatis symptomatum, quibus sociantur.

Art. 406. Curatur hic morbus eadem omni-*Curatio.*
no ratione, qua reliquæ omnes inflammationes; videlicet revellendo, & derivando sanguinem in faucium aliarumque vicinarum partium musculis accumulatum; quod ope reiteratæ phlebotomiæ ad brachia, pedes, imo ad ipsas jugulares institutæ obtineri potest. Quia vero periculum iminet, ne æger repente suffocetur; maxime ubi inflammatio latior est, & vehementior; ideo sanguinis effusio timenda nequaquam est, sed affatim jubenda, adeo ut tempore 24. horarum quinque vel sex vices usque venam se-

care liceat . Inſiſtente morbo hyrundines utili-
ter hinc inde circa collum applicari poſſunt ,
maxime vero in ejus parte anteriore , cujus ef-
fectus quandoque mirabilia præſtat , ut etiam
cucurbitæ ad cervicem , & infra mentum ſcari-
ficatæ . Venarum *Raninarum* ſeu *Ranularum* ſub
lingua apertio tanti non videtur momenti ; ideo
præteriri poteſt . Neque hyrudines aut cucurbi-
tæ ſcarificatæ uſurpandæ ſunt quin prius vena
brachii , vel pedis , vel Jugularis quater vel
quingies ſecetur . Poſt ſingulam Phlebotomiam
clyſter injicietur valide purgans , ut inde mobi-
lior pars noxiæ materiæ ad inferiora ſollicite-
tur , cujus ſequenti rationem concinnari pote-
runt formulæ .

Clyſter. ℥. *Fol. Malv. mercurial.* , *Betæ. Parietar. ana*
man. j. ſem. Anif. Fœnicul. ana Zij. Hordei ,
Furfur. ana man. ſem. flor. Camomill. Melilot.
an. pug. j. ſenn. oriental. ſemin. Cartham. Polypod.
Quercin. ana unc. ſem. coq. in ſuſ. aq. quantitate
per aliquot hor. Colat. lib. j. diſſol. Diaphœnic.
Diaprun. ſolut. ana ℥vj. Mellis mercurial. unc. ij.
f. Clyſter una hora a phlebotomia injiciendus , &
eadem die , vel poſtridie ſi opus repetendus .

Ceterum a primis uſque morbi diebus exhi-
bentur ægro emulſiones , ut inde ſanguinis ar-
dor temperetur , ejuſque vehementior motus co-
hibeatur , quibus utiliter adduntur narcotica ad
dolores , & deſluxiones inhibendas .

Emulſio. ℥. *Amygdal. dulc. excorticat & mundat. N.*
xij. 4. Sem. maj unc. j. Semin. pap. alb. Lactuc. ana Zij.
Contund. in mortar. marmor. ſenſim affundendo
Aq. Roſ. pap. rub. ana unc. iij. & colatur. adde
Syrup. Capill. vener. vel Violar. vel Nenuphar. unc.
ſem. Syrup. pap. alb. Zijj. vel Laudan. gr. j. & f.
Emulſio vespere exhibenda .

Gargarifmata , quæ hac occaſione uſurpari ſo-
lent ,

lent , multum quidem emolumenti non præstant, quibus vero eorum usus arridet, sequentem formulam ex melioribus , & usitatoribus adjungimus .

℞. Rad. Glycyrrhiz. Cortic. Granat. ana ℥ij. Gargarisma.
Flo. Balaust. pug. j. Uvar. exsiccata. ℥vj. Caricar. ping. num. vj. vel vij. Aq. Hord. q. s. ebull. simul, & colatur. lib. j. dissolv. Mellis Rosat. Syrup. Capill. vener. unc. j., & sit ad usum gargarismatis.

Vel sequens etiam usurari potest.

℞. Rad. Mal. Alth. ana unc. ij. Semin. Lini Aliud.
Fœnugrac. ana ℥ij. Uvar. exsiccata. man. sem. Flor. Camomill. Melilot. ana pug. j. Aq. Hord q. s. coq. simul, & in colat. lib. j. dissolve syrup. Ros. exsiccata. unc. j.

Ad temperandam humorum acredinem partes inflammatas irritantium, sequens Lohoch utiliter usurpatur.

℞. Mucilag. semin. Psill. Cydonior. Aq. rosar. extract. unc. iv. Syrup. Violat. unc. ij. m. f. Looch
cujus nonnulla cochlearia subinde agro porrigantur, ut intra os detineat; liquefactum sensim deglutiat.

Evacuatis sufficienter per crebras phlebotomias vasibus purgandus æger est pharmaco sequenti.

℞. Senna unc. sem. Pulp. Cass. unc. ij. Crystal. miner. ℥ij. Ros. pallid. pug. sem. infund. frigid. in Aq. font. tribus cyath. per noctem, mane sequent. colat. cyathus dabitur hauriendus hora sexta, alter cyathus dabitur hora octava, tertius demum hora undecima; sed in primo cyatho tantum dissolvetur Syrup. de cichor. cum Rhabarb. unc. j.

Insistente morbi gravitate etiam post reiteratas phlebotomias, quibus non obstantibus inflammatio æque valida perennet, & suffocationis periculum impendeat purgantia omni dubitatione procul fortiora reddi debent, atque e-

tiam D. RIVIERE exemplo emeticum propinari, quod tamen nisi præmissa consultatione decerni nequit.

Regimen. Art. 407. Quoniam in hoc morbo febris vehemens ut plurimum occurrit, ideo jure carni tantummodo solidis quibuslibet interdictis alimentis nutriendus est æger, maxime vero ubi deglutiendi difficultate laboret. Quodsi inflammatio ita oesophagum teneat, ut nec liquida alimenta descendere possint opitulandus est æger, imissa per os cannula recurva ultra locum inflammatum sensim intrusa, per quam syringa nutrientes liquores in oesophagum injici debent. Hoc itidem casu commode nutrientes clysteres usurpantur, quorum ad exemplum sequentem tradimus formulam.

Clyster ℞. Juris carn. ℥ sem. vitel. ovor. num. ij. sacchar. nutriens. unc. j. m. f. clyster si opus bis terve per diem reiterandus.

Quid Art. 408. Omnia quæ hucusque proposuimus *præstandum ubi ipsa inflammatio ad suppurationem vergat.* remedia deliniendæ inflammationi inserviunt, dissolvendoque tumori; verumtamen si morbus adeo pervicax est, ut necesse sit ad suppurationem devenire, promovenda eadem erit cataplasmate emolliente aliquo, cujusmodi:

Cataplasma emolliens. ℞. Fol. jusquiam. vel semperviv. q. s. coq. sub ciner. calid. intra cartam humentem revoluta. Post coctionem pulpa educatur; item ℞. Rad. bryon. lil. alb. ana unc. sem. fol. pariet. man. j. flor. camomel. man. sem. coq. & contund., quibus per setaceum trajectis pulpa itidem educatur. Mixtis utrisque pulpis adde farin. semin. lini, fœnugrac. ana unc. ij. butyr. ol. camomill. parum. F. cataplam. quod collo

Quid applicabis, & quotidie bis renovabis.

Suppuratio tumore præstandum. Artic. 409. Iisdem adhibitis vegetabilibus, cum additione folior. malvæ, & althææ juvabit collum tepide fovere, antequam cataplasma applicetur.

Ab-

Absoluta suppuratione tumor aperiendus est, vel compressu digitorum, vel phlebotomo, vel cingula, vel demum *Pharyngotomo* quod instrumentum est, noviter inventum instar cannulæ phlebotomum occultantis, cujus cuspis occulti elateris ope, usque ad certam mensuram vibratur. Hujus instrumenti ope periculum abest alias partes simul rescindendi, sed tumor tantum impetitur. Si vero nudo phlebotomo operatio instituitur, acies ejus tandiu digitis occultanda donec ad gulam perventum est. Hic eadem parum producta tumor vulneratur, simulque ægri caput reclinando datur opera, ut effluens materia in os, non vero in fauces descendat. Quod si tumor adeo profunde in gulam lateat ut, nec videri, nec digitis tangi possit ad instrumentum confugiendum est quod *Speculum oris* vocatur. Hujus ope dilatato ore, & lingua depressa cultri acies parum recurva ingeri debet quæ capulo ligneo adeo longo munienda est, ut ad locum usque tumoris pertingat, eademque demum tumor vulneratur.

Aperto inde tumore, atque pure emanante, decoctione quadam deterfiva, atque adstringente ulcus abluitur; cui scopo non contemnendam opem sequens exhibet.

℞. Hord. integ. man. j. rad. glycyrrhiz. unc. sem. uvar. exsiccat. ros. rubr. ana man. sem. aq. font. lib. j. coq. ad consumpt. quartæ part. in colat. dissolv. mel. rosat. unc. sem. pro gargarism. Gargarisma abstergens.

Si ulcus sponte sua pedetentim non consolidatur, collyrio *Lanfranci* subinde tangendum.

Interea perficitur curatio ægrum subinde purgando aut ejus alvum clysteribus laxam detinendo, in primis autem cavendo, ne solidis succosisque alimentis utatur, metu ne eadem materiam augendæ defluxioni aptam ministrent.

Ceterum antequam finem faciam monendum est: fieri non posse, secus ac veteribus visum est, ut pus ab aperto anginoso tumore dimanans pectoris empyema generet, cum in ejus cavitate descendere nequeat, quod sane necessarium esset ad empyema producendum. Nam omne quod evenire potest illud est, ut per asperam arteriam ad pulmones abeat, in quibus sensim depluendo, ulcus faceret vel affatim descendendo suffocationis periculum induceret. Ut plurimum tamen neutrum evenire observatur, quia si aliquid puris descendit id nisi per oesophagum fit, atque inde in stomachum, ubi nullum quidem, vel saltem non adeo insigne periculum impendet.

Farrago sententiarum.

Syden-
hami
metho-
dus.

Art. 410. Angina temperamento sanguineo præditos, & rufos præ reliquis invadit; *venesectio* copiosa in brachio celebranda est, mox in ranula; deinde tangantur partes inflammatae melle rosaceo spiritu sulphur. ad summum acorem permisso, & *vesicatorium* nuchæ admoveatur. Si morbus sit diuturnior, *venesectio* repeti debet & *enemata* injici, item *catharticum* propinari &c. Sydenham.

Remedia
ad salivam
copiosissime
educendam

Art. 411. ℞. ol. amygdal. dulc. flor. sulphur. ana ℥j. chrystall. tartar. sacchar. cand. ana ℥ij. ol. n. m. gut. iv. syr. de alb. ℥iij. m. f. linctus. Atque hunc præ aliis omnibus laudat Dr. Harris in observ. morb. grav. Ad salivam copiosissime educendam nihil pulv. sequent. (inquit author) præstantius efficaciusve novi. ℞. chrystal. mineral. sacchar. chrystal. ana p. æ. misce, teneatur in ore ℥j. donec saliva abundaverit, tunc expuatur; horæ post quadrantem vel dimidium repetatur, mirum

rum quantum hinc salivæ, &c. *Musgrave*. *Sucus corticis viridis nucum* cum melle depuratus commendatur a *Galeno*.

Art. 412. „ Venæsectionem in *ranula* omnes *Remedia*
 „ fere extollunt, quidam in *vena jugulari*; *phle. varia.*
 „ botomia vero in *pede* alterutris præferri debet
 „ ob majorem revulsionem. Angina nulla tuta
 „ est, quanto minus tumoris, tanto magis pe-
 „ riculi; securissima est, si rubor maxime fo-
 „ ras vertatur. Interne *antipleuritica* fere omnia
 „ profunt, privatim *oleum lini* nunquam satis
 „ laudandum, Externe *gargarisma anginosum*,
 „ *gargarisma ad pituitam*, *cataplasma anginosum*,
 „ *vapor ad anginam*, &c. *Fulleri*. Item *gargaris-*
ma sequens in angina notha, *℥. auric. judaic.*
℥iss. rad. pyrethr. ℥ij. herb. hyssop. p. ij. ficum ping.
scis. N. iv. coq. in aq. font. q. s. ad ℥j. sub finem ad-
dendo mellis ℥iv. colatur. add. pulv. subtiliss. alb.
grac. ℥ij. sp. vin. rectificat. ℥ij. sp. cochlear. ℥ss. misce.

Art. 413. Angina vera ut plurimum a sola in- *Vera an-*
 flammatione musculorum pharyngis vel laryn- *gina cau-*
 gis non generatur, sed sæpiissime exoriri vide- *sa fre-*
 tur a tumefactione, & inflammatione glandu- *quen-*
 larum, circa eadem organa jacentium quæque *tior.*
 musculis inferuntur.

Quando plane confirmatus morbus est, & tu-
 mor una cum inflammatione interius magis ac
 exterius prominet, nec non respiratio difficilli-
 ma vel deglutitio admodum impedita videtur,
 topicis remediis tantum non est immorandum,
 sed frequentes, & copiosæ sanguinis emissiones
 jubendæ statim, quæ si nihil proficiant, confu-
 giendum est ad operationem *Bronchotomiam* vel
Laryngotomiam dictam, quæ, utut periculosa vul-
 go reputetur, morbo ipso tamen minus habet
 discriminis. Atque revera si pauci inveniuntur
Chirurgi, qui eandem calleant, multoque mi-
 nus

nus qui prospere perfolvissè affirment, tota hujus operationis inefficacia ab hoc uno proficisci videtur: quod nimis sero, & circa extrema versante ægro suscipitur, atque per consequens tempore quo temerarium est, ac satis imprudens eam usurpare. Contra si pulmones nondum inflammati sint ægrumque facile operationem hanc perferre posse judicetur, tuto jubebitur, maxime quia innumera experimenta evincunt tracheæ vulnera nec insanabilia esse nec lethalia.

*Bronchotomia
descriptio.*

Art. 414. Ad Bronchotomiam igitur ordinatim, & rectè instituendam, lecto vel scamno æger affideat, posterius capite reclinato ad pectus famuli, ejus manus cum corpore possidentis. Sic locato ægro chirurgus situm commodiorem minusque periculosum ad perfolvendam operationem eligat: videlicet ad pollicem infra Laryngem intra tertium, & quartum tracheæ annulum cavendo, ne eos annulos lædat. His omnibus ritè prænotatis integumenta primo transversim digitis comprehenduntur; tum secundum longitudinem secantur, & scalpello dexterius quo fieri potest muscoli Sterno-Tyrodei, & Sterno-Hyoidei separari debent.

Detecta aspera arteria carnea membrana cartilagineos annulos conjungens lanceola transversim inciditur, vitatis nervis recurrentibus necessariis spiritus ad munera organi vocis vehementibus, quæ iisdem nervis reflectis desineret. Cavendum item est, ne profunde nimis adigatur instrumentum, metu oppositum latus tracheæ vulnerandi.

Post incisionem non educitur lanceola, quin stylus immittatur ad parandam viam introductioni cannulæ, quæ brevis, recurva, & habenda incisioni proportionalis antea comparatur.

Ea-

Eadem brevis adhibetur ne immissa oppositum tracheæ latus attingat, indeque tussim continuam faciat, & duobus foraminulis instruitur, ut trajecto filo firmata in situ suo circa collum ad ligari possit. Quidam consulunt ad modificandum aeris per hanc cannulam ingressum, ut eadem gossypio vel velo obtegatur, alii contra irritas has præcautiones habent, & nihil omnino adjiciunt. *Cl. Boudon* autem cum *D. de Garregeot* consentit relinquendam parumper esse cannulam omnino detectam, habita antea cautione cubiculi fenestras clausas detinendi, & aerem igne admissio tepesciendi, postea vero eandem simplici velo obtegere satis habent, ut aer libere ingredi ac egredi possit. Velum emplastro perforato desuper imposito, & turunda ejusdem figuræ firmatur, atque hæc omnia obductis fasciis, quin cannulæ apertura nunquam obtegatur, in situ suo detinentur, ne ad capitis, & colli motum laxentur, aut decidant. Triduo ferme elapso cum aer per consuetas vias sibi transitum expedierit, atque respiratione satis libere cedente, totus apparatus cum cannula adimitur, curationisque intentio ad consolidandum tracheæ vulnus convertitur, quod ex lege artis, eo ipso modo expeditur, quo reliqua vulnera tractantur, & sanescunt.

PLEURITIS & PERIPNEUMONIA

vera & notha.

Ægineta sententia.

Art. 415. Dolor latericius, quem Græcè *pleuritim* dicunt, proprie membranæ costas succingentis inflammatio est. Comitatur hunc anhelitus difficultas, tussis, febris continua, dolor ad claviculam usque, & præcordia pertingens; discerni autem pleuritis ab inflammatione jecinis,

Pleuritis quid sit?

ris, in qua omnes hæ notæ apparent, hisce indiciiis potest.

Pleuritis vera diagnosis.

Art. 416. Pleuriticus quidem dolor punctilis infestat, & tussis quandoque arida, quod morbum crudum portendit: quandoque cum sputi rejectione, quod humorem, qui morbum creat, innuit. Rubrum etenim & sanguinolentum excreatur, sanguine naturæ modum exuperante. Flavum vero & in pallorem languescens, cum flava bilis superat. Quemadmodum rursus albicans, & spumosum si pituita. In melancholico vero humore nigrius rejicitur. Pulsus durus ac ferræ modo denticulatus subest.

Ejus distinctio ab hepaticide.

Art. 417. In jecoraria vero inflammatione, nullus dolor compungens neque durus adeo pulsus sentitur, sed arida tussis, qua nihil expuitur, usque molestat, facies pallidior apparet.

Pleuritides notæ seu spuria.

Art. 418. Quæ vero laterum compunctiones ex musculorum externorum inflammatione oriuntur, hæ quidem nothæ pleuritides appellantur, in quibus absque tussi, absque excreationibus, cum molliore pulsu, locus affectus manu attrectatus dolore afficitur, & nisi suppuratus tumor discutiatur post coctionem ad exteriora prorumpit; quum pleuritis ex inflammatione membranulæ costas succingentis creata eo non feratur, illa vero nisi vel foras, vel intus a purulenta colluvie expurgetur, multo citius in vomitricam peripneumoniacam transit.

Curatio pleuritidis.

Art. 419. Si igitur ad claviculam usque dolor protenditur, vena incidenda est; sin vero ad præcordia usque perveniat, purgandum. Reclamantibus autem viribus imbecillis neutrum faciendum; sed clysteriis acrioribus utendum. Quodsi dolor mediocris affuerit, pro clysteribus aqua mulsa, & ptisanæ aut chondri cremor propinentur. Si dolores vehementer affligunt post

evacuationem demulcendi sunt lanæ calentis vel sulphuratæ impositu, aut fomentis ex millio, & furfuribus in sacculo adhibitis, aut calida aqua, seu oleo vescicula excepto. Circa quartum diem sorbitionibus ægrum nutrito adjecto melle perexiguo. Septem autem diebus elapsis, linctus ex amygdalis, semineque urticæ melle contritis offeretur, aut eclegma ex butyro melleque decoctum. Injiciendum insuper eo morbo oppressis per inferna medicamentum ex butyro & terebinthina. Sed efficacior linctus est, qui ex fructu piceæ: item ex amygdali amari, seminis lini, nuclei pinei, & amyli æquilibrium cum melle conficitur. Quos autem vigilæ torquent, eos medicamentum e papaverum capitibus delingere competit. Post decimum vero & quartum diem si malum non cesserit cucurbitulæ ipsis imponendæ, ægri in extenuatoria victus ratione servandi. Deinde ubi morbus remittitur in lavacrum ducendi, frigidum vitandum. Victus solidior adhibendus.

Arætei sententia.

Art. 420. Hunc affectum comitatur dolor acutus ad jugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflammatum facilis est: in sua enim ipsius sede collocatur: in oppositam vero partem decubitus dolorem concitat: a pondere enim & phlegmone, & suspensione in omnes membranæ continuas partes ad humeros usque, jugula, quibusdam & in terga, & in dorsi scapulas dolor protenditur. Pleuritida veteres Græci appellarunt, Latini morbum lateris vel costarum.

*Signa
pleuritidis.*

Eam vero sequitur difficilis spiritus, vigilia, ciborum fastidium, malarum rubor hilaris, tussis

sis arida, sputa ægre exeuntia pituitosa, aut biliosa, aut abunde cruenta, aut subflava, & hæc ordinem non servantia, sed alias alia advenientia, & recedentia. Ex omnibus vero pejus est si cruentum sputum desit. Delirant autem & nonnunquam comate occupantur: atque in soporem gravem declinantes mentis alienationem patiuntur.

Prognosis mala. **Art. 421.** Itaque si in malum vertatur morbus omnibus in pejus vergentibus intra septimum isti in syncopem lapsi consumuntur. At si in secunda hebdomada educi sputa incipiant, & mala augescant, decimoquarto die pereunt. Nonnumquam sane intra hujus temporis spatium omnium in pulmonem transitus est. Trahit enim in se ipsum pulmo rarus, & calidus, & ad proxima trahenda sese commovens; tuncque morbi transpositione homo repente strangulatur. Ceterum si diem hunc ægrotus transierit; etque intra vicesimum non moriatur in empycum, hoc est pectore suppuratus evadit. Hæc profecto si morbus ad perniciem tendat, eveniunt.

Prognosis bona. **Art. 422.** At si in melius vergat sanguinis e naribus larga profusio cum impetu succedit; tuncque repente morbus discutitur; quandoquidem & somnus oritur, & pituitæ rejectio advenit, postea biliosorum tenuium, deinde multo tenuiorum, rursus vero cruentorum, crassarum, carnis formam referentium. Quod si post cruenta iterum exeat bilis, post ipsam pituita, segura est hæc in pristinum restitutio. Hæc si tertio die incipiunt, & facile extussiunt, lævia, æqualia, humida, rotunda, septimo die liberantur, quando & venter biliosa exturbat, spiratio conquiescit, mens ad se reddit, febres decrescunt, ciborum appetentes sunt. Si secunda vero hebdo-

domada hæc inchoantur, decimo quarto die sanantur: sin minus in empyema h. e. pectoris suppurationem morbus vertitur. Id vero rigores indicant, doloresque punctorii: sedere cupiunt, spiritus deterius ducitur: tunc metus major est, ne pulmo pus multum subito attrahens hominem suffocet, qui prima & majora mala evaserat.

Verum enim vero si inter costas morbus irreperit, easque disjunxerit, & phlegmonis fastidium extrorsum deprompserit, aut versus intestina eruperit plerumque homo ad sanitatem redit.

Art. 423. Inter anni tempora hyems maxime hujus morbi ferax est: secundo autumnus, ver minus, nisi interdum frigidum sit; æstas vero minima. *Quo anni tempore frequentior.*

Quantum ad ætates attinet in primis senes pleuritidi sunt obnoxii, qui etiam sæpius quam alii liberantur, neque enim magnus phlegmon in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est, quippe qui est in senectæ, quam in alia ætate frigidior. Juvenes autem, & viri haud ita frequenter in hunc morbum incidunt, verum neque admodum frequenter evadunt, nam neque ab exigua causa, neque ob exiguum phlegmonem ægrotant. In magnis autem majus inest periculum, & pueri minime pleuritide corripiuntur, minusque ab ea periclitantur. *Qui fastidius corripiantur.*

Art. 424. Si pulmo male habet pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitam agit, mors tardissime advenit, si quis medellam adhibet. Si vitium insigne fuerit quale est phlegmon, strangulatus sequitur, vocis spiritusque sublatio, subitanea perniciēs iminet. Hæc est ægritudo ea quam Græci Peripneumoniam, Latini *Peripneumonia diagnofis.*

mini Pulmoniam dicunt: vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. At si quæpiam ex membranis eum ambientibus, & ad pectus deligantibus inflammatur: adest tunc dolor, spiritus est depravatus, calidus: sedere volunt laborantes ad spiritum facilius ducendum, rubescit facies, sed malæ præcipuè, oculorum album nitidissimum ac pingue est: summæ nares scimæ sunt, venæ temporum, vel etiam colli elatæ apparent, cibos averfantur: calor in exterioribus membris modicus, humectusque est in interioribus ingens, aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguæ siccitas, frigidi aeris aviditas; mentis ambiguitas supervenit: tussis adest plerumque sicca: si aliquod sputum movet perinde est ac in pleuritide sed cruentum, floreo colore valde perfusum est, & aliis perniciosius est.

Prognosis mala. *Art. 425.* Quod si mortifera magis ægritudo redditur, vigiliæ augescunt, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, quia Græcis *Coma* nominatur: cogitationes vanæ insurgunt: mens alienatur, non raro ecclasi corripiuntur: præsentia mala ignorant, nam eos si de morbo interroges, nihil periculi inflare respondent, eorum algent extrema: livescunt ungues, curvanturque, motus arteriarum parvi, frequentissimique sunt, & deficientes, quando ipsis proxima mors est; nam septimo die plerumque moriuntur.

Prognosis bona. *Art. 426.* Porro si nonnumquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius vergit, vehemens de naribus sanguinis eruptio consequitur; aut per alvum cum perturbatione multorum biliosorum, & spumantium succorum dejectio multa liquidior, & facilis; nonnumquam vero, &

per

per urinarias semitas evocantur. Ceterum quibuscumque hæc simul eveniunt, hi quamprimum ægritudine sublevantur.

Art. 427. Quidam utique sunt, quibus magna vis puris in pulmone procreatur: aut ex pleuritide fit permutatio; si majus bonum suboritur. Quodsi ad intestina aut vesicam ex lateris morbo sanies derivata sit, tunc quidem continuo a pulmonis vomica liberantur; sed diuturnum ulcus, quod demum sanescit, in latere patiuntur. Quibus vero in pulmonem pus irrumpit: nonnulli ob subitanæ, & copiosæ effusionem, & rejiciendi infirmitatem suffocantur; At quicumque suffocationis periculum subterfugiant, ii longo tempore pulmonis ulcere cruciantur, & in phthisin prolabuntur.

Suppuratione accedente.

Art. 428. Pulmonariæ seu peripneumonix curatio a sectione venæ in cubito incipienda est, siue utrinque a dextra videlicet ac leva manu, non tamen usque ad animi deliquium. Si paulum respiraverit æger, tunc suppressendus sanguis est, ac denuo postea mittendus. Opus est autem humores, & flatus post venæ sectionem deorsum versus trahere nitro, melle, ruta, resina terebinthi liquidam sedem obtinendo: sed missionis sanguinis loco, si quod majus impedimentum sit, acrem succum per clysterem in sedem immittito: puta salem cum nitro, aut terebinthi resinam cum melle. Item cucurbitæ sylvestris carnes interiores in aqua excoctæ conveniunt. Præterea inanes cucurbitulæ ægregie faciunt, si ærgi dorso præcordiisque ubique adhibeantur; nam si ad quamcumque partem corporis humores distrahantur, & spiritus ad extrema evocentur, quibus pulmo opprimitur aliquod mali solamen invenies. Ejusmodi item medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpirandum

Cura.

dum attenuent lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant. Propinetur quidem celeriter juvandi causa nitrum cum hyssopi decocto, aut muria cum aceto, & melle, aut sinapi humidum cum mulsis: singulis autem iridis radicem, & piper inspergere auso bene cedit: item hæc arida cribrato, & cum melle exhibeto. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale contegatur. Optima inunctio est ea quæ ex adarce fit. Sinapi etiam aridum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa humores, & calor, & spiritus foras educendi sunt. Huic rei opitulatur acrium olfactus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti nisi morbus cedat de hominis valetudine actum est.

Cœlii Aureliani sententia.

Peripneumonia vera descriptio.

Art. 429. Peripneumoniam (uti plerisque alios morbos) optime descripsit *Cœlius Aurelianus*. Adest, inquit, febris acuta, gravedo thoracis, & sensus laborantium quadam difficultate laterum atque mediarum mammarum, decubitus supinus atque paulò erectior, supra latus jacendi difficultas, vultus rubor tanquam florens, oculorum splendor; sequitur anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta ac biliosa vel fumosa jactans sputa, pleuriticorum fulviora vel spumosiora, spiratio difficilis, desiderium frigidi atque plurimi aeris haustu rapiendi, frigidi potus appetitio, os siccum, lingua aspera, ac primum subalbida, dehinc rubra, pulsus vehemens & celer, & anxietas, jactatio, vigiliæ juges, ingemens atque turbulentus somnus; aucto morbo spiritus difficillimè trahitur cum sibilatu; sequitur colli ac vultus inflatio, oculorum immobilitas, visus nubilosus,

sus, mentis alienatio, articulorum frigidus torpor cum livore, lingua crassior, sudor superiorum partium, pulsus latens aut formicans; postremo pectoris resonans stridor. (En accurata morbi descriptio, *erubescant moderni.*) „ In Peripneumonia hæc adsunt (*inquit Hippocrates de humoribus*) febris vehemens, crebra & calida respiratio, anxietudo, virium prostratio, & corporis jactatio, doloresque ad omoplatam, tam, claviculam & mammas, pondusque in pectore, atque delirium.

*Hippo-
cratis
descri-
ptio pe-
ripneu-
monia.*

Art. 430. Adhibenda est *phlebotomia*; potui ordinario danda est *aqua calida*, item cibus forbilis & tenuis; conducunt eclegmata ex *lini semine, fenugr. nucelis & melle decoct. & ovorum vitellis confect.*

Sydenhami sententia.

Art. 431. Temperamento sanguineo præditos præ reliquis Pleuritis aggreditur cum rigore, deinde calore, siti, &c. Elapsis paucis horis (licet aliquando multo serius) æger vehementi dolore punctorio in latere circa costas corripitur; qui nunc versus omoplatas, nunc versus spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectoris se propagat; tussi etiam crebra affligitur: in initio materia pauca, & tenuis ejicitur sanguineis intermixta particulis, postea copiosior & magis concocta sanguine etiam permixta; aliquando ad expectorationem copiosiore non pervenit; febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore; & pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; alvus nunc nimis adstricta, nunc soluta.

*dis de-
scriptio.*

Meden-
di me-
rhodus.

Art. 432. Est ubi *venesectione* omissa æger ne-
tussire quidem valeat, sed immani dyspnœa la-
borans suffocatur; interdum ad apostema res re-
dit, quod *empyema* dicitur; per accidens (viz. ex
usu medicamentorum calidorum) aliis febribus.
Pleuritis interdum supervenit ex precipitatione
materiæ febrilis in Pleuram. *Venesectio* repetenda
est ad 3^{iam} 4^{tamve} vicem, si sit indicatio; in a-
dultis vix sanatur minori quam 40. circiter un-
ciarum sanguinis impensa. Ægere lecto quoti-
die eximatur ad horas aliquot, prout vires sua-
serint, quod multum confert ad curationem.

Perip-
neumo-
nia no-
tha de-
scriptio.

Art. 433. Peripneumoniæ nothæ insultu pri-
mo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu
quolibet vertiginosus est, rubent & inflamman-
tur genæ oculique, tussit, & inter tussendum
admodum dolet caput, ad vomitum proclivis est,
urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleu-
ricorum similis; adest anhelatio, & dolor totius
thoracis, & pulmonum coarctatio. Ab *asthmate*
siccò plane distinguitur, quod in isto nusquam
comparent febris indicia, in hac manifesto se
produnt, licet minora longe & magis obscura,
quam in *Peripneumonia vera*.

Cura.

Art. 434. Curatio *venesectione*, *remediis pe-
toralibus* & *dieta refrigerante* perficitur. „ *Mi-
stura expectorans Fullerii*, vel *Syr. e Peto Batean.*
„ hic quandoque locum habere potest.

Boerhaavii sententia.

Diffe-
rentia
inter ve-
ram &
spuriam
Pleuri-
tim.

Art. 435. Pleuritis aggreditur nullam non
partem integumentorum interni thoracis, pleu-
ræ, scilicet vel mediastini; ideoque dolor pun-
ctorius in quamlibet partem thoracis incidere
potest, sed frequentius latera obsidere solet, at-
que hoc febre conjuncta *veram* efficit *pleuritima*;
si ve-

si verò altius intercostales musculi & his superiora laborant, *spuria* appellatur.

Art. 436. In Pleuritide vera sanguis mitti debet copiose quam mature per magnum vulnus, repetique debet pro ratione symptomatum urgentium; crusta alba absens *sanguinem mittendi finem* definit. Externe conveniunt *fotus, linimenta, &c.* Interne *diluentia, resolventia, refrigerantia, dolorem lenientia*; omnia calide & magna copia forbenda sunt. Interdum locus inflammatus ad *suppurationem* vergit, quod scitur ex pertinacia doloris, febris, &c. ultra quartum diem; *abscessum* jam fieri cognoscitur ex horrore sæpe recurrente, remissione doloris, anhelatione, decubitu in unum tantum (i. e. in affectum) latus tolerabili. Rupto abscessu pus stillat in cavā pectoris, & incrementum capit ex ulcere depulente, unde *Empyema*, de quo postea. Interdum vero locus affectus evadit *scirrhus* cum pulmonis & pleuræ adhæsiōe, unde *asthma & tussicula sicca*, malum immedicabile, nisi quod forsā aliquid levaminis a labore & equitatione multa possit recipere. Interdum loca inflammata *gangrænesunt*, unde mors cita subsequitur; *gangrenam* inceptam esse scitur ex delirio, livido thoracis colore, sputo subbilioso, doloris sine remissione, &c.

Art. 437. Peripneumonia est inflammatio pulmonis totius vel unius lobi; prior immedicabilis merito censetur ob magnitudinem morbi, altera medelam quandoque admittit; eodem modo ac iisdem remediis tractanda est ac *Pleuritis*, eundemque ut plurimum habet eventum. Si non resolvatur, *abscessum vomicamve* format intra quatuordecim dies, quod fieri ostenditur ex horripilationibus, doloris remissione, pulsus debilitate, manentibus adhuc dyspnœa, siti, febricula ve-

*Pleuritis
dis vera
Curatio.*

*Peripneumonia typus
& cura.*

spertina, &c. Exinde sequitur interdum suffocatio ex subita eruptione puris in asperam arteriam; interdum evacuatur ingenti sputo purulento; vel in thoracis cavitatem delabitur, unde *empyema*, *phthisis*, &c. postremo materies purulenta interdum intra pulmonales venulas resorbetur, & cruori miscetur, & in loca quædam alia deponitur, in hepar, lienem, cerebrum, &c. hinc fiunt *abscessus peripneumonici* ad aures, crura, vel hypochondria, ubi si cito evanescant, redeunte peripneumonia, casus est lethalis.

Peripneumonia nontha typus.

Art. 438. Peripneumonia notha oriri solet ex pituita lenta in toto sanguine nata, & sensim pulmones inficiente, donec in hunc morbum eat; senes, pituitosi, frigidi, catarrhosi, & gravedine laborantes huic morbo sunt obnoxiores: primò fallaci lenitate opprimit inopinantes, quippe levi fatigatione, debilitate, prostrato fere omni animi motu, anhelitu, oppressione pectoris incipiens, adeo leves motus excitat, ut vix caloris, febrisve indicia moneant periculi: mox vagæ horripilationes, leviusculi febris insultus adfunt; unde subito crescente anhelitu, & debilitate, mors; cujus in urina & pulsu vix ullum adfuit præsagium.

Curatio.

Art. 439. Curatur *sanguinis missione, clysmatibus, victu tenui, diluentibus, abstergentibus, & lenissime aperientibus* assiduo propinatis. „ Bre-
„ viter & raptim hæc pauca decerpfi, sed de
„ his affectibus præ omnibus quotcunque scri-
„ ptoribus consulendus est auctor præclarissi-
„ mus, & ad illius mentem consequendam uni-
„ ce incumbendum est, & summa impendenda
„ est opera.

Etmulleri sententia.

Art. 440. Observatum semper fuit in *Pleuritide* correptis, quod non solum *Pleura*, sed pul-
monis medietas simul in eodem latere inflammata
fuerit. Interdum quoque cum pulmone inflam-
matur mediastinum, duplicatura nempe *Pleuræ*
sub sternō, quæ nomine caret.

Art. 441. *Pleuritis* notha est dolor lateris pun-
ctorius, sed sine febre aut tussi; ægri ut pluri-
mum in latus oppositum potius quam morbosum
decumbere, queunt; contrarium observatur in
Pleuritide vera.

Art. 442. Si statim intra triduum sputum cru-
entum appareat brevem morbum indicat, sin-
vero ferius longum portendit. *Pleuritici* in-
tra 14. dies superne non repurgati *Empyici* fiunt
(inquit Hippocrates) & tales, si in 40. diebus
repurgentur a die ruptionis, liberantur; alio-
quin in *tabem* incidunt; in his affectibus sputo-
rum potius habenda est ratio, quam urinæ; *Pleu-
ritis* in principio leviter apparens & usque ad
5^{um} diem sic procedens, 6^{to} vero die exacer-
bata plerumque est lethalis.

Art. 443. In *Pleuritide benigna venesectio* si
non juvat, non nocet, in *maligna* tamen vix
locum habet, sed semper erit nociva. Ex omni-
bus auxiliis *sudorifera* primum obtinent lo-
cum, & præ reliquis *antimonium diaphoret.* „ An-
„ timonium diaphoreticum summe commenda-
„ tur in *Pleuritide* tum vera tum spuria: egre-
„ gie discutit humores congestos, acorem abfor-
„ bet, dolores demulcet, expectorationem pro-
„ movet, indicationibus fere omnibus satisfac-
„ cit. *Vvedelius*. Antimonium diaphoreticum
„ aeri aliquamdiu expositum vim emeticam ac-
„ quirit

„quirere nemo non novit, ideoque usus tem-
 „pore lavari jubeo. „Nobilissimum pectorale
 habemus *in liquiritia & passulis*; saccharata non
 conveniunt; *papaver Rhœas ejusque flores*, seu
 optimum specificum, in toto morbi decursu lo-
 cum habent; omnia calide sunt bibenda; *succus*
taraxaci seu dentis leonis vel decoctum ejus, ut
 & *eryngii*, laudantur, item *cherasol*. Succus *ra-*
phani recens express. expectorationem mirabiliter
 promovet. Ad dolorem lateris externe commen-
 datur *stercus gallin. cum ol. cham.*, „ut & sequens
 „cataplasma, *℥. alb. porri in sartagine cum q. s.*
 „*ol. cham. frixi ℥ij. furfur. frument. m. j. facum vin.*
 „*alb. ℥iiij. vel q. s. m.* convenit etiam infus. seq.
 „intus sumptum; *℥. Stercor. equi non castrat.*
 „*℥vj. vin. alb. ℥iss. aq. flor. spin. alb. ℥ss. infund.*
 „*clausæ & calide per hor. dimid. deinde coletur cum*
 „*expressione forti, colatura cum alb. ovor. s. a. cla-*
 „*rificetur, & add. aq. theriacal. stillat. ℥iv. Syr.*
 „*balsam. ℥iiij. m.*

Baglivii Sententia.

Signum *Art. 444.* Durities pulsus est signum fere in-
patho- fallibile omnium Pleuritidum, quamvis reliqua
gnomo- signa non adsint; durus enim pulsus omnium in-
nicum flammationum partes nerveas vel membraneas
Pleuri- obsidentium est comes indivulsus. „Pleuritis ve-
tidis. „ra (inquit Chesneau) cognoscenda est impri-
 „mis a pulsu duro. Nonnulli affirmant pulsum
 „esse ferratilem, sed ingenue fateor me nun-
 „quam ferratilitatem illam deprehendere potuif-
 „se; ideoque parvi pendo tanquam rem fictitiam
 „& imaginariam, contentus duritie pulsus, quæ
 „sufficit ad Pleuritidem dignoscendam. „Pleu-
Pleuri- ritides frequenter sunt *occultæ*, quia indolentes,
ritides oc- unde quandoque errores in praxi; fac itaque æ-
cultæ. grum

grum in dextrum vel sinistrum latus decumbat, decumbenti impera, ut fortiter respiret, & tussiat, & tunc pete ab illo, an dolorem aut gravedinem persentiat, quod si affirmet, res manifesta est; hoc modo plures *Pleuritides* deteximus magno ægrotantium commodo.

Art. 445. Omnis prognosis a bona vel mala *Prognosis* respiratione maxime petenda est. Perperam agitur cum *Pleuriticis*, qui nihil expuunt, nisi copiose effluant urinæ. Omnes *Pleuriticcs* sanatos vidimus, quibus in interiora auris dolor & exinde suppuratio supervenerunt. Crusta alba non apparens in superficie missi sanguinis est pessimum signum. *Pleuritides recidivantes* omnes fere sunt lethales (ex *Hippocrate.*).

Art. 446. Quando in *Pleuritide* viget indicatio dissolvendi, *camphora* præ reliquis opus absolvit, *Regula de venæ* (præsertim in *Pleuritide epidemica & maligna.*) *sectione,* Si sputum antea suppressum superveniat, & sit *etc.* flavorubescens nunquam imperato *venasectionem*; nam post *venasectionem* sputum denuo supprime-
tur & æger morietur. Quocunque die, secundo scilicet, aut 4^o 5^o 7^{mo} &c. ante vel post missionem sanguinis spirandi difficultas, & difficultas pariter excreandi sputi pleuritico superveniant: statim duo *vesicantia* tibiis admovenda sunt, juxta illud *Hippocratis*; in *pulmonicis* quicunque *tumores* sunt ad crura optimi sunt, *etc.* Post apposita *vesicantia* observavi expectorationem statim promoveri, spirandi difficultatem imminui, & alvi fluxum, si adesset, sciliciter fisci, & ægrum sanari.

Vuillisi sententia.

Art. 447. Opinari decet *Peripneumoniam*, & *Pleuritidem* affectus esse modo singulares & separa-

Horum affectuum complicatio.

paratos, modo connatos & primitus coexistentes, & modo invicem successivos aut succedaneos esse. *Peripneumonia* non tantum *Pleuritidi*, sed frequenter etiam *angina*, & aliis interdum affectibus succedit.

Pleuritidis e-ventus. Art. 448. De *Pleuritico* expectatur, vel ut morbus statim solvatur, partim crebra & libera *venesectione*, & partim *sudore critico* die 4^{to}, vel 8^{to} exorto, vel ut, his non rite succedentibus, diutius protrahatur; & tunc sæpissime huic morbo *Peripneumonia* aut *Empyema* vel utrique affectus superveniunt, periculi pleni, qui ægrum e medio ut plurimum tollunt, aut in *phthisin* ægre sanabilem aut exitialem præcipitant.

Cucurbitica. Art. 449. *Riverius* & *Zacutus Lusitanus* exempla notabilia adducunt curationis *Pleuritidis* per *cucurbitas* cum scarificatione loco dolenti adhibitas. Pro usu externo in linimentis utiliter addatur *album græcum*.

Verne sententia.

Art. 450. Post veræ pleuritidis & propriæ tradita signa reliquum est, ut cæterarum inflammationum, & notharum *Pleuritidum* differentias ac distinctivas regulas præbeamus: & primo

Pleuritidis dorsalis descriptio. Art. 451. *Pleuritis* plerumque fit, quando ad sinistrum latus circa mammas præsertim, & sub iisdem pleura inflammatur, ibique dolor percipitur, etsi tussiente ægro, hic ad scapulas vel prope eas quandoque respondet; sæpe vero morbus juxta diversum inflammationis situm aliter distinguitur. Præ ceteris notabilis est *Pleuritis*

Ejus l. species. illa cujus lib. IV. de Morbos. affect. Hippocr. hæc signa præbet. *Pleuritis ad dorsum* in tantum ab aliis differt, quod dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & acervatim respirat: statim au-

tem sputa pauca, & corpus delaxatur; tertia aut quarta die saniem mingit subcruentam. Moritur autem maxime quarta die, sin minus septima. Quæ Pleuritis igitur gravissima est, & penes Auctorem ruinosa; tamen per id quod scio, hanc veluti duram coecamque fyrtim tumidiora ingenia præterlabuntur, & declinant; ac tamquam non foret, nec minime tangunt. Hoc Pleuritidis genus nos quoque Hippocrate docente observavimus, ejusque verba notando; quod dolor sit velut ex plaga. Dolor enim in dorso accedit non pungitivus, & acutus, sed remissior & obscurus, ut mihi percontanti respondebant ægroti, eum veluti ex profundo spinæ emanare.

Art. 452. Qui dolor in dorso interdum acutus est, quandoque valde acutus ut ibidem ille II. Species. subjungit: *Ceterum quibusdam Pleuriticis saliva quidem pura est, mictio autem cruenta, velut serosa a carnibus assatis sanies, dolores vero acuti per spinam ad pectus, & ad inguen tendunt. Et paulo inferius: quibus autem statim sputa varia, & dolores valde acuti, hi tertia die moriuntur.*

Art. 453. Sed quandoque non tam dolor quam rubor inflammatorius ad externa prorumpit, nam III. Species. ex eodemmet Hippocrate: *At si alicui in his Pleuritidibus contingat dorsum rubescere, & humeros calefcere, & inter desidendum gravari, & venter exturbetur egestionem cum virore pallida, ac valde graveolenti, hic propter ventris egestionem vigesima prima die moritur.*

Art. 454. Unde tres pleuritidum dorsalium Locus species ex eodem Hippocrate cognoscuntur, quarum prior cum dolore veluti ex plaga cæteris affectus que symptomatibus descripta potius est Media- in singulis. lis. in- flammatio, ea præsertim parte, quæ dorsum respicit; altera cum doloribus acutis per spinam ad pectus, & ad inguina tendentibus ab

inflammatione tunicarum oritur, quæ nervos intercostales e spina dorſi egredientes tegunt, unde qui ad ultimum ventrem ducunt ex eadem carina cum promanent, ad inguina quoque dolores tendunt; tertia demum neque pleuram, neque mediastinum, neque vaginam nervorum intercostalium inflammat sed musculos dorſi tantum respirationi ac motui dicatos, unde ex affectus diuturnitate, rubore, & forſan tumore musculos hos affici facile arguitur. Idcirco cum ægroti de dolore dorſi quærantur, non modo ejus intensiorem attente perpendo ejusque speciem; verum insuper spinam, humerofque observo si ullus tumor, aut rubor extra appareat; eos digitis premendo latentem, aut incipientem tumorem detegere non desino. Cujus generis videtur fuisse Pleuritis ex dorſo, qua laboravit, & mortuus est Hippostenes luctator V. Epid.

*Indica-
tio cura-
tiva.*

Art. 455. Observat autem Hippocrates pleuriticis ex dorſo venter si exturbetur, his propter ventris egestionem vigesima prima die mori. Nos vero fatemur, licet hoc plerumque his Pleuriticis accidat; tamen vero non semper, & ad hoc tempus protraheretur morbus, nisi vehementior alter complicaretur. Quare nec derremur, & supersedemus a sanguine mittendo cum fluxus aut diarrhœa adsit, quæ inflammationis effectus est, & non sedatur nisi sanguis mittatur, ut experti sumus, & Sydenham docet. Neque quæ nonnunquam supervenit diarrhœa repetendis jam dictis venæ sectionibus obicem ponit; quæ quidem ipsa hac methodo brevi sistetur, etiam non adhibitis medicamentis adstringentibus.

*Quid de
cucurbi-*

Art. 456. Cum vires consent ac morbi initio, & ubi præcipue febris essentialis potius appa-

pa-

pareat cucurbitulas scarificatas, ut quorundam *tulis* mos est, adhiberi denego, quia juxta Hipp. *venæ scarifi-*
tenuēs non trahunt de quocunque humore, & tras- *catis*
so. Ex his scarificationibus enim parum vel ni- *sentien-*
 nil utilitatis depromitur. Nec movet, quod qui- *dum.*
 dam fatentur, quod hæ cucurbitulæ scarificatæ
 applicantur, cum vires debiles sunt; quoniam in
 quibusdam Pleuriticis, & ut plurimum a nimio
 dolore, & magna tensione pulsus parvi fiunt,
 & obscurantur, viresque depressæ apparent. In
 quibus vero non adest virium resolutio, ac de-
 fectus, sed earum potius perturbatio ac confu-
 sio; imo ipsæ validiores sunt: idcirco in iis au-
 dacter mittendus sanguis, ut Morton, & Hip-
 pocrates monuit: & sæpissime in praxi observa-
 tur, quod depressi pulsus, quo magis sanguis
 effunditur, attollantur.

Pujati sententia.

Art. 457. Constitutione quadam vigente Pleu- *Pleuri-*
 ritides verminosas cl. huic Autori videre conti- *tidis*
 git: fallax hoc morbi genus alias ex observa- *vermi-*
 tione, inquit, mihi innotuerat, antequam li- *nosæ de-*
 berculum, quem de tali morbo Cl. Castelli a- *scriptio.*
 pud Forojulienses Medicus concinnavit, legis-
 sem. Cum ille itaque eo in opusculo satis ta-
 lium Pleuritidum tractationem absolverit, ad-
 agere mihi nunc non est animus; sed postquam
 animadverto Hippocrati quoque si non a ver-
 mibus, ex imo ventre Pleuritides innotuisse,
 contra quas sanguinis missionem prohibuit; ali-
 quot historiolas breviter subdam: ex quibus qui-
 dam, apud quos scio somnium esse Pleuritides
 a vermibus, tametsi Cl. Practicus Jonstonus tra-
 diderit, hos quandoque mera symptomata Pleu-
 ritica excitare; tandem aliquando sapere discant.

Ab Hippocrate adumbrata.

Art. 458. Hæc igitur in Coacis Magnus Magister posteris reliquit : *Dolores circa latus , in febribus consistentes , citra notas , venæ sectio læserit , sive cibum adversetur ager , sive hypochondrium sublime habuerit*. Fungus profecto necesse est , ut sit , quicumque in hunc Hipp. locum incidens , non noscat lateris dolorem ab imo ventre ; Cum absentia signorum (*citra notas*) quæ pectus idiopathice pati ostendunt ; & præsentia eorum quæ stomachum , atque intestina affecta demonstrant (*sive cibum adversetur ager , sive hypochondrium sublime habuerit*) clarissime laterum dolores per consensum ab abdomine fieri demonstrent , ob id non tam ad species dolorum , magnitudinem , aut durationem distinguendas , quam ad locum affectum determinandum , ab eo prolatum puto , in Aphorismis : *dolores laterum , pectoris , & aliarum partium , aut multum variant perdiscendum*. Quibus Doctissime subdit Tozzi in dicti aphorismi commentario : *Hippocrates Medicos consulere videtur , ut partem affectam in doloribus internoscere curent : nisi enim partes affectæ suis indicibus distinguantur , curatio haudquaquam prospere institui poterit*. Quia ut in re tanti momenti Hippocraticam solummodo optime mentem expromam : *Sape ex crapula , & cibis flatuosis , dolores procedere solent , & ad lumbos , & ad latera*.

[Signum ejus pathognomicum.

Art. 459. Sed quæ sunt notæ doloris pleuriticæ Idiopathicæ ex Hippocrate ? Ab hoc textu quisque discere poterit : *Si vero sub septo transverso fuerit dolor* (an septi positum optime norunt isti Helminthicarum Pleuritidum irrisores ?) *ad claviculam autem de se significationem non præbet* (putasse videtur imi ventris dolores ad jugulum non ascendere , quod tamen falsum esse ex observatione patet) *alvum mollire oportet , aut*

vera-

veratro nigro, aut peplio. Cum illud igitur abest signum ; quod pectus idiopathice pati Coe significabat ; non sanguinis missione , sed medicamento purgante dato Pleuritidi medebatur ; quia materia dolorem efficiens ita auferri e corpore poterat , quod utique fieri non potuisset si morbi causa intra sanguinem stabulasset: *quicumque vero ea, quæ inflammata sunt, statim in principio morborum medicamento solvere aggrediuntur; hi de intento quidem, ac inflammato nihil auferunt, non enim remittit affectio, quæ adhuc cruda est; quæ vero morbo resistunt, & sana sunt colliquefaciunt de vict. in acut. tex. 36.* Quod si dolor sub septo causam in sanguine habeat, non alvi ductione, sed sanguinis missione eam tollebat Hipp. *Precordia inflammata, non ex flatuum interceptione* (eu! quod summo iudicio eam causam excludit, quæ primas vias obsidet) *septi transversæ intensiones. solvi non possunt si quis medicamento purgare aggrediatur, nam vena sectio in talibus principalis est. Ibid.*

Art. 460. Ad utramque vero doloris causam *Cura.* & quæ in sanguine , & quæ extra sanguinem hæret, respiciens alibi scripsit, dolores sub septo & a purgatione, & a venæ sectione solvi : *& si circa spuriam costam graves dolores fiunt, his solutis sit venæ sectio, & purgatio deorsum de iudicat. tex. 11.* Venæ sectio si a sanguine, purgatio vero si materia imi ventris pectoris partes doleant, natura monstrante viam Medico : *quibus in febre dolore lateris oboriente multa aquosa, & biliosa egerit, hi allevantur. Coac. sect. 11. vers. 73.* Forte alvi subductio, quæ sputum suppressit, coctionem tollit, idiopathicamque pleuritidem adeo exarcebat, ut ab hac exerciti lethaliter decumbant, doloris lateris a causa, quæ intra sanguinem agit, auxilio esse poterit?

terit? Si quidam Hipp. legerent, haud ita de humano sanguine, quem prodige, amenterque profundunt, male mererentur; morbisque minime ex titulo, aut fallaci hypothefi, sed ex observatione, atque ab ea, quæ ab observatis pendet, ratione mederentur. At ipsi viderint.

Cum sciamus stimulum alicubi hærentem partes longinquas in crispationem adigere, easque dolore mulctare, operæ pretium minime duco hypotheticum materię decubitum ad partem dolentem in medium adducere. Quod lumbrici in intestinis, stomachoque stabulantes efficiunt, cruditas quoque vitiosa ventriculum, ac intestina obsidens efficere poterit.

Trilleri sententia.

Phlebotomia in Pituita quid præstandum. Art. 461. Statim ergo post primarium illud Herculeum, & divinum plane remedium, post primam, inquam, largam venæ sectionem pleuriticis mixturam sic dictam pectoralem, resolventem, & anticausticam simul singulis horis cochleari mensura sumendam, propinamus: nempe ex aquis destillatis Veronicæ, Tussilaginis, Pulmonariæ, Hyssopi, Salviæ, Fœniculi, aut aliis similis virtutis, cum lapid. cancror. sive conchis, Mandibulis Lucii piscis, Antimon. diaphor. Lapide Prunellæ, & Extracto corticis Cascarillæ aquoso, & Oxymellite simplici, vel Syrup. de Alth. Fernelii, Erysim. Lobelii, jujubarum, & similibus, quo ipso æstus temperari, respirationem allevari, tussim mitigari, & pectoris expurgationem sensim promoveri crebro animadvertimus.

Oxymel ad pleuritides præstantissimum. Art. 462. Deinde siti nimium urgente, quæ miseros ægros ordinarie vehementer excruciat, tenuem ex hordeo ptisanam, cum oxymellite, vel

vel simplici melle, & tantillo nitri paratam calide crebro ingerendam offerimus; probe gnari, quam eximii usus in hoc morbo, sit ptisana hordeacea. Nihil vero melle, & aceto fortius simulque mitius sanguinis coagulationes resolvit, putredini resistit, humorum lentorem attenuat, & incidit, gangrænamque arcet divinis his binis remediis: adeo ut nemo pleuritici feliciter curaturus post venæ sectionem oxymelite carere possit.

Art. 463. Singulis porro, aut alternis nimirum diebus, quantum nempe ægroti vires permittunt, & acrior vis morbi urget, sub vesperam, quando dolores laterales, fere semper magis ingravescere consueverunt, clystma sat larga copia tepide injiciendum curo, sed non nisi ex aqua hordei, & oxymelite, sive melle puro, cum una, vel duabus drachmis nitri, aut lapid. prunell. aut arcani denique duplicati paratum, aut more Sydenhami, ex solo lacte cum saccharo præparatum; quo ipso vis flammæ intus furentis infringitur, acrimonia temperatur, & blandus plerumque somnus provocatur.

*Clysteres
juvant.*

Art. 464. Maximi quoque sunt usus topica, & exterius adhibita, quibus calefactis dolentis lateris regio perpetim est fovenda, fricanda, & inungenda. Simplicissimum hinc & optimum est, ol. amygdal. dulc. vel pro pauperibus solum ol. lini; ipsos quoque calidos cineres vino resperfos dolentibus lateribus, impositos ægregium usum præstare innotuit. Possunt & alia nonnihil operosiora unguenta, & linimenta commode adhiberi, ut unguentum antipleuritic. Mynsichti, Barbette, & quæ ex suo penu in notis adjecit Dekers, item aliud Sydenhami, & Hofmanni. Mihi tamen, ut nihil celem, maximum semper usum præstitit linimentum a Boe-

*Topica
& ex-
terna.*

rhaavio fere commendatum, nempe ex semina-
cia facchari Saturni, uncia una aceti rutacei,
vel simplicis, & binis unciis ol. infusi rosarum,
vel lilior. albor. paratum. Hæc vero omnia ca-
lidissime, quantum fieri potest, sunt applican-
da; tumque pannis laneis calidis, vel regulis
calefactis, si ferre quidem potest æger, locus
dolens est contegendus, ut calor eo diutius du-
ret. Illud tamen hic in genere monendum,
sicca fomenta majore cum successu, & efficacia
adhiberi in pleuritide rheumatica, humida, pi-
tuitosa, qua senes plerumque infestantur; quam
quidem in acuta, & a sanguinis inflammatione
progenerata. In hac enim fomenta potius hu-
mida, pingua, & oleosa convenire, doloresque
acerbissimos blandissime ex his ipsis consopiri,
fida experientia nobis compertum pluries fuit.

*Quando
vescica-
toria ap-
plicari
debent.*

Art. 465. Ubi vero repetitis jam aliquoties
venæ sectionibus restat adhuc insignis spirandi
difficultas, vel magis exaugetur, tum duo ve-
scicatoria, vel femoribus, vel tibiis ex Baglivii
consilio, applicanda, derivationis causa. Tum
enim sputorum fluxum statim promoveri, spi-
randi molestiam levare, & alvi quoque proflu-
vium, si affuerit, feliciter sisti, bis, aut ter post
Baglivium observavimus, licet non semper ex
voto successerit, ut ingenue fatear. Eidem quo-
que scopo inserviunt cucurbitulæ siccæ ex men-
te Hippocratis, & qui eum jure meritoque se-
quuntur.

*Expecto-
rancia.*

Art. 466. Quando vero pectoris purificatio,
naturæ beneficio occipit, prodeuntibus jam spu-
tis coctis, maturis, pinguibus, & subflavis,
tum ea arte nonnihil adjuvanda, ut linctu aut
Eclegmate ex ol. amygdal. dulcium recenter ex-
presso, syrup. viol. jujubin. capill. vener. de erysi-
mo Lobel. & similibus, qualia describunt Syden-
ham,

ham, Hoffmannus, & alii. Vel infusum Theiforme ex herb. veron. tussilag. pulmonar. hyssop. capil. vener. ruta muraria, cum melle frequenter calide hauriendum summopere prodest.

Art. 467. Quod denique ad diætam, & stri- *Quoad diætam.*
ctiorem vivendi legem attinet, abstinendi sunt ægri vigente adhuc morbo ab omni carne, & victu crassiore, & pinguiore; tenuia contra juscula carnis vitulinæ, aut gallinæ item uvæ passæ minores, & majores, pruna sylvestria, damascena, cerasa, & similia subacida, & euppta ipsis sunt concedenda: conducunt quoque, vel maxime herbæ molles, diluentes, & sapone nativo præditæ: ut Lactuca, Endivia, Acetosa, Beta, Brassica, Spinachia, Cichoreum, similesque radices: ut Sonchi, Scorzonæræ, Taraxaci, juri vitulino, aut agnino incoctæ, ut pulchre monet Boerhaavius; Conclave tepidum, immo subfrigidum potius sit, quam calidum; nec stragulis, & culcitris nimium obruendi sunt ægroti, æstus enim, & difficultas spirandi eo ipso augetur, & sudor præter rationem prolicitur. Inde fenestræ frequentius per diem nonnihil aperiendæ súdo in primis, & clementiore coelo, quo aer purior, salubrior, & frigidior paullo intromittatur, ne miseri ægroti putrida sua atmosphæra circumfusi, sordidas exhalationes continuo inspirando, & resorbendo suffocentur tandem, & in vivum quasi cadaver commutentur. Quod & in universum in omnibus morbis acutis, inflammatoriis, & exanthematicis, ut morbillis, variolis, petechiis &c. sedulo observandum esse post Hipp. Aretæum, Celsum, & alios veteres, præclare docent Sydenham, Baglivius, Boerhaavius, Hoffmannus, & alii magni viri.

Art. 468. Procedentibus sic cunctis in dies in *Alvus finito*
me-

morbo
purgan-
da.

melius, & lætioris sanitatis, certa spe resulgen-
te post decimum quintum, aut vicesimum diem,
leni Cathartico ex Cassia, Manna, vel Rheo barb.
cum cremor. tartar. aut tartaro solubil. similibus-
que alvus ægrotorum est ducenda, ut sic, si
quid vitiosi adhuc humoris crassioris restet, e
primis viis, & glandulis intestinorum commodè
egeri possit. Respiciendum tamen est semper ad
ægrotorum vires, & durum necessitatis impe-
rium.

Observa-
tio de
phleboto-
mia.

Art. 469. Aliqua verò adhuc adjicienda re-
stant de questione quoties nempe incidenda sit
vena? Toties nimirum respondemus eam ape-
riri debere, quoties dura vis morbi eam impe-
rabit, & ægroti vires permittent, quod ex res-
piratione præsertim, & pulsu conjicere licet.
Ter tamen aut ad summum quater, venam se-
cuisse nobis suffecit, ut ex multiplici experien-
tia consistit, si nempe prima, & secunda vice
sanguis sat larga copia fuit eductus.

Meadii Sententia.

Inter to-
pica ve-
scicato-
rium
commen-
datur.

Art. 470. In pleuritide detracto primum quan-
tum opus est sanguine; ad tussim levandam, o-
lei ex seminibus lini recens expressi potiones;
ad refrigerandum nitrum; ad sanguinem in ca-
naliculis suis hærentem solvendum, sanguis hir-
ci sylvestris, saliaque volatilia; denique ad fo-
ras extrahendum peccantem humorem, empla-
strum vescicatorium lateri affecto impositum in-
signiter profunt. Et externi quidem hujus re-
medii commodum, quod a sagacissimo Majer-
nio primum edoctus fui, multis jam annis com-
pertum habeo. Sub finem autem morbi, remit-
tente jam inflammatione, alvum laxare oportet.

Art.

Art. 471. Illud autem non est prætereundum; *Et casus fieri nimirum interdum, ut in hoc morbo, & sticium magis etiam in peripneumonia, inflammata pri- inuflum.* mum, inde & pleuræ adhærente extima pulmonis membrana, eveniat abscessus purulentus, quem empyema vocant. Hoc in casu si foras se ostenderit humor, imponendum est medicamentum causticum, quo emittatur. Ulcus autem per totam vitam apertum fervare oportet. Vidi enim cum, eo sanata, & materiæ purulentæ effluxu prohibito, brevi moreretur æger.

Barbeyraci sententia.

Art. 472. Definitio Pleuritidis est; quod inflammatio sit pleuræ, vel membranæ costas succingentis cum lateris dolore acuto, & pungente, difficili respiratione, & febre acuta continua. *Pleuritidis definitio.*

Art. 473. Pleuritis ferme nunquam corripit, quin simul peripneumonia conjungatur, seu ut melius dicam, ejus comes est, atque effectus. Aliquando etiam observatur binas has ægritudines simul produci. Occurrunt profecto ægrotantes, qui eodem tempore forti, & acuto lateris dolore atque extrema viscerum exardescencia conqueruntur; interdum etiam evenit Pleuritidem & Peripneumoniam alternatim commutari; quia nonnulli occurrunt, qui ab initio usque nihil nisi acutissimum pungitivum dolorem ad latus experiuntur, tum hoc ipso dolore evanescente, vel biduo post ingenti oppressione vexati, & interno ardore quasi exusti remanent. Alii itidem dantur qui eodem momento ardore pulmonum, & incredibili oppressione teneri, conqueruntur, sed paulo post gravioribus symptomatibus evanescentibus dolore laterum

Ejus affinitas cum peripneumonia.

sumniopere acuto fortiter gravantur, cujus causam transpositionem esse de loco in locum morbosæ materiæ facile perspicimus.

Pleuresis causa. Art. 474. Remotiores causæ, & evidentiores Pleuresis ex omnes esse possunt, quæ sanguinis massam inflammant: ut calor excedens, contractio, & contractio repentina pororum ob extremum frigus, liquorum ardentium abusus, omniaque exercitia immodica, atque alia ejusdem generis.

Pleuritis notha spuria. Art. 475. Altera Pleuritidis species datur, quæ *notha*, vel *spuria* dicitur musculis intercostalibus externis, vel inter costarum intervalla positis insistens, quæ vel a flatuositate, vel ab acri humore ibidem congesto producitur. Hujusmodi vero Pleuresis a vera tribus modis distinguitur. 1°. Quod in ipsis intercostalibus externis musculis sedem suam habet, quando alia sedem habet in musculis internis. 2°. Quod in spuria ægri impatienter super latus affectum decumbunt, nam in hac situatione externi intercostales muscoli inflammati inopportune comprimuntur, contra in vera ægri in latus affectum volupe decumbunt, in alterum difficillime; quia pars inflammata pulmonum pondere ducta distrahitur. 3°. Quod veram Pleuritidem graviora laboriosioraque symptomata comitantur, quæ in spuria nec tanta sunt, nec adeo intolerabilia.

Observatio necessaria. Art. 476. Ceterum, ne in errorem inducamur, diligenter observandum est: lateris dolorem satis vivum aliquando excitari, pleuritico similem, qui perperam pro hujus morbi adventientis symptomate arriperetur. Etenim facillime accidit in scorbuticis quibusdam, aliisque qui nervosis affectionibus subjiciuntur, acerrimum amorem cum acerbissimo dolore in pleuram adve-

advenire , vel intra intercostales musculos congregari , adeo ut ibidem hærendo intolerabiles dolores excitet. Hujusmodi affectio tamen optime a Pleuritide distinguitur , quia nulla febre conjungitur, pulsu satis laudabili, & regulato persistente , viribus nullo modo labefactatis atque dolore fixo quidem non existente, sed pro ratione qua humor hinc inde vagatur , modo hanc, modo illam partem subsultim divexante.

Art. 477. Quoad veræ Pleuritidis prognosin *Hippocrates* plurimas habet observationes salubrem, vel malum exitum hujus morbi indicantes; sed diffusum æque ac laboriosum esset, easdem omnes hic commemorare. Quod utilius dici potest, illud est, ut si frequentes, & copiosæ phlebotomiæ cito hunc morbum non solvant, & criticis evacuationibus per sudorem, per hæmorrhagias, per vomitus biliosos, vel per diarrhæas a principio usque evenientibus ægri non sanescat, sæpissime in *Empyema* vel in *Phthisin* morbum desinere, unde pessima prognosis oritur.

Empyema enim generatur, quia sanguine in Pleura stagnante, nec sese dissolvendi vias re-
Prognosis.
 periente, corruptione is inducta putrescit, quare pus viam per hanc membranam sibi aperiente in pectoris cavitatem dimanat. Phthisis autem fit, quando pus ipsorum pulmonum substantiam erodit, & acredine qua imbuitur, ulcus ibidem producit. Idcirco quando *Pleuritici* excreatus sanguineos, vel purulentos edunt, tuto affirmari potest, ulcus in eorum pulmonibus exortum esse. Ut vero id frequentissime evenit iis, qui Pleuritide exercentur, hinc non inique superius affirmavimus, morbum hunc ferme semper cum *Peripneumonia* sociari.

Art. 478. Methodus qua curari debet *Pleuritis*,
Indicationes curative.

et, binas sibi vindicat indicationes. Prior a conjuncta causa desumitur, quæ in sanguine per pleuram stagnante, ubi inflammationem facit, consistit; altera ab antecedente Pleuritidis causa mutuatur, quæ nihil aliud est, quam immodica sanguinis effervescentia, in pleuræ læsionem conspirans.

Phlebotomia.

Art. 479. Sanguinis emissio utrique indicationi satisfacit, quia præterquam, quod partem quamdam fermenti a tota sanguinis massa adimit, calorem etiam imminuendo impedit quin novæ accumulationes in pleura contingant, & evacuandis insuper vasibus opitulatur, adeo ut qui his partibus sanguis inerat, a subsequente in gyrum acto facile abripi possit, sicque nativum omnibus liquidis motum conservare ac restituere.

Alia remedia.

Art. 480. Post emissum sanguinem levis quædam ac blanda purgatio institui potest; & Julepia, emulsiones, & clysmata optimos effectus præstant, quorum duo priora sanguinis massam refrigerando ejus iminuunt agitationem, alterum intestina abstergendo, eadem ab impuritatibus, crassioribus fœcibus, & a sanguiniscrementis ibidem congestis liberat. Si enim diutius morarentur excrementa, metus esset, ne eorum pars a venis absorpta sanguinem subeundo nova mala excitaret. Clysteres igitur sequenti modo concinnari possunt.

Clyster. ℞. Fol. malv. betæ, parietar. lactuce ana man. j. sem. quat. frig. maj. unc. j. sem. bord. integr. man. sem flor. chamomell. melilot. pug. j. aq. font. q.s. ebull. simul & colat. unc. xij. adde elect. catholic. unc. j. mel. violat. unc. ij. f. clyster post biduum reiterandus.

Quousque morbus, & febris persistunt, cavendum ne ægris alimenta solidiora exhibeantur,

tur, sed jusculiseos nutrito quovis trihorio propinandis. Pro potu porriges Ptisanam ex hor-
deo, & passulis ficcis, addita glycyrrhiza aqua pura confectam. *Ptisana.*

Emulsiones quibus regulariter frui possunt mane, & vespere quotidie, si opus, sequenti ratione parari poterunt.

℥. Amygdal. dulcium mundat. num. xvj. Semin. 4. frig. major. 3vj. Semin. lactuc. papav. alb. ana 3 sem. contus. in mortar. marmor. sensim affundendo de ptisana supra descripta, atque tantundem aq. destill. pap. rhead. Filtret. liquor bifariam dividendus, cujus una pars dabitur agro mane, altera vespere, postquam addideris, singulis Syrup. capill. vener. vel tussilag. unc. j. diacod. ʒiij. vel laudan. gr. j. in parte vespertina.

Si pro emulsione Julapium exhibere lubet, sequens optime facit. ℥. Aq. destill. pap. rhead. *Julapium.*
lil. ana unc. iiij. Syrup. violat. unc. j. Syrup. papav. alb. ʒiij. misce pro unica dosi.

Art. 481. Nulla quidem difficultas objici debet, quoad usum narcoticorum non minus in principio ac in progressu morbi, quamvis cum peripneumonia conjunctus adsit, siquidem non obstante quod VVillis eadem damnet, & cum eo plures alii practici, observatur tamen optimos edere effectus: maxime in iis, qui vigiliis & deliramentis vexantur, æque ac in iis, qui vehementiores patiuntur dolores. VVillis, alii-
Observationes de narcoticorum usu.
que usum contemnunt, quod sibi imaginantur, excreatus a narcoticis inhiberi, ac expectorationem difficiliorem reddi. Cum autem ab iisdem non sit animadversum nulla aptiora extare remedia ad cohibendum defluxionum impetum ipso Laudano, non cognoverunt ejus usu id moliri, quod crebris phlebotomiis aliisque remediis in hoc morbo adhiberi solitis aliquando fru-

frustra intentatur . Ceterum prætereunda non est consideratio sapissime a pulmonum debilitate expectorationem materiæ purulentæ inhiberi; atque hinc narcotica, quæ huic debilitati optime opitulantur , spirituum animalium generationi favendo, somnum conciliando, vires elanguentes ad munera expectorationis obeunda felicissime erigere . Sed cum nihil noxius sit ægrotantibus, quam noctes insomnes transigere, unde calefacto immodice sanguine spiritus discipantur, aliaque graviora incommoda gliscunt, hinc nihil utilius agi potest, quam mature omnia hæc mala exhibito narcotico declinare, quo dulcis ægro quies conciliatur, & sanguini necessaria refocillatio, quod equidem illud est duabus supradictis indicationibus propositum, ut perficeretur .

Conti-
nuatio
remedio-
rum .

Art. 482. Hæc omnia remedia eodem sane tempore usurpari possunt, videlicet : quo phlebotomatur æger injici possunt clysteres, atque exhiberi emulsiones, vel Julapia mane, & vespere, postea devenire licet ad lenes purgatiunculas, modo prius sexta, vel septima vice spatio trium, vel quatuor dierum vena pertusa fuerit, ut sic defluxionis progressu inhibito purgatiunculæ sequenti ratione utiliter institui possint .

Potio
purgans. ℞. Senn. orient. ℥iij. ros. pallid. parvum sal. prunell. vel crystal. mineral. ℥j. fol. cichor. lactuc. ana man. sem. aq. font. q. s. ebull. parum, dein colat. add. mann. syrup. ros. compos. ana unc. j. f. potio mane propinanda .

Altera. Vel ℞. Senn. ℥ij. sal. prunell. ℥j. infund. in jure carniū q. s. & colat. add. mann. unc. j. f. potio .

Vomito-
rii usus.

Si cum Pleuritide vel Peripneumonia sit conjuncta, atque simul pectus ægri plurimum gravatum adsit, nullus dubitandi locus remanet, quin

quin vini emetici ℥vj. vel uncia j. cum sennæ infusione ei adhibeatur. Hujusmodi autem medicatio in usum duci nequit, nisi a prudenti, & perito fatis Medico consularur.

Habito respectu temporis morbi singula huc usque recensita remedia in usum vocari possunt, & reiterari, in primis leves alvi purgationes, quas subinde usque ad perfectam sanationem adhibere præstabit.

Nec perperam interea factum erit, si lateri *Topica* affecto anodynum cataplasma admoveatur, quo dolore lenito aliquod ægro levamen concilietur, in primis si spuria Pleuritis adsit, musculique intercostales externi, æque ac interni afficiantur. Hoc vero casu, ut ferme semper evenit, si tumor aliquis externe prorumpat in eo ipso situ, ubi dolor urget, post reiteratas venæ sectiones cucurbita scarificata potest, atque mox inde cauterium excitari, ut exitus morbosæ materiæ tali arte expediatur. Post hæc vulnus eo modo tractabitur, quo alia hujusmodi tractari solent.

Art. 483. Peripneumonia inflammatio pulmonum est, cum febre acuta, tussi, & respiratione difficili. Præter hujusmodi pathognomonica signa hic morbus sæpe etiam conjungitur: cum dolore pectoris punctorio, pulmonum inflatione seu tumefactione, & sputo sanguineo, nunc puro, nunc vero aliis materiis mixto. His symptomatis adde sitim inexplebilem, vigilias pertinaces, acerbissimum capitis dolorem, interdum delirium, cum magnâ totius corporis inquietudine.

Art. 484. Evidentes peripneumonix causæ ex *Causa* ipsæ sunt, ac quæ pleuritidem faciunt, videlicet: omnes ex generatim, quæ sanguinem inflamm-

flammare, validasque in eo excitare fermentationes possunt.

Omnes tamen *Peripneumonia* has causas quidem non habent; nam quando senes corripiunt, qui in hunc morbum valde sunt proni, a sanguinis densitate, & crassitie proficiscuntur; quia cum talis sit eorum sanguis, ideo spiritibus destitutus, in pulmonibus facile stagnat, ubi corruptus, & mora ducta putrescens eam inflammationem facit, quam nunc *Peripneumonia* dicimus.

Peripneumonici interdum ex prava sanguinis constitutione hæreditario jure hoc morbo vexantur. Pulmonum dispositio quoque plurimum hic promeretur, cum non raro indurationes quædam seu scrophulosæ glandulæ principio non admodum magnæ, atque adeo non multum sanguinis motum impediunt, progressu vero majores factæ, vasa contigua comprimant, ex qua compressione transitu sanguinis cohibito, necesse est, ejus vim ad progrediendum insumptam in vasorum parietes recidere, quibus ruptis sanguis hac emanans stagnando inflammationem facit.

Prognosis Peripneumonia.

Art. 485. Quantum ad prognosin spectat, nemmo unus non ignorat, morbum hunc valde periculosum esse, majoremque partem eorum, qui eo laborant occumbere, vel saltem difficulter admodum convalescere. Si Anginæ vel Pleuritidi *Peripneumonia* superveniat, magis periculosa est, quam si sponte sua primum erumpat, vel utrumque morbum consequatur; attamen quomodocunque accedat, semper periculi plena videtur, maximæ si cum febre valde acuta, pertinacibus vigiliis, siti inexplebili, & magna respirationis difficultate conjungitur; etenim hæc

hæc omnia immodicum sanguinis calorem, notabilemque pectoris oppressionem ostendunt.

Peripneumonia cum *singultu* periculosissima omnium, notante *Hippocrate*. Hujus ratio videtur, quia hoc casu inflammatio maxima est, pulmonesque adeo turgentes reperiuntur, ut diaphragmate compresso convulsionem cum singultu faciant.

Sed ægri vita adhuc in præstantius versatur discrimen, quando aliis symptomatis delirium, vel Phrenitis, vel convulsivi motus, vel etiam hemiplegia accedunt, cum hæc omnia morbi causam ad *cerebrum* ascendisse ostendant.

Neque minus timendum est, si una cum gravi respirandi difficultate Peripneumonicus confertis *vomitionibus*, *animi deliquiis* *pulsu exili*, *sudoribusque frigidis exercetur*. Hæc enim signa omnia apertissime innuunt, pulmones minime a pressionibus liberari, & quod in eis extravasatum adstat, nec sputo excerni, nec in sanguinis massam retrahi, aut reduci. Hinc magis magisque impedita circulatione spiritus discipantur, vires fatiscunt, & æger proinde ad fatum suum postremo subeundum properat.

Quoad excreatus, qui tantillum densi, & albicantes videntur, atque nonnihil tinguntur sanguine, minus ceteris timendi; tenues contra & crudi sanguine multum imbuti, pejores sunt omnium; quippe qui copiosiore defluxionem ostendunt. Sed malum signum etiam est, si æger nihil excernat, quia extravasatis in pulmonibus, qui remorantur, humoribus necessario sequi debet, ægrum suffocari, vel prorupto tumore Empyema exoriri; Ceteræ excreatum formæ ut fulvi, viridescentes, & nigri, omnes sunt mali, quia exuberantem sanguinis calorem demonstrant, in primis vero nigri. Excreatus valde

de densi ob eandem rationem, valde sunt timendi; nam ob caloris magnitudinem absumpta tenuiori parte, crassior relinquitur, quæ mora ducta adhuc magis densatur.

De urinis non loquor, quippe quæ satis tuta signa non exhibent, quin immo sæpenumero observantem decipiunt. Nihil enim de earum colore, & consistentia affirmari potest; pulcherrimæ videntur in febre maligna, utut insignis corruptio vigeat. Hoc unum profecto notandum est, quod si eadem plurimum a statu naturali recesserint; ut ubi admodum rubentes vel niglicantes apparent, licebit tunc easdem ut mali ominis reputare; color nimirum inconfectus apertissimum signum exhibet præternaturali calore sanguinem exardere.

Sudor difusus, urinæ profluvium, diarrhæa, marium hæmorrhagia, menstruorumque fluxus interdum in hoc morbo bene portendunt, præcipue vero si opportune aliquid horum superveniat, nam morbum resolvit, vel plurimum salutis recuperandæ opitulatur.

Conditio virium maximi etiam habetur momenti in Peripneumonia; siquidem truculentioribus adhuc vigentibus symptomatis, modo vires consistent, & pulsum satis vegetum esse percipiatur, quædam semper salutis spes effulget; contra vero si debilis simul sit, pessimum est; etiamsi alia conquieverint symptomata, nec ut prius excrutiare ægrotum videantur.

Si pulsui debili ac parvo ejus inæqualitas quoque accedit, malum omnino est; quia ingentem pectoris oppressionem ostendit; qua libero sanguinis circuitu per viscera impedito, is irregulariter a dextero cordis sinu in sinistrum migrat, atque inde in arterias pari rithmo adactus pulsus irregularitatem producit.

Art. 486. Cum eadem sit curationis methodus *Curatio*
 Peripneumonix ac pleuritidis, nec partium *Perip-*
 affectarum differentia inhibeat, quin uterque *neumo-*
 morbus iisdem indicationibus regatur, eadem *nia.*
 remedia locum habent utrinque; quare Phlebo-
 tomiam, purgationem, clysteres, ceteraque re-
 media alterantia in cura Pleuritidis adhibita Pe-
 ripneumoniam quoque sanare posse decernimus.
 Prudenter tamen hic eadem usurpanda sunt,
 maxime vero attente incumbendum, ne æger
 purgetur, quin prius quater, vel quinquies phle-
 botomiam subierit. Ratio est quod si purgaretur
 post semel, vel bis sectam venam tantum, ex
 fermentatione a purgante in sanguine excitata,
 & ex nimia vasorum turgescencia nondum sa-
 tis imminuta, nova extravasatio in pulmonibus
 evenire poterit, vel fatalis congestio in cere-
 bro.

Art. 487. Eclegmata excreatum adjuvantia, *Usus*
 negligenda hic quidem non sunt, quæ ut diu
 ore agitantur, & sensim per oesophagum de- *Ecleg-*
 scendunt; ita asperæ arteriæ fibris quodammo- *matum.*
 do irritatis tussi, & excreatus muneri favent.
 Pluribus modis Lohoch seu eclegmata componi
 possunt, vel pulveribus, vel opiatibus, vel syru-
 pis; cum autem syrupi aptiores videantur se-
 quentem formulam adjicimus.

℞. Syrup. tussilag. oxymel. simpl. ana unc. j. Sem. *Lohoch.*
 bals. sulphur. 3j. sem. f. Lohoch cochleatim agro exhi-
 bendum, ut in ore detineat, idemque sensim inde
 deglutiat.

Art. 488. Quoad narcoticorum usum, jam *Narco-*
 supra satis meminimus; sed hic observandum *tica.*
 est, quod in nimia pectoris oppressione Landa-
 num satis tutum non videtur, pro quo mitius
 narcoticum substitui debet: ut syrupus papav.
 alb. metu, ne Laudanum spiritus in cerebro fi-

gendo eorumque defluxum per nervos ad organa respirationis inhibendo aut impediendo oppressionem magis augeat.

Cucurbitarum scarificatarum usus. Art. 489. Casus peculiaris adest quo cucurbitulæ scarificatæ non leve adjuvamen Peripneumoniciis afferunt: videlicet, ubi percipitur inflammationem ad dorsi musculos usque pertinere. Cognoscitur rem ita se habere, quando æger tussiendo circa easdem partes, quibus pulmones suis membranis adhærent, vehementi dolore cruciatur; tunc autem habito respectu loci affecti cucurbitula ibidem applicata majorem partem extravasati sanguinis educit.

De Emeticorum usu. Art. 490. Omnibus remediis incassum adhibitis fidenter emeticum juberi potest, a quo quotidie miri effectus observantur maxime in morbis difficillimis, & propemodum conclamatis. Laudatur vero hoc remedium, modo vires satis sint vegetæ, ut ejus actioni resistere possint, & postquam sufficiens sanguinis quantitas a veniseducta fuit. Nam si vasa adhuc turgescant timendum, ne ex inconsueta, & præternaturali fermentatione, quam hujusmodi remedia producere solent in sanguine, vas aliquod insigne rumpatur, unde nova inflammatio exsurgeret, a qua periculum augeretur, ægerque in deterius malum protruderetur.

Farrago Sententiarum.

Ad prægnosam pertinetentia. Art. 491. Densa & exercitationi assueta corpora (inquit Hippocrates in coac.) citius ex Pleuritide & Peripneumonia intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt. Pleuritides sicca (inquit idem) & in quibus nihil spuitur, gravissimæ; metuendæ quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. A Pleuritide Peripneumonia

malum; a Peripneumonia Phrenitis malum. *Hippocr. aphor.* sanguinis misso est remedium magni & recentis doloris; at siue levior, siue vetustior morbus, vel supervacuum vel serum id auxilium sit, confugiendumque est ad cucurbitulas cum scarificatione. *Celsus.*

Art. 492. A Pleuritide, ultra acutam febrem, fiunt *Polypsi.* polypose concretiones in pulmonibus, ut ex cadaveribus, & extracto sanguine patet. *Malpighius.*

Art. 493. Adverti debet *Pleuram* Pleuriticorum & *Pulmonem* Peripneumonicorum post mortem sectorum semper exhibuisse spectandam magnam copiam *polyporum*: Polypus autem est sanguis diutius stagnans dilapsa parte rubra. Raro pleura sola absque pulmone inflammatur.

Art. 494. Dolorem externe optime leniunt *Linimentum.* linimenta ex ol. amygd. dulc. sp. sal. armoniac. & *tum.* camphora. *Pitcar. in MSS.* „ Item linimentum „ seq. anodyn. ℥. balsam. Locatel. ℥ij. ol. amygd. „ dulc. ℥j. ol. mac. per express. ung. e flor. aurant. ana ℥ij. m. f. liniment.

Art. 495. Quibus plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculisque aurigine suffusus, & caligine obductus, in *Prognosticon* singulis mors expectanda est; ex *Hippocrate*, & *re.* authoris experientia. Vix datur præstantius remedium in fine morbi, quam syrupus vel decoctum *Syrupus de Petro.* nicotiana. *Barbette.*

Art. 496. *Lucius* monitu *Æsculapii* a Pleuritide curatus fuit applicatione epithematis ex cineribus ab ara desumptis & vino commistis. *Le Clerc.* *Cineres pro usu externo.*

Art. 597. Vires & usus remediorum sequentium *Remedia varia.* artis Apollinæ gnaris satis innotescunt. Aq. omnium florum, balsam. sulph. anisatum, ens veneris, decoctum coccineum, decoctum pleuriticum, emplastr. pleuriticum, fons lateralis, haustus pleuriticus, lohoch pleuritic. lohoch viride, oximel.

228 *Pleuritis & Peripneumonia* CAP. II.
asthmaticum, pulvis pleuriticus, sacculus lateralis,
unguentum pleurit.

*Altera metho-
dis Pleu-
ritidem
curandi.* Art. 498. Quæ de Pleuritide traduntur in Le-
xico Medico sunt: hunc morbum periculosissi-
mum satis cognoscendum sese exhibere, quin
observantium diligentiam, attentionemque elu-
dat. Ut plurimum dolorem ad latus sinistrum
profert interdum etiam ad latus dexterum; fe-
bris urget, & tussis, & respirandi difficultas
cum dolore. In Praxi communiter phlebotomia
ter, quater, & quinquies repetitur pro ratione
indigentiae, & indicationis, quod sane princi-
piis Medicis congruit, & generali consensu ro-
boratur. Si vero æger Phlebotomiam adverse-
tur, curatio sequenti methodo instituitur.

Prisana. 24. Rad. scorzoner. man. j. aq. lib. iij. ebull. per
dimidium quadrantis, dein adde flor. pap. rhœad.
pug. ij. vel iij. iterumque ebull. parum, & in fine
ebullition. add. frustulum glycyrrhiz. minutim concis.
removeatur decoctio ab igne, & probe testâ repo-
natur ad subsidendum.

Hæc sit in potum ordinarium ægri, cui po-
stea dabuntur quinque ovi putamina in cyatho
dimidio aq. plantag. atque inde obtegetur, ut
diù fudet. Interea parti dolenti applicabitur ca-
taplasma quod sequitur:

24. Ovi album, cui adde zinziberis quantum sa-
tis est ad dimidium putamen ejusdem ovi implendum,
atque tantundem piperis nigri pulverati misc. & cum
stupa cannabina parti dolenti applicetur, inde impo-
sita mappa saepe replicata per hor. 24. priusquam a-
moveatur, retinebitur.

Si propositum sit hoc Cataplasmate uti, nul-
la venæ pertusio præmittitur, quia eadem etiam
omissa morbus facile cedit, modo accurate ap-
plicetur cataplasma, quod salutarem semper ef-
fectum obtinet. Id vero experientia confirmatum

habuimus. Sequens Cataplasma quoque laudatur:

℞. Fol. nicotiana vel funiculi tabac. unc. ij. cras- *Aliud*
fus incidatur ac pro usu effumationis, tum bul- *Cata-*
liant in vini optimi rubr. lib. j. usque ad tiquoris *plasma.*
consumationem. Dein parti affecta applicetur ca-
lide nicotiana tali encheiresi cocta instar Cata-
plasmatis, & quavis xij. hora renovetur.

Aliud Cataplasma. ℞. Decoct. verbena, farina *Aliud.*
hordei f. pasta mollis calide parti dolenti admovenda.

Applicato quodam ex descriptis emplastris
 tempus erit, ut conveniens aliud remedium in-
 tus sumendum ægro porrigatur. Quod miros ef-
 fectus præstat sequens est.

℞. Sacchar. pulv. ℥ij. instillentur ei ol. destill. Potio.
Salvia gutt. xxx. misce & cum aq. card. bened. co-
chlear. iij. f. Potio.

En altera Potio ab eodem Auctore valde
 laudata

℞. Illius herba, quæ ubi muscus abundat occurrit Gal- *Alia*
licè vocata Perce-Mouffe man. j. Hac mundata a *Potio.*
recrementis, nullatenus autem aqua diluta contunda-
tur in mortario, & cum succo in cyathum aq.
salvia vel scabiosa infundatur per horas iij. in-
fusio exhibeatur ægro jam post quatuor horas, je-
juno, cui antea semel saltem vena tusa sit.

Hujus remedii effectus est, sudorem vel uri-
 nam educere, utcumque vero agat, ut plurimum
 sanat. Pulveres ex mandibulis Lucii piscis,
 dentibus Apri, Ossibus Cordis Cervi, Pulvis py-
 rius cum aq. flor. sambuc. ablutus, pulv. sang.
 hirci, ex Pene Cervi, vel Tauri, tum is ex
 lapid. cancrorum usque ad gr. xxx. unusquisque
 horum porrigitur cum vino albo, vel cum cyatho
 aq. card. bened. Quod sequitur remedium præstan-
 tissimum quoque est, modo post tertium diem
 exhibeatur, vocaturque pomum Quercetani.

℞. Pomum, quo intus excavato olibani ℥j. inge- *Pomum*
ritur, dein probe clauso foramine ad ignem lente co- *Querce-*
quitur. *tani.*

Pomum hoc ægro devorandum exhibetur saccharo cando edulcoratum, insuperque aq. card. bened. unc. iij. propinatis ad sudandum disponitur. Animadvertendum est cum in hac occasione, tum etiam in ceteris omnibus ejusmodi, quibus sudor provocandus est, ut æger levibus sed calentibus stragulis coopertus decumbat, quia si graviora sunt, effectus optatus non obtinetur.

Duo quæ nunc addimus Cataplasmata, eodem Auctore teste, admirandæ quidem pro hoc morbo virtutis habenda.

Cataplasma. ℞. Panem recenter a clybano extractum, quo bifariam secto ejus dimidium theriaca oblitum parti dolenti admoveatur.

Aliud. ℞. Cap. alb. num. xx. quibus coctis in sufficiente lactis quantitate usque ad dissolutionem add. piper. pulv. ℥j. Croci ℥sem. hujus cataplasmatidis dimidium parti dolenti imponatur, & perseverante dolore post quadrihorium alterum dimidium admoveatur.

E M P Y E M A.

Tralliani sententia.

Signa suppurationis. Art. 499. Omnia in universum indicia suppurationis talia existunt: Febris vehementior quam antea: rigor præter rationem, & gravitatis potius quam doloris multi sensus. Ubi hæc tibi apparuerint naturam materiam subjectam in pus mutare scito, & si quidem facultas efficiens robusta fuerit, etiam pus non adeo viscosum reperietur; & vomica tunc intra thoracem circa decimum quartum diem erumpet. Sin autem crassius quoque pus ultra dies prædictos inventum fuerit, & ægri vires infirmiores, etiam circa quadragesimum aut sexagesimum, & longius vomicæ eruptio expectanda est. Summatim procopia, & qualitate materiæ, ægrique viribus vomicæ eruptionem futuram expectato.

Et

Et si quidem intra thoracem pus illapsum, diutius intus manserit, & non fuerit usque ad quadraginta dies expurgatum, ut divinissimus ait Hippocrates, in Phthisin pervenit, pulmone ipso antea puris acrimonia exulcerato, & computrescente. Internosci autem debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dexteram thoracis partem esse calidiorem, magisque gravitatem sentire, tanquam aliquid ex ea pendeat, quando in alterum latus inclinaverit.

Art. 500. Qui biliosum pus expiunt, his cremor idoneus est ptisanæ, si superforbeatur, cremorque avenæ. Si vires imbecillæ sint cremor halicæ, aut typhæ, aut zeæ: sin autem nihil ejusmodi fuerit, nec alvus citata etiam succus amygdalarum, vel per se, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Alvo autem citata nihil prorsus adhibeatur ex iis, quæ amplius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus ejusmodi. Juscula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admodum febricitent, exhibere magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abjecisse, nec non rejectioni contumax fieri incoepisse, apprehendes, tunc rursus ad aquosam mulsam, aut apomeli transire conducit, exhibendo ipsum paulatim, & non universum. Mulla vero quovis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

Art. 501. Viribus imbecillis existentibus adde ptisanæ cremori columbinæ, aut pullum. Exhibeto etiam ægris gallorum testiculos. Assos cibos exhibere convenit. Sic etiam cerebella porcellorum assa præbere satius est, sale modico ipsis asperso; præterea anserum alæ, suum ungulæ, halyca cocta cum amygdalis, pistaceis, uvis passis, & quæ alia probe nutrire ægros possunt. Auctis autem viribus contra ad solidiorem ci-
Quando
lac dan-
dum,

bum transeundum est. Quodsi diuturnior effectus fuerit, & corpus totum alimentum non sentiens contabescere manifesto incœperit, neque thorax multum puris contineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent, si enim multo infestante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poteris. Si quod rejicitur expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modo sordidum, & foedi odoris existat, asininum omnibus aliis antecedit, quippe etiam, eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinandum est, quod asinino ad omnia sit persimile.

Curatio. Art. 502. Hyssopum igitur cum melle bene facit purulentis; similiter etiam thymum, aut iris contusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulgium, omniaque hæc seorsim contusa, aut cum melle mixta si exhibeantur bene faciunt, nam generose repurgant. Ad omnia item thoracis vitia, & ad eos qui tali detinentur, quibusque arteria affecta est, admodum salutare, & suave medicamentum est, quod sequitur. Cinnamon, mirrhæ, ana Ziv. thuris Zj. dulcis radiculae unc. sem. tragacanthæ unc. vj. nardi indicæ Zj. ammomi Ziv. croci Zj. melle excipito.

Ægineta sententia.

Signa Art. 503. Signa itaque consistentis empyematis sunt: gravitas thoracis, tussis vehemens, & *Empyematis.* arida, cum doloribus; interdum etiam humiditas quædam accedit, qua levare nonnihil videntur, febriculæque inter initia satis ignaræ, errantes, & difficilis decretionis affligunt. Quum vero in vomitum abscessus appetit, acrius cum horrore aliquo febriunt, inque sermonis proprietate spiritu turbati præcipitantur. Rupto abscessu pus

su pus rejicitur, modo putum modo fœculentum. Quandoque superius erumpit abscessus, unde gravius incumbit periculum: interdum vero deorsum, atque id quidem quod descendit, partim in ventrem & intestinum transfunditur, partim vero in vesicam, facta per vasa quædam transumptione, delabitur.

Art. 504. Febriunt autem febre hectica usque ad totius materiæ repurgationem, quæ nisi accuratissime procuretur brevi, æger saniosus in tabem rapitur, pulmone exulcerationem sustinente. In qua jam tabe conclamata genæ pallescunt, frons, atque cervix sudoribus rorescunt, carnes contabescunt, ungues incurvantur, & crassiores, candidioresque, aut lividi apparent. Malo autem magis invalescente, venter conturbatur, hypochondrium sursum convellitur, dira sitis, & ciborum aversio cruciant: quodque excreatur gravissimi odoris fluxum emittit.

Art. 505. Ante omnia, puris collecti maturatio promovenda est, spongiarum fotu, cataplasmatibus ex farinis hordeaceis cum caricis discictis, & resina exigua, & stercore columbarum, nitroque, & hibisco. Adjuvat autem rupturam in latus sanum decubitus. Sorbeatur interea ex temporis intervallo mulsa, & cremor ptisanæ admixto melle; sed quibus plus roboris inest, ii jus hyssopi, & thymi melle adjecto bibant.

Art. 506. Ubi pus expectorari cœperit hyssopi denuo, & iridis, atque glycyrrhizæ decoctorum in mulsa potionem repete; vel glycyrrhizam cum sesamo tritam exhibe: aut pollinem in mulsa, & oleo percoctum cataplasmatibus modo inducito.

Art. 506. Quum autem ulcus expurgationi per superna renititur ad medicamentum ex marrubio,

bio, ex eruis ad Dodecatheon, & ad confectio-
nem Philoxeni deveniendum est.

Art. 508. Porro qui in tabem decidunt his
porra capitata in chondri, ac ptisanæ sorbitio-
nibus liquefacta dato. Jam vero hæc per se bis
decocta exhibenda sunt. Potus aquæ pluvialis
esto, & ex eo melicratum.

Exustio. *Art. 509.* Ustiones suppuratis efficacissimās
ferre suppetias compertum est. Oportet igitur
radice longæ Aristolochiæ oleo imbuta ipsis
imposita candenti ferro crustas excitare. Unam
inter jugulorum compagem cute sursum redu-
cta, duas non altas juxta mentum seorsim ab
arteriis soporariis, quas carotides vocant. Sub
mamillis item inter tertiam, quartamque co-
stam duas altiores grandioresque. Binas alias
inter quintam, & quartam, paululum versus
dorsum spectantes: aliam in medio pectore,
rursus aliam supra ventriculi os: a tergo vero
tres, per medium dorsum unam, utroque spi-
ræ latere geminas, quæ in dorso factam cru-
stam excedant altius impressas.

Incisio & perforatio Thoracis. *Art. 510.* Alii vero, quemadmodum etiam
Leonides asserit, ferro nuclei olivæ simili can-
denti inter costas, ea in parte, qua abscessus
est, usque ad pus adurunt. Quidam scalpellum
quoque confidenter adhibent, inter quintam, &
sextam costam transversa incisione, paululum
tamen infra cutim incidunt, deinde acumi-
nato scalpello membrana, quæ costas succingit, per-
forata, pus excernunt. Verum isti quoque, &
qui ferramento ad imum usque adustionem mo-
liuntur, vel illico mortem inferunt, una cum
pure vitali etiam spiritu confertim exinanito,
vel fistulas irremediabiles efficiunt.

Celsi sententia.

Art. 511. Dolor pulmonis si neque per sputa, neque per cucurbitulas, neque per sanguinis de- tractionem, neque per victus rationem finitus est, vomicas aliquas interdum excitat aut circa vigesimum diem, aut circa quadragesimum, non- numquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hæc vomicæ modo a pulmo- ne, modo a contraria parte nascuntur.

*Empyema
matis
indicia
venturi.*

Art. 512. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolorem, inflammationemque concitat, ipsum calidius est: & si in partem suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo vi- detur. Omnis etiam suppuratio, quæ nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaque interdum levior est, nocte increfcit, multus sudor oritur, cupiditas tuf- fiendi est, & pœne nihil in tussi excreatur, oculi cavi sunt, malæ rubent, venæ sub lingua inalbescunt, in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeque summi pallent, in pedibus tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur.

*Indicia
presen-
tis.*

Art. 513. Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante vel circa vigesimum diem erumpet. Si se- rius ista cœperint, necesse est quidem incre- fcant, sed quo minus cito affecerint, eo tar- dius solventur. Solent etiam in gravi morbo pe- des cum digitis unguibusque nigrescere. Quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus in- valuit, pedes tamen decidunt.

*Indicia
confir-
matis.*

Art. 514. Si suppuratio, inquit *Hippocrates* in

Confir-

marè dia- in Præfagiis, in alterutro latere tantummodo
gnosis. fuerit, vertere, atque ediscere convenit in his,
 utrum in altero habeat latere dolorem, & alterum
 quàm alterum calidius sit; atque eo in alterum
 cubante latus, requirere oportet, num aliquod
 desuper onus illi pendere videatur: si enim id
 fuerit, suppuratio in altero latere fatigat.

Prognosis. *Art. 515.* Si corpus adeo grave est ut ungues
 quoque, & digiti lividi sint, expectanda mors
 continuo est. Si digiti ac pedes omnino nigre-
 scunt, minus pestiferi sunt, quam si liveant.
 Sed alia signa consideranda sunt: si enim fa-
 cile ferre malum appareat, & aliquod aliud fue-
 rit salubre signorum, morbum verti significat ad
 abscessum; ita ut æger sit convaliturus; corpo-
 ris vero nigredo casura. *Hippocr.*

Art. 516 Quod si ne rupta quidem vomica,
 vel pure extrinsecus emissio febris quævit, aut
 quamvis quieverit, tamen repetit: item si sitis
 est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus
 est lividum & pallidum; si nihil æger excreat
 nisi pituitam spumantem, periculum certum
 est. Atque ex his quidem suppurationibus, quas
 pulmonum morbi concitarunt, fere senes mo-
 riuntur; ex ceteris juniores. *Celsus.*

Ballonii sententia.

In Empy- icis cur calor au- geatur noctu. *Art. 517.* Accidit omnibus hæctica febre fa-
 borantibus, ut noctu intensiorem calorem ha-
 beant, non quod nox augeat febrem ratione
 suæ diatheseos morbosæ, sed ratione dati obla-
 tique cibi (inquit *Galenus*) incalescunt enim a
 sumpto cibo, & maxime dum distribuitur. Qua-
 re de nocte potius, nam & cibus interdiu da-
 tur? *A Vega* mihi videtur pueriliter hoc ex-
 plicare. Quia (ait) tempore *Hippocratis* non
 pran-

prandebant sed coenabant: *Galenus* æque male. Nec enim omnino explicat illud *Hippocratis*: *Noctu vehementior*. Melius diceret, quoniam agitur de purulentis, in omnibus suppurationibus dolores ad noctem; id quod non tantum audiendum dum pus fit, sed dum pus continetur aliqua parte fovens febrem lentam. Vel dicemus cum hecticis partes solidæ ignitæ sint, non mirum si noctu calor increseat, tum quia nox humectat, tum quia revocatur calor, & spiritus intro. Sic calor crescit non ratione ipsius affectionis, sed ex eventu. Vel dicemus nocte revocatur calor naturalis ad centrum, qui calor quia igneus est, dum revocatur intro non nanciscitur aptum domicillium, & quo loco humectare debet siccatur, & squalorem auget. Et tunc non fiunt calores febriles, sed quædam exacerbationes. Præclara quidem est quæstio hæc.

Quærat autem quis: an pus suos motus habeat nocturnos potius quam diurnos? Nam & in inflammationibus internis paroxysmus est nocturnus. Et id non est proprium nec hecticis, nec empyicis ut nocturnas molestias potius experiantur, quam qui aliis morbis implicantur.

Art. 518. Unde mirati sumus cur antiquitas, peculiari quodam privilegio, & prerogativa *Ratio*
exacerbationem nocturnam puri, & purulentis *quænam.*
assignaverint. Nec enim id novum est. Nam & venerea lue affecti, præsertim ubi solidas partes invasit, & conspurcavit, nocte dolent magis, & athritici & odontalgici, & cephalalgici & catharrodes, denique multo maxima pars ægrotantium. Præter rationes a nobis alibi adductas, sunt & hæc probabiles. Primo quia omnes ferme morbi sub tempus noctis ingravescent. Multis id quidem de causis: Partim quia ob adveniens tempus nocturnum fit admirabilis

lis quidam motus, & revocatio intro, motus quidem plane contrarius motui ipsarum vigiliarum. Deinde, coctio fit noctu. Coctio quidem non solum humorum naturalium, sed & contrariorum, & febrilium. At dum pus fit, febris augetur, & dolor. Quæ ratio & analogia de pure in abscessibus, in aliis morbis, & febribus audiri potest. Maxime autem id apparet in empyicis. Dolent enim partes solidæ, & augetur calor febrilis, qui interdiu in partes omnes expansus erat.

Septalii sententia.

In Em-
pyemate
non po-
test a
Medico
pus per
alvum
evacua-
ri.

Art. 519. Cum suppuravit: ex disrupta vomica vix alia via recte expurgantur, quam per tussim screata, non multum spei in evacuanda ea materia per alvum reponere debet Medicus, quod ope medici hoc vix fieri possit; præstat id quandoque Natura, quæ nobis incompertas vias invenit, & ad salutem ægri statuit; salubriter id quandoque a Natura tentatum scimus, id Aretæus testatur: & nos in purulento ex pleuritide jamjam ex suffocatione moribundo vidimus, in magno hoc Valetudinario, qui cum phlegmone laboraret, & propemodum strangularetur, sudores jam frigidi adessent, livescerent omnia extrema, potissimum facies, subito alvi fluore superveniente, maxima saniei copia effusa, brevi tempore convaluit: raro igitur cum id faciat natura, cum eadem nobis incognitas vias sibi struat, cum præterea non sit per loca convenientia, omnino non erit imitanda a Medico; potissimum quia, si leviori purgante utemur, noxii nihil evacuabimus; si validiori, vires imbecilles reddemus, in quibus solis salutis spes posita est, ut & ferendo morbo sint

sint idoneæ, & materia per tussim screatu expelli satis possit.

Art. 520. Per urinam licet quæ in thorace, & pulmonibus continetur materia difficillime, & minus tuto educi possit; promoventibus tamen lotium tuto uti possumus, ut saltem materia, quæ in vomica adhuc continetur, & quæ denuo colligitur, per vesicam excerni possit. *Diuretica con-venire possunt.*

Art. 521. In ulsione, & sectione facienda in empyicis hæc sit cautio, ne a ruptione vomicæ statim fiat, sed cum Hipp. in *Coacis prænotationibus* diferenda erit, in decimum quintum diem, ut & materia coctione ulteriori mitescat magis, quia ab effusione extra locum, ubi maturuerat iterum alteretur, & ulteriori coctione melior reddatur, post quem diem si inulsio facienda, omnino maturandum. Placet enim Oribas. 9. *Synopseos cap. 3.* celeriter evacuantum esse, neque multum cunctandum, ne vires collabascant; in quo casu omnino a tali actione abstinendum est, ne in illud incommodum incidamus, in quod cum certo mortis periculo incurrunt, qui in ascite ad sectionem numquam veniunt, nisi cæteris remediis omnibus primum in usum ductis, & jam viribus exhaustis, & morte præforibus stante. *Empyicæ quando urendi aut secandi.*

Art. 522. In suppuratis vomitus plenus est periculi; si enim eodem tempore vehementissus, & excreandi necessitas superveniat, simulque evomantur impetu multo ex ventriculo crassiora, vix evitari potest suffocatio, conspirante ad suffocationem, & œsophago, & aspera arteria; tum præterea, quod constrictis musculis abdominis in vomitu, puris copia multa in pectore repleto coarctata, magis in regione venosæ arteriæ compulsæ, sæpe cor ita suffocat, ut statim mors subsequatur. *Vomitus periculosus.*

Quomodo evocandus.

Art. 523. Proderit tamen inanem vomitum etiam digito provocare, non tamen promoveré: sic enim a rectis abdominis musculis ab infernis partibus compresso diaphragmate materia paratior facilius propelletur.

Langii sententia.

Empyema quid?

Art. 524. Empyema Thoracis purulentam designat materiam ex pleuræ, vel pulmonum abscessu rupto ad cavitatem Thoracis depositam.

Signa ejusdem.

Cognoscitur ex pondere, & fluctuatione in Thoracis cavo, quæ non admittit decubitus ægri in latus sanum, sed statim suffocationem minatur. Attendendum tamen hic, num pleuritidem, & peripneumoniam excipiat, ne confundatur cum Thoracis hydrope.

Cura.

Art. 525. Cura vel præservationis gratia expetitur a Medico, vel restitutionis.

Præservatoria.

Præservatoria in eo consistit, ut occasionales corruptionis causæ quantocyus removeantur, v.g. inflammatio discutiatur, obstructio a pituita deopiletur; acrimonia sanguinis, catarrhus, & tussis corrigantur, vulnus consolidetur; quæ cuncta quibusnam mediis possint obtineri, ex superioribus partim, partim ex subsequentibus innotescet.

Restitutoria.

Quodsi omni præservatione incassum adhibita nihilominus sequatur vomica, aut Empyema, aut Phthisis tum ad alteram curam deveniendum est, ubi hæc quatuor puncta observanda sunt.

Art. 526. Primo num ulcus jam ruptum sit an secus? si non apertum est, interim tamen vel dolore, vel respirationem impediendo molestiam pariat, de ejus ruptione cogitandum, quam obtinebis, vel per usitata remedia emollien-

lientia interne, & externe usurpata, vel interne per canculos vivos contusos cum aceto, vel vino, aut externe per oleum corticis cucurbitarum longiorum, cujus comparandi modum, & virtutem incomparabilem vid. in M. N. C. Ann. I. obs. 10. Vomitorium remedium utut a quibusdam in casu desperato præscribatur non suadeo, licet enim obtineamus ex nimia totius corporis conuulsatione aliquando rupturam vomitæ, ob suffocationis tamen periculum, quod inter vomendum iminet, aut hæmoptysis, aliaque dira symptomata facile insequentia ad evitandas censuras oforum Medicinæ, tutius erit, prorsus ab illis abstinere, vel ante usum de periculo, & ancipiti eventu adstantes, & ægrotum commonefacere.

Art. 527. Secundo aperto aposthemate officium est Medici evacuationem puris vel per expectorantia tentare, qualia sunt veronica, scabiosa, hyssopus, tussilago, capill. veneris, marrub. alb. brassica rubra, ruta, salvia, rosmarinus, rad. helenii, Angelicæ, Levistici, Imperatoriæ, ligni guajac. &c. vel per laxativa, ut rhabarb. mechoacanna, fol. sennæ, rad. polypodii, vel per diuretica blanda, ut petrosel. heder. terrest. ocul. cancr., vel si in thoracis cavo fluctuet, per canculos cum aceto, vel vino contusos, quod medicamentum alias vix in hoc casu fallit. Si per urinarias vias non exturbaverint purulentam materiam, ad paracentesim deveniendum est, quæ celeriter tamen adornanda est; nam ut notat Tulpius alias educes quidem pus, & sanguinem non tamen e periculo ægrum. Quo diutius namque pus relinquitur eo magis nocet.

Art. 528. Hac enim operatione præterquam, quod intentionem naturæ sequimur, evidentem non raro protuberantiam intra costarum inter-

Pus educendo.

Ulcus mundificando.

stitia formans, & digito quasi locum ostendens per quem materia extrahidebeat; illud insuper commodi accedit, quod decocta vulneraria per siphonem immediate ad locum læsum infundi, adeoque ulcus detergi, & ad consolidationem disponi potest.

Hinc tertium oritur quod est, mundificatio ulceris, & consolidatio, de quibus non citius cogitare debet Medicus nisi pure maxima parte evacuato. Convenientissimum igitur tum erit, cum bechicis vulneraria præscribere, ut sunt urtica, bugula, herb. costi, cheresolium, geranium robertianum, millefol. pyrol. plantag. portulac. petroselin. fanicula, burs. pastor. rad. symphyti maj. tormentil. pimpinell. &c. aut loco harum plantarum præparatas jam cum saccharo conservas, modo tussim non augeant, costi, flor. salviæ, urticæ præ primis, & rosarum; aut alia balsamica e. g. balsam. peruvian. aut sulphur. in specie terebinthinatum parca tamen manu usurpare.

Symptomata emendanda.

Art. 529. Quartum denique est, ut symptomatum habeatur ratio, ex quibus maxime urgentia removeantur.

E M P Y E M A.

Boerhaavii sententia.

Empyema quid. *Art. 530.* Empyema est collectio puris in thoracis cavo, ut plurimum ex rupto Pleuritico vel peripneumoniaco *abscessu*; cognoscitur a tempore inceptæ inflammationis xx. dierum sine purgatione, a tussi sicca, gravitate ad diaphragma, decubitu in unum latus, strepitu puris ad motus, febre lenta, genis rubentibus, oculis ca-

vis.

vis, digitis in extremitate calidis, unguibus recurvis, & abdominis tumore.

Art. 531. Ad curationem quod attinet, *Curat.* cognita vomica pulmonis, pleurae, diaphragmatis, mediastini, vel pericardii disruptione, omni ope nitendum, ut pus evacuetur per os, vel per urinas, si natura has monstraverit vias, vel denique per thoracis aperturam ope instrumenti idonei in latere affecto, inter costam 4 & 5, vel 5 & 6 ab inferioribus numero ducto, pus lente & per vices educendo; ex indole puris educti, & reliquis ægrotantis circumstantiis, prognosis de vita vel morte pronuntianda erit; si *Empyema* fuerit vetus, vires collapsæ, capilli cadentes, alvi fluxus colliquativus, corpus tabidum &c. *paracentesis* facta mortem accelerare solet.

Villisi sententia.

Art. 532. *Empyema* est collectio puris intra *Signis* *Empyematis* *Emphy-*
cavitatem thoracis qua respirationis organa op-
primuntur; illuc vero pus istud confluere solet, *matris*
vel ex *pleuritide*, vel *peripneumonia* (& quandoque
forsan ex *angina*) suppuratis & disruptis; post
morbos prædictos *Empyematis* secuturi major e-
rit suspicio, si post unam vel alteram septima-
nam, sine sputo copioso, rigores, & febris, &
spirituum languores, superveniant, & dein post
14, vel 20. dies *Empyematis* plane facti signa
erunt respiratio difficilis, pectoris gravitas, ma-
teriæ fluctuatio, & molestiæ sensus e corporis si-
tu mutato, sitis & febricula fere constans, ge-
narum rubor, totius inquietudo & vigiliæ. De
paracentesi vide locum, & de eventu ejusdem
p. 201. Vide etiam *Mayerne*, p. 178.

Ettmulleri sententia.

Diagno-
sis.

Art. 533. Cognoscitur, quando factum sit *Empyema*, quod remittat febris, quin etiam fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur; rumpitur autem *vomica* circa diem 20. 30. aut 40. dum vero rumpitur, rigor fit, & febris intensior supervenit, adest tussis continua, quasi ex profundo, quia diaphragma gravatur ex incumbente pure, parum excernitur, febris mitior evadit, & magis lenta, respiratio est difficilis, & sentitur pectoris gravitas, si corpus inclinant pene suffocantur, sentiunt frequentissime *evaporationes* ex pectoris cavo ad os ascendentes instar *aquæ calidæ*; ulteriori progressu percipiunt in ore *saporem teræ* & quasi *putridum*, & pulsus intermittit.

Curatio
per aper-
tionem
thoracis
& aliter.

Art. 534. Apertio thoracis fit inter 5^{am} & 6^{am} costam (a supremis numerando); mature fiat. Vide *Sculietum*. Quod ad remedia attinet, exhibenda sunt grumolum sanguinem *dissolventia* & *absorbentia*, & tunc præstat a *diureticis* incipere, in fine autem aliquod *sudoriferum* subnectere. Si molliatur aliquid natura, semper medicus sit ejus minister; V. G. quando urina purulenta redditur, dentur *diuretica*; in diarrhœa purulenta, *laxantia*; si ad sputum vergat; *expectorantia*, immo *vomitoria*; *nicotiana* est egregia; *fonticuli* etiam a quibusdam inter costas inurantur, interne *balsamica*, *vulneraria*, decocta e *lignis*, *gelatina* C. C. *hedera terrestris* valde commendatur, Vide *vomicam pulmonis*. (541. &c.)

Verne sententia.

Suppu-
ratorum
indica-
tiones.

Art. 535. Si inflammatio sit jam corruptiva, & verus sit jam obortus abscessus tria juxta Et-
mul-

mullerum sunt patranda. Primo suppuratio promovenda. Secundo abscessus perfecta ruptio adjuvanda. Tertio abscessu aperto partis ulcerosæ mundificatio, & consolidatio, ac simul puris excretio instituenda.

Art. 536. Cum suspicio sit verum jam factum esse abscessum, decocta pectoralia valentiora adhibeo uti: parata ex hyssopo, syrup. de symphyto Fernelii, syrup. de nicotiana, ac præcipue decoctum tabaci Ferdinandi quæ singula apostema maturant, & rumpunt. Ex nicotiana enim præcipue præsidia utpote quæ acutiora irritando vomitum, & sternutationem inducunt, & abscessum rumpunt.

Decoctum Tabaci est hoc

Art. 537. ℞. Fel. tab. unc. j. bull. in aq. dulc. ℥ij. ad consumpt. medietatis add. in fine fol. malv. branc. ursin. violar. ana m. j. colentur & cum sapa misceantur, & detur calidi in sculum pluries cochlear. rim.

Quo decocto uti valentiori non nisi postremo loco utor, & cum maxima urgeat vis rumpendi; at ejus vice prius syrup. nicotianæ quam pluries sum expertus ad unc. j. pro vice præbeo.

Fumus nicotianæ quoque proficit, ut si folia ejusdem reponantur super cineres adhuc ignitis, & fumus per fistulam excipiat: at magis proficius est fumus ex nicotianæ pulvere carbonibus injecto.

Ruptionem coadjuvant etiam emplastra parti affectæ apposita: uti ex quatuor gum. ex fodicat. paracelsi, quod nimis potens est, omnia denique topica, quæ pro abscessuum ruptura conveniunt: ut ol. & unguenta inter quæ præcipuum locum tenet unguentum filii Zachariæ.

Art. 538. Ager suum quoque exequatur mu-

pus, sese volvendo de uno latere in aliud, fluendo ac fortiter excreando, & nicotianæ pulvere aut alio sternutationem provocando.

Quia ruptio seu apertio abscessus duplici loco fieri potest, duplicem quoque methodum requirit. Aut abscessus fit in musculis externis tantum, & tunc ubi certi sumus de ejus maturatione spatia intercostalia ibidem perforanda sunt. Nec enim in eo loco, quo in empyemate, pure jam in thoracis cavitate collecto sectio fieri solet, apertio instituenda, sed ex pondere dolore, & calore loco abscessus deprehenso intra duas costas leviter aperiendus est. Quandoq; vero abscessus adeo externe tumet, ut veluti sacculus promineat, qui adeo facili sectione aperitur. Etiam inflammata pleura præcipue ea parte quæ musculos intercostales respicit, adeo ut ea parte abscessus rumpatur, & pus musculos adjacentes fere inundet, hæc perforatio seu paracentesis institui poterit; sed caute nimis, ne perterebrata pleura ea parte, qua sana est, nova, & periculosior inflammatio oboriatur, & æger binis morbis pessundatus mortem indubie subleat. Idcirco in tam ardua operatione lente procedendum, & non nisi præstantissimo Chirurgus, & Anatomico fidendum, ne artis infamia emergat.

Inde abstergendum.

Art. 539. Aperto igitur abscessu abstergendum est ulcus: & syringa præcipue injiciendum decoctum vulnerarium elicatum ex hedera terr. herb. veronic. radic. aristoloch. myrrha cui addi potest, sp. vini plus minus pro ratione quantitatis liquoris injiciendi; vel potius spiritus terbinthinæ veluti mundificantium princeps, & balsamicus.

Si abscessus sit in interioribus nec rumpatur.

Art. 540. Si vero abscessus ad exteriora haud inclinet; sed in penetratibus fiat, in varias rumpitur

pitur partes: quandoque ex dilatata pleura pus intra faccum colligitur; ex cujus membranæ laxitate, & præ dolore, distentione, ac agitatione, quadam flacciditate acquisita fieri nequit abscessus ruptio; quæ ut accidat membrana necesse est, ut maneat tensa, unde disrumpi valeat; quod in filia D. Pisonis notavit *Lindanus*. In quo igitur sacculo materia purulenta nimis acri, & putrida reddita facile moriuntur ægri: & si quidam hujusmodi affecti evaderent (quod admodum difficile duco) non nisi hoc modo fieret, quod ab illa materia acri, & corrosiva erosio, & corruptis sanguiferis vasis, a quibus imbibi, & refforberi posset illud evasatum; quod deinde per ureteres, aut alias vias excerneretur, ut supra innuimus ex *Bartbolino*: & sic natura ipsa veluti medicatrix partes consolidaret, & callo obduceret.

Art. 541. Vel apostema in pleura factum in cavitationem thoracis abrumpitur, & empyema efficit: tunc in alium morbum commutatur Pleuritis; qui utique solvatur non adeo facilis est, & phthisis timorem habet uti ex *Hipp. V. Aph. tex. 15.* *Quicumque ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus purgantur a die, qua fit ruptio, liberantur; si vero non, ad tabem transeunt.* Quoniam materiæ purulentæ per tracheam ad os non adeo facilis ascensus est, ex qua detenta pulmones ipsi inficiuntur, & ulcus insanabile acquirunt; idcirco præsidia quælibet, quæ in empyematis cura a clarissimis auctoribus recensentur sunt propinanda: quæ ne nimis voluminosus fierem reticeo.

Art. 542. Vel abscessus seu apostema in ipsis pulmonibus fit quandoque circa partes ac glandulas, ex quibus materia purulenta exitum in bronchia, & trachœam faciliorem reperire potest,

*Si rum-
patur in
Thoracis
cavita-
tem.*

*Si rum-
patur in
Thra-
chœam.*

test, & sic expectorantibus ejus educationem promovere par erit: & deinde consolidantibus, & balsamicis apostematis sinum coæquare, & conglutinare congruum erit.

Vomica.

Art. 543. Materia exitum interdum non adeo facilem per trachœam reperiens, sed intus diu contenta, & partes propinquiores fere exedens cavitatem magnam in ipsis pulmonibus efficit, quæ vomica difficilioris curationis erit: si disrupta per trachœam exitum quæret, instantaneæ suffocationis periculum habebit, præter sinuosum ulcus non adeo facile sanabile: aut lacerata membrana pulmones ambiente empyema quoque ex peripneumonia fiet.

Barbeyraci sententia.

Empyema quid?

Art. 544. Quamvis Empyematis vocabulum latiori significatione sumptum suppurationem quamlibet significet, videlicet puris collectionem in quavis corporis parte; nihilo tamen minus ex omnium medicorum consensu idem usurpamus ad eam puris vel purulentæ materiæ collectionem indicandam, quæ in thoracis cavitate accidit; puris dicimus vel purulentæ materiæ collectionem, quia alterum ab altera ut plurimum distingui solet; nam pus veræ corruptionis congestionem significat, materia vero purulenta corruptionem cum sanguine, bile, aliisque humoribus mixtam.

Ejus causa.

Art. 545. Antecedens causa Empyematis morbus est semper aliquis pectoris, veluti Pleuritis, vel Peripneumonia, ut alibi etiam innuimus.

Accidentaliter quoque Empyema produci potest a suscepto in pulmonibus, vel in pectore vulnere aut ex ruptura vasis cujuslibet a casu,
vel

vel ob ingens editum conamen. Utcumque res se habeat, sanguis qui affatim in pectoris cavitatem emanat ob ductam ibidem moram sese in pus convertit, quia circulari motu cessante, commixta ejus principia a mutuo nexu recedunt, & corruptioris occasionem faciunt; si hoc in pectoris cavitate producit, Empyema proprie est.

Art. 546. Empyematis signa sunt duarum species. Priora ostendunt, quando oriturum est: ut si pus a pulmonibus in peripneumonia, vel a pleura in pleuritide generetur, quod inde in pectoris cavitatem effunditur. Altera ostendunt morbum jam confirmatum, seu puris collectionem in dicta cavitate factam. *Empyematis signa.*

Prioris speciei signa sunt: exacerbatio febris cum insigni rigore, & languoribus, nec non cum aliquo sensu ponderis in thorace percepto.

Alterius speciei signa confirmatum Empyema ostendentia sunt: Febris ardens cum nocturnis exacerbationibus, & continua ferme respirandi difficultate, materie in cavitatem thoracis effusæ ad corporis motum sensibilis fluctuatio, sudores diffusi maxime noctu, insignis genarum rubor, oculi cavi, ungues recurvi, crurum pedumque inflatio, eruptio quarundam pustularum per pectus, imi ventris tensio, atque in fine morbi tumor œdematosus circa locum in quo pus collectum invenitur.

Cognoscitur pus in latere sinistro colligi vel in dextero, ex loco quem prægressa tenuit inflammatio, ex calore, pondere, & fluctuationis sensu materiæ effusæ; quæ omnia symptomata lateri affecto semper inhærent.

Nullum hic sermonem habemus de signis Empyema ab hydrope pectoris distinguantibus, quia de

de iis aliquid dicendum nobis proponimus, ubi de pectoris hydrope agemus.

Prognosis.

Art. 547. Quantum ad Prognosin eadem ante, & post paracentesin pronunciari potest. Si perspectum sit ægrum viribus destitui, morbumque pessimis symptomatibus stipari, tunc libere dici potest, de eo esse conclamatum; unde potius ac lateris apertionem suscipere, ægrum sorti suæ relinquere præstat, metu ne medicus intulisse mortem insimuletur. Si contra vires adhuc valeant, nec symptomata nimium vehementia vigeant fidenter operatio institui debet, qua peracta si effluens pus album sit, æquale & concoctum bonum est, & felicem eventum portendit; si vero tenue, foetidum, & sanguinolentum malum, & sanationis spem admodum infringit.

Empyema quod Pleuritidem, aut Peripneumoniam consequitur longe deterius est, quam quod vulnus vel vasis cujusdam pectoris rupturam; nam hujus confectaria ut plurimum bona prodire solent maxime si vulnus admodum pulmones non penetraverit; illius contra sæpenu-mero in Marasimum, in febrem lentam, atque in Phthisin exeunt.

Quando Chirurgi specillum aureum vel igneum colorem a pure recipit malum est, juxta *Hippocratem*, quia hujusmodi colores summam puris simul instrumento fortiter adhærentis acrimoniam ostendunt.

Curatio per Paracentesin.

Art. 548. Tota Empyematis curativa methodus lateris perforatione innititur, maxime si evidentia signa habeantur eandem utiliter suscipi posse; secus in re dubia laudabilius est, aliquandiu protrahere, quam imprudenter ac temere operatione instituta suæ famæ perperam morem gerere, ægrumque in gravius discrimen

pro-

protrudere. Ubi eo usque completum esse Empyema innotuerit, ut nullus dubitationis locus maneat mox manus operi admovenda, latusque perforandum, ut hæc pus in pectoris cavitate congestum ægredi possit, atque hujus operationis methodus apud laudabiliores neotericos, qui eandem accuratius descripserunt, consulenda.

Nonnullæ observationes huc facientes.

Art. 549. Dum operatio expeditur, hæc duo animo sunt diligenter perpendenda. Alterum ut pus sensim, & reiteratis vicibus educatur, quia cita nimis ac plenior evacuatio a tantavirium exinanitione exciperetur, ut æger protinus occumberet; alterum cavendo quo magis fieri potest, ne aer per factum vulnus pectoris cavitatem subeat, quia vix hic puri miscetur, ejus fermentatione mirifice aucta acerrimam putidamque facit corruptionem. Quamobrem ad hujusmodi inconveniens opportune vitandum, vel saltem inhibendum bis terve in die haberi injectiones decocti cujuslibet vulnerari in thoracis cavitatem laudamus, quæ etiam in usu trahi debent, intuitu nimis densum pus diluendi. Ubi perspectum erit pus nimis tenax viscidumque esse, decoctum, seu aqua vulneraria sequenti ratione comparabitur.

℞. Fol. agrimon. absynth. min. ana man. j. Summit hyperic. ros. rub. ana man. semis, uvar. passul. unſem, aq. font. q. s. ebull. ad consumpt. tertiae partis, dein colat. lib. j. adde mel. rosat. unc. j. s.

Quo liquore toties fit in thoracem injectio quoties puris densitas exigit, dando operam ut ægri corpore post injectionem paulo agitato omnia intus misceantur, pus promptius diluatur, & interior cavitas exactius purgetur; ea demum situatione locabitur æger, ut facilius immissa injectio cum pure possit effluere.

Injectio vulneraria.

Practicis nonnullis usûvenit pro quavis alia inje-

injectione aquam hordei cum oxymelite, & melle rosato usurpare, alii vero supradictæ decoctioni *Aristolochia*, & *Gentiane* radices addunt.

Præter injectiones ad puris exitum expediendum laudatas, comendamus etiam opportunum aliquod Emplastrum suppurationi adjuvandæ gratia parti affectæ applicare.

Dum operatio instituitur si desiderium incedat cognoscendi, an quod emanat purum sit pus, an vero materia tantum purulenta, nihil aliud præstandum est, quam ut partem quamdam effluentis liquoris in aquam dejiciamus, quæ si fundum petat pus merum indicabit, quod ratione substantiæ terrestris gravitate sua facile descendit; si vero supernatet, erit tantum materia puriformis, quæ aliorum liquorum mixtione mero pure levior apparet.

Remedia interna.

Art. 550. Ceterum, ut massa sanguinis refrigeretur, & quidquid in ea acris, & salini reperitur temperationem subeat, exhibebuntur identidem ægro emulsiones, vel julapia; ut sequitur.

Emulsiones.

Emulsiones, inquam, eadem methodo componi poterunt qua recensitæ supra fuerunt in Pleuritidæ. His si pertinaces vigiliæ, aut vehementes dolores urgeant, addere Narcotica licebit. Julapiorum vero formulæ ita se habent.

Julapium seu Apozema.

℞. Rad. alth. glycyrrh. ana unc. j. fol. bugloss. cappill. vener. borrag. polytr. ana man. j. sem. 4. frig. maj. unc. j. flor. borrag. pap. rhæad. violar. hord. ana pug. j. aq. font. q. s. coq. ad consumpt. tertiæ partis dein in colat. ℞j. dissolve syrup. jujub. vel violar. unc. iiij. fiant tres partes, quarum alteram mane alteram vero vespere eger propinet.

Pro hujusmodi Julapiis aquæ destillatæ identidem adhiberi possunt, quomodo sequens formula ostendit.

℞. Aq.

℞. Aq. destill. pap. rhœad. lil. convall. ana unc. iij. *Aliud.*
 vel tantundem aq. destill. rosar. in quib. dissolv. sy-
 rup. capill. vener. vel tussilag. unc. j. sp. sulph. parum.
 m. f. julapium vespere sumend.

Interea alvus clysterum ope lubrica servanda
 est, qui decoctione parantur foliorum Malvæ, *Clyste-*
 Parietariæ Lactuæ addito parum hordei, cum *res.*
 manipulo furfuris, tum etiam electuar. catholic.
 & melle rosato.

Subinde etiam blandis laxativis purgandus æ- *Laxati-*
 ger, ut inde pars quædam febrilis materiæ eva- *va al-*
 cuetur. Quamobrem *vum.*

℞. Senn. Zij. tamarind. unc. sem. pulp. cass. unc. j.
 ros. pallid. parum crystal. miner. vel sal. prunell. Zij.
 aq. font. unc. viij. infund. per noct. super ciner. calid.
 mane in colat. unc. v. dissolv. mann. unc. j. pro po-
 tione agro exhibenda.

Atque identidem dandam ei aliqua potio vul-
 neraria, præcipue si Empyema alicui graviore
 vulnere supervenerit, vel etiam si ab ingenti
 conatu ortum fuerit, ob vasis cujusdam in pecto-
 re ruptionem. Quæ sequitur opportunam judi-
 camus.

℞. Hord. integr. man. sem. fol. agrimon. pimpinel. *Potio*
 millefolii, sanicula, consolid. maj. ana man. sem. vulnera- *ria.*
 pilosell. parum summit. hyperic. tantundem ros. rub.
 pug. j. aq. font. q. s. ebull. ad consumption. tertia par-
 tis. In colatur. dissolv. syrup. ros. sicc. unc. j. vel jj.
 cujus subinde aliquod cochleare agro porrigetur.

Si vero non obstante horum remediorum usu
 æger in marasum, vel Phthisin ruat, præscri-
 betur ei asininum lac, & per hujus usum omni
 decimo die infusione sennæ cum manna purga-
 bitur.

Hac ipsa methodo tractandus quoque est, si
 forte habita thoracis perforatio in fistulam dege-
 neret, cum nihil utilius sit hisce in casibus lacte.

Inter legendum & observandum.

Art. 551. Signa effusionem puris in cavitatem thoracis connotantia ex accurata descriptione quam D. *Verduc* dedit in suis *Chirurgicis Operationibus* hujusmodi sunt:

Accura- Tunc cognoscimus, inquit, in pulmonibus ;
ta de- vel in pleura abscessum generari, quando Pe-
scriptio ripneumonia, vel pleuritis consuetis remediis
signorum minime obtemperans diem decimum quartum ;
Empye- prætergreditur, absque eo quod ullum conco-
matris. ctionis signum, aut per sputa, aut per sudores,
 alvum, & urinas efferat. Hisce stantibus abscessus generatio die vigesimo quinto, vel trigesimo attendenda est, citius vel serius etiam, pro ratione virum, ætatis, & temperamenti ægrotantis, vel habito respectu magnitudinis morbi, vel anni temporis. Abscessum jam perfectum cognoscimus, quando nulla habita secretionem per necessitas vias, febris & dolor una cum aliis symptomatis iminuantur, & aliquandiu conquiescunt, ægrotusque minus gravatus sed aliquantulum melius se habere videtur. Si vero paulo post dolores oppressionesque revertuntur, etsi non adeo vehementes, vel si febris exacerbatur, & renovat, atque crebris sociatur rigoribus, & cum tussi conjungitur, vel si æger sudores maxime nocturnos habet ; vel demum si dolor gravativus evadit, & cum sensu ponderis ; hæc vero omnia abscessum denotant. Cognoscitur abscessum inter utraque pleuræ laminas esse, quando prægressa symptomata, vehementia fuere ex.gr. si febris acuta admodum præcessit, dolores vivissimi, tussis prorsus sicca, ullo absque excreatu, quæ omnia respirationem dolorosam simul efficiunt. Cognoscitur abscessum

sum pulmones tenere: si levior fuit febris, dolor obtusior, oppressio major quamvis minus dolorosa respiratio, tussis vero frequentior, & validior, sputum sane sanguineum, & purulentum &c. ægreque inter tussendum, & excreandum meticulosior & tristior. Cognoscimus item abscessum intra pectoris cavitatem erupisse, quando æger dolorem gravativum percipit in loco diaphragmatis, præcipue versus costas spurias, de quo nihil prorsus antea quærebatur, & ubi sedendo hunc ipsum dolorem augeri sentit, atque inde respirationem difficiliorem fieri; Si in latus decumbendo, in quo antea semper doluit, levamen aliquod experitur, contra vero si in latus appositum, in quo nihil mali passus est, materia, quæ in alterutra Thoracis cavitate fluctuare supponitur, Mediastinum premendo sensibiles dolores ibidem cum insigni respirandi labore parit. Quod si extravasatio utramque cavitationem pectoris teneat in neutro latere decumbere æger poterit, quin a recensitis molestis magis non vexetur, unde commodior decubitus hoc in casu supinus erit, nec sedere utique valebit ob sensum ponderis, & doloris totum diaphragma occupantem, quod in hoc situ adeo opprimetur, ut respirationis munus exercere nequiverit, nisi ubi effusæ materiæ quantitas admodum pauca reperiatur.

Art. 552. Evenit aliquando ut pus a Thorace contentum per urinæ vias immutatum egrediatur, quod sane circulationis legi referre non dubitamus, quia venarum absorbentium orificia, quibus undique Thoracis cavita scatet illud satis liquidum haurire possunt. Neque dubitamus inquam, ita se rem habere, cum nullibi aliæ viæ prodeant, per quas natura pus a Thorace ad renes detrudere possit. Observatione dignum est

*Pus per
urinas :*

hujusmodi effluxum in suppuratis Pleuritide ut plurimum contingere, in quibus pus, quod generatur, liquidum esse solet, & inconcoctum.

Idem per homoplas. *Art. 553.* Refert *Willisus Pharm. Rational*: cauterium intra homoplasas inustum, purulentam hanc materiam aliquando egregie eduxisse; sed specialis tantum est casus, a quo regula formari potest nulla. Quænam amabo via ex Thorace ad scapulas datur? Et licet dixeris per poros, & fibrarum interstitia transire hanc materiam posse, quia totum corpus permeabile est, & perspirabile juxta Hippocratis effectum; non tamen Aphorismo huic semper se alligari patitur Statura; sed rarioribus observationibus hæcce puris evacuatio æque annumerari debet, acubi per renes, & vesicam, aut per secessum eadem succedit. Ne tamen nihil omnino egisse videamur, si fortasse æger respuat *paracentesin*, excitetur in eo hujusmodi fonticulus, exhibeanturque simul res solventia diuretica, aut blande laxativa, ut si forsan per quoddam emunctorium deducere pus sponte vellet, natura, in subsidium ista opportune adhibita nanciscantur.

Langius.

Ptisana. *Art. 554.* Methodus ab Auctore Lexici Medici Gallice conscripti laudata, ut pus a cravitate pectoris per urinæ vias egrediatur, ita se habet. Æger primo utatur sequenti Ptisana.

℞. Sassaf. frustulatim incisi unc. j. inf. in aq. fervente dein parum bull. tum add. Heder. terr. Pulmonar. man. sem. iterum bull. parum & in fine add. Glycyrrh. par.

Deinde hauriat æger fumum ex decoctione fol. & flor. Tussilag. aqua incoct. ter in die, quod, ut facilius exequi possit, caput ejus tela laxæ deorum fluctuante obtegatur. Hujusmodi remedium seu suffumigium prodest tantum, ubi absces-

abscessus pulmonem occupet, pro quo interim bis in die sequens decoctio propinari jubetur.

℞. *Fol. Tabac.* ʒj. *aq. unc.* xiv. *bullæ parum*, *Alia decoctio.*
dein probe tecto vase infusio in loco frigido relin-
quitur. Hujus dosise est unc. j. vel bina cochlearia,
addunturque ol. tartar. p. d. gutt. jv. singula vice.
Decoctio hac tepide hauritur.

Adhiberi etiam cæpa squill. post aqua cocta, cujus decocti cyathus mane, & vespere ægro propinatur. In aquæ mensuram h. e. unc. xvj. cæpæ squillæ unc. iv. ebulliendæ injiciuntur. Si cancri fluviatiles facile comparari possunt, eorum tres vel quatuor cum jure incoquantur in quo Agni vel Vitulli caro aut Bovis splen cum macriori pullo, hordeo, & caricis infarcto, ebullit. Nec affirmare erubesco, quod si diu in hoc regimine persistatur curationem prosperum exitum obtenturam. In alvi stipticitate clysteres injiciuntur ex furfuris decocto, cum salis culinaris pugillo.

Art. 555. Mox ac comperietur febrem desisse, aliaque symptomata conticuerint *Lactis* Lac ægro *usus.* sequenti ratione temperatum porrigetur.

℞. *Rad. scorzonæ. fol. scabios. bord. integr. ana*
man. j. aq. font. ℞ iv. sem. bull. per horæ quadran-
tem, dein tantumdem lactis adde cremore suo bul-
liendo scorsim exuri, & in hac mixtura dissolve
mellis optimi q. s. ad gratum saporem.

Art. 556. Potio hæc mane stomacho jejuno, *In Para-* atque vespere trihorio a cena propinatur, quæ *cer. si* insuper in Rheumate, Siccitate pectoris, & ca- *noranda.* tarrhis excellit.

Supra recensita Empyematis signa non solum ad cognoscendam morbi naturam dirigant; verum etiam connotant utrum operatio perforationis sit necessaria. Nam inutilis quidem esset in pulmonum Empyemate ubi Thoracis perfo-

ratio ad materiæ evacuationem incassum adhiberetur, excepto tamen si abscessus pulmonum superficiiei insideret, absque eo quod viscus pleuræ adhæreat; quo casu abscessus ad locum doloris exactissime correspondet. Quodsi abscessus profundiora teneat, nec dolore fixo ad hunc ipsum locum correspondente patefcat, tunc operatio frustranea prorsus ac inutilis foret.

Præcipua in hac operatione cautio est, ut commodior situs eligatur pro faciliori materiæ fluxu. Etenim in Empyematis casu duo in Thorace notantur loca, ubi perforatio institui potest utiliter; alterum, puta, *necessitatis* alterum electionis; necessitatis illud quando apostlematis situs, ut in abscessu pleuræ, aut in eo pulmonum eidem pleuræ adhærentium, evidentissime ad externa apparet: electionis alterum quando nihil magis determinat, ut in uno potius quam in quovis alio loco perforatio instituat. Hoc vero casu commodior situs eligitur h. e. ad posteriorem inferioremque Thoracis partem inter tertiam quartamque spuriam costam numeratione ducta ab inferiori ultima cum distantia quinque transversorum digitorum a spina dorsi. Si operatio hæc habenda sit in ægro admodum pingui, vel qui insigni teneatur emphysemate adeo ut metus sit ne costarum numerus rite supputetur, tunc necessarium erit angulum inferiorem Omoplastæ quærere, & infra eum ad quatuor digitos transversos, & procul a spina dorsi quinque digitos perforare.

Observandum item est in iis diuturno pectoris morbo, & longa pleuritidem vexatis diaphragma insensibiliter costis adhærere, adeo ut ad tertiam quartam, & quintam usque ascendat, maxime si frequentior respiratio fuit, & concitata. Ideo quærendum est diligenter de situ doloris,

loris, atque hoc illud est antequam operatio suscipitur, quod accurate cognosci debet.

Quando pleura, in eo situ, qui post inflammationem in abscessum abiit, pulmonibus adhæret, pus, quod tunc ad diaphragma usque descendere nequit, erosio intercostalibus musculis viam sibi quandoque ita expedit, ut externum tumorem quoque efformet, quo disrupto evacuatur; sicque ex prava causa salubris effectus producitur.

Quantum deum ad modum, quo perforatio absolvi debet, unde puri, sanguini, vel aquæ a Thoracis cavitate contenti exitus expeditur, consulendi sunt hac de re, tum etiam de iis quæ postmodum peragenda sunt, doctiores Chirurgiæ Scriptores in primis vero Neoterici: quales sunt *D. Verduc, Dionis, la Charriere*, sed maxime *D. Garengot Tom. II. cap. 6. pag. 376. & seq. secund. edit.*

PHRENITIS & PARAPHRENITIS.

Hippocratis sententia.

Art. 557. **P**Hrenitis ubi apprehenderit febris *Phreni-*
 primum debilis detinet, & dolor *tidis*
 circa præcordia maxime autem dextera, ut ne *Diagno-*
 contingi quidem permittant; mente moventur *sis.*
 ægri, & intentis oculis vident, & alia similia
 faciunt his, qui peripneumonia affecti mente la-
 borant; nam quemadmodum facilis est transitus
 a pleura ad pulmones, sic ex pulmone ad phræ-
 nes: sive ad septum transversum (seu diaphrag-
 ma). Cum autem quarta aut quinta dies ad-
 venerit, febris fortior fit, & dolores augeſcunt
 & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur.
 Si hic morbus a mota bile veniat visceri-

bus, & septo transverso insidente, judicatur brevissimus septima die, longissimus undecima, quem effugiunt pauci, transitque etiam in peripneumoniam, & si transferit pauci effugiunt.

Prognosis mala. *Art. 558.* A pleuritide in peripneumoniam atque inde in phrenitidem malum est. Urinæ decolores nigra innatantia in medio habentes Phrenitidem cum vigiliis, & turbatione significant. Stillatio e naribus in hoc morbo perniciofa, tum alias, tum si quarto incœperit die, nec non malæ sunt egestiones alvi albæ. Phrenitici parum bibentes, strepitum valde percipientes, tremuli aut convulsi fiunt. Tremores autem hic sunt lethales. Mansuetudo in principio, & frequentes permutationes convulsoriæ, & alvi profluvium rubicundum mala sunt. Quicumque supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita valde sanescunt: minus enim periclitantur quorum naturæ, & ætati morbus affinis fuerit. Floccos de vestibis evellere, aut paleas de pariete detrahare lethale.

Prognosis bona. *Art. 559.* Cum phrenitide atrabiliariis occupatis si hæmorrhoides oboriantur, bonum. In hoc morbo insomnia evidentia bona. Tanto minor insania, & delirium fit, quanto paucior & debilior est bilis quam pituita.

Curatio nis methodus. *Art. 560.* Hoc morbo affectum calefacere oportet calefactionibus humidis, & potionibus excepto vino; mollito enim corpore, sudor quoque magis sequitur, & alvus & urina secedit. Caput multa calida lavare conducit, & si quidem fieri poterit sursum purgare, & per tussim ac spuitionem educere oportet quemadmodum in peripneumonia, sin minus inferna alvus præparanda est, ut egerat. Morbus autem lethalis est; moriuntur enim tertia, aut quinta, aut septima die, si vero leniter corripiat veluti peripneumonia judicat.

Ballonii sententia.

Art. 561. In doctrina Hippocratis triplex phre- Phreni-
tis tri-
plex.
 nitis reperiri potest. Una vera in inflammatio-
 ne, & alteratione cerebri posita; altera impro-
 pria quæ obscura dicitur, quæ in alienatione
 temperamenti cerebri, non solum in alteratio-
 ne consistit, & eo modo se habet ad cerebrum,
 quo febris hectica ad corpus febrile & hecticum,
 unde in Proorrh. ait Hipp. Tremulæ, blandæ, ob-
 scuræ, & contrectantes desipientiæ valde sunt phre-
 niticæ; tertia etiam impropria est, ut quum
 quis phreniticus quidem est, sed non valde in-
 sanat, nec ea facit, quæ vere phreniticus; id por-
 ro fit, quoniam præter humorem biliosum de-
 sipientiam facientem, est crassus alius & frigi-
 dus, qui inducit aliquid comatodes; unde ite-
 rum Hipp. 3. Epid. Nullus phreniticorum vehe-
 menter insanivit, velut aliis usuvenit, sed alia
 quadam veteriosa in somnum inclinatione capite
 gravati peribant. Et hi phrenitici obscuri vo-
 cantur, & id sæpe vulgo ignotum, & medici Phreni-
ticorum
desipien-
tia pes-
simæ.
 eos demum vocant phreniticos, qui clamant,
 & exsiliunt. In obscura ea (Phrenitide) vi-
 riū languor est, & hectica quædam affectio
 Phrenitidis: Iddem contingit, quod lanis tinctis,
 quæ colorem non deponunt, ita quidem hæc af-
 fectio cerebro impressa hectico modo vix elui
 potest, quare Hipp. memorat. Quibus convulsis
 oculi fixi relucet, non apud se hi sunt; & diu
 ægrotant.

Art. 562. In lib. Paradigmatum hunc habet Phreni-
 casum: Nobilis phreniticus per novem dies de-
 cubuerat. Nulla arte conciliatur somnus, circa Phreni-
ticus qua-
si mira-
culo sa-
nitate re-
 nonam noctem omnia exacerbata. Exsiliēbat,
 & medico affidenti manum afferre volebat. Astituitur.

ministris in lectum conjectus est, fingit se dormire. Inopinato e lecto surgit, & e sublimi fenestra, in medicum, qui in area stabat, incidit præceps. Miraculo sanitati restituitur. Putant casu discussam materiam, copiosæ urinæ fluxerunt, simile quid apud Hipp. lib. 5. Epid. Cui-dam crurum rigor erat, & diuturnus: forte in lapidem cecidit, læsum caput est, vertigo obor-ta est, desit malum vetus.

*Veterno-
sa phre-
nitis du-
plex:*

Art. 563. Et in Defin. Medic. Ut plurimum phrenitidem contingit esse conspicuam, ut quum ægri ejulant, vociferant, floccos carpunt, mordent, prosiliunt, aperteque delirant. Est & alia in qua delirii quidem summa sunt omnia, sed manifestis illis notis sese produnt minime. Et ea sæpe cum veternosa est affectione, quæ si non adesset æque petulantes, vehementesque ægro-tantium impetus forent. --- Porro veternosa af-fectis bifariam adesse potest.

Art. 564. Vel pituita cerebrum occupante per se aut cum alio humore: unde part. 1. lib. 1. *Proreb. sect. 1.* Dum, ait, malum esse si comatofi phrenitici quarto die exacerbantur, signifi-cat, ait Galenus, jam non a sanguine malum esse: quia si illud sanguis adduxisset, verissimile esset, aut natura juvante, aut Medici ope co-piam sanguinis detractam diminutamve esse: tunc autem cum quarto die, quo malum ces-sare debet, illud increascit, dominantis pituitofi humoris argumentum est.

Art. 565. Secundo modo veternosa quodam-modo phrenitis esse potest per alienationem tem-peramenti, humidique absorptionem novo quo-dam affectionum successu; Itaque subindicat Hipp., obscure tamen, delirium bifariam suc-cedere posse aut alterato tantum cerebro, aut alienato. Alienatio autem alteratione longe de-terior

terior est. Atque talem phrenitin cum parvo pulsu languido ac angusto existere asseverat Galenus *in Comm.*, oppressa nimirum jacente, ac fatiscente facultate. Et qui assident ægris, dum ægrum non dimoventem se vident ac taciturnum, brevi cum eo bene actum iri credunt, quum mors tamen proxima inflet.

Art. 566. Si in ardente febre aurium sonitus cum caligine, proveniatque in naribus gravitas, mente ex melancholia ægri aberrant. Galenus hunc Hipp. locum explicat de febre ardente cujus focus est in cerebro propter collectam in eo bilem, quæ inflammationem excitat. Eaque febris distinguitur ab altera, quæ fit non coacervata in cerebro materia, sed in venis inferioribus reside, a qua flatuosa exspiratio suscitatur, delirium excitans. Nam cujus febris ardentis materia in cerebro mansionem habet, ea continuam habet desipientiam, & symptomata non ita sunt fugacia. At quæ ardens febris materiam habet in aliis partibus, non habet desipientiam assiduam. Prior febris phrenitidi simillima est ob symptomaton cognationem. Sed in phrenitide symptomatica, ea est febris, quæ adest. Præterea, ardens febris primario cerebri affectu contracta fere statim infilit, apparetque. Phrenitis non tam cito, sed tempore acquiritur. Ita enim Galenus phrenitis, ait, paullatim accidere solet, non autem quiescere subito, atque confertim. Immo ne in declinatione quidem febris deliria quiescunt, quod aliter contingit in iis febribus, quarum deliria sunt symptomata tantum, prout enim mansuescit febris, ita & deliria.

Phrenitis symptomatica & idiopathica.

Celsi Sententia .

*Phreni-
tidis de-
finitio.*

Art. 567. *Phrenitis* a Græcis dicta, insania est acuta, & cum febre. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione ægros desipere, & loqui aliena. Quod non quidem leve est, neque incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen æque pestiferum est. Nam plerumque breve esse consuevit, levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre præceptum est.

*Plenior
ejusdem
descri-
ptio.*

Art. 568. *Phrenitis* vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum æger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit; Perfecta est ubi mens illis imaginibus addicta est. Ejus autem plura genera sunt. Siquidem ex phreneticis: alii hilares, alii tristes sunt, alii facilius continentur, & intra verba desipiunt, alii consurgunt, & violenter quædam manu faciunt: atque ex his ipsis: alii nihil nisi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, summamque spem sanitatis in captandis majorum operum occasionibus prebent, sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu peccant, onerare asperioribus coercionibus supervacuum est; Eos vero qui violentius se gerunt, vincire convenit, ne vel alteri, vel sibi noceant. Neque credendum est si victus aliquis, dum levare vinculis cupit, sanum jam se fingat, quamvis prudenter, & miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanien-

Methodus me-

*endi, &
regimen.*

Art. 569. Fere vero antiqui tales ægros in te-
nebris habebant, eo quod eis contrarium esset
exter-

CAP. II. *Phrenitis & Paraphrenitis.* 263

exterreri, & ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant. At *Asclepiades*, tamquam tenebris ipsis terrentibus in lumine habendos esse dixit: neutrum tamen perpetuum est. Alium enim lux, alium tenebræ magis turbant, reperiunturque, in quibus nullum discrimen apprehendi vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est utrumque experiri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce, eum, qui illum, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, æger si vires habet loco lucido, si non habet, obscuro continendus est.

Art. 570. Si vires ægri patientur, sanguis mitti debet. Nec minus deliberari potest an alvus ducenda sit: tum interposito die convenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fovere, in qua verbenæ aliquæ incoctæ sint, vel ex reprimen-
De san-
guinis
missionē
aliis re-
mediis
capiti
admo-
vendis.

tibus: aut prius fovere, deinde tondere, & iterum fovere, ac novissime rosa caput, naresque implere, offerre etiam naribus rutam ex aceto contritam, movere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Si vero virium imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpillio, similique aliquo madefaciendum est.

Utiles etiam in quibuscumque viribus herbæ duæ sunt, *Solanum*, & *Muralis*, simul ex utraque succo expresso caput impleatur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est, parcius tamen in his, qui nimis hilares, quam in his, qui nimis tristes sunt.

Art. 571. Adversus omnium autem sic infan-
Quæ ad
ægri ani-
mum spe-
ctant.

nientium animos, gerere se pro cuiusque natura necessarium est. Sæpius assentiendum, quam repugnandum est, paulatimque, & non evidenter ab his, quæ stulte dicuntur, ad meliora mens ejus abducenda est. Interdum etiam elicienda ipsius intentio, ut sit in hominibus stu-

diosis litterarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit.

*Vigilia
tempe-
randa.*

Art. 572. Omnibus vero sic affectis somnus, & difficilis, & præcipue necessarius est. Sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam crocinum unguentum cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant hi, quidam somnum moliantur potui dando aquam, in qua papaver, aut hyoscyamus incoctus sit; alii mandragoræ mala pulvino subjiciunt; alii vel amomum, vel cynamini lacrymam fronti inducunt. Neque alienum est, si neque sanguis antea missus est, neque mens constet, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam admoveere. Quæ quia levat morbum potest etiam somnum facere.

*Cibus
quid.*

Art. 573. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda. Nam neque implendus æger est, ne insaniat, neque jejunio utique vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. (Cardiacum morbus est contrarius Phrenitidi ex nimia imbecillitate corporis, quod stomacho languente, immodico sudore digeritur) opus est autem cibo infirmo, maximeque forbitione, potionem aquæ mulsæ, cujus ternos cyathos bis hyeme, quater æstate dedisse satis est.

Tralliani sententia.

*Phreni-
tis ex-
quisita.*

Art. 574. Phrenitis exquisita a flava bile nascitur eamque præcedunt vigilæ continuæ, & intensæ, somnique turbulenti, ægri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiam nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præcedit etiam, ut ægri, quæ dicuntur, obliviscantur. Item cum res-

pon-

pondent ferociore ac iracundiores, quam prius apparent, magnam, & crebram respirationem edunt, pulsus habent parvos, & duos, atque occipitio frequenter indolent. Quod si affectus increverit, fixis oculis cernunt, eosque admodum squallidos, & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit, ac lacrymæ ex utrisque profluunt. Si vitium magis intendatur, incipiunt & floccos carpere, & festucas legere, neque responsionem manifestam dare possunt, & linguam multo magis scabram habent, febresque sicciores, interdum & tremuli sunt, & ægre sentiunt, ut etiam cum excitentur vix aut nequaquam exaudiant.

Art. 575. Phrenitis spuria seu falsa a mixtione bilis cum pituita oritur. Hac detenti vigilant simul, & in altum somnum deferuntur, No ha
seu spu
ria. rursusque paulatim delirant, & somno alto, soporosoque oppressi cum tumultu excitantur, & iis, qui eis loquuntur inordinata verba, & insaniam testantia respondent.

Art. 576. Phrenitis inveterata ea est, ob quam Invete-
rata. ægri, per initia quidem turbulenti fiunt, & furibundi, tanquam bile statim ad superiora tendente, & cerebrum excitante, postea autem hecticis febribus ferè detenti æquabili temperie in totum cerebrum dispersa, non amplius valde perturbantur, & inordinata, furiosaque nugantur, sed jacent, neque vocem edere propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram mutant, neque valide exilientes, manus solummodo inordinate jactitant, nonnulli autem ipsorum ne palpebras quidem, propter vires jam ante debilitatas aperire possunt. Sin autem aliquando etiam aperiant, ubi paulisper respexerint, statim rursus propter infestantem humorem connivent. Pulsus hic maxime imbecillus est, durus, exiguus, & angustus, Art.

Phreni-
tidis cu-
ratio.

Art. 577. In omnibus Phreniticis si vires robustæ sunt, & nihil aliud prohibet, sanguinis detractio adhibenda est tanquam primum omnium, & maximum futurum præsidium. Sin autem repugnet æger, quod sæpe accidit, ut nolit brachium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta in fronte vena sanguinis missionem moliri. Deinde caput refrigerandum commendat, & vigilias excindendas. Non solum autem vigiliis sed etiam feбри mederi debet. Balnea item profunt a quibus in posterum delirio, & affectu febrim incendente liberantur. Sin autem vires imbecillæ fuerint tunc maxime vitabis, inquit, ne quid corpori somnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam in his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, immo interdum mors talium potionem comitatur.

Villisi sententia.

Phreni-
tis quid.

Art. 578. Phrenitis est desipientia continua, scilicet principum cerebri facultatum depravatio ab inflammatione meningum orta cum febre synocha. Huic morbo affinis Paraphrenitis dictus est diaphragmatis inflammatio.

Phreni-
tidis
causa.

Art. 579. Phrenesin potius feбри succedere, & quia sanguis effervescentis recrementa sua adusta capiti transfert, produci, Hippocrates olim, & nunc quisquam vel e plebe observat; in quantum, scilicet, febricitantis urina a turbida, & crassa, in tenuem & aquosam mutata Phrenesin imminentem indicat; cujus idcirco affectus causa exinde colligitur, esse *materiæ febrilis* in cerebri metastasis.

Quale
morbi

Art. 580. Ex dissectionibus patet Phrenesin non
a me-

CAP. II. *Phrenitis & Paraphrenitis.* 269

a meningum inflammatione oriri, neque Paraphrenesin diaphragmatis; sed Phrenitis definiri potest; *totius animæ sensitivæ sive spirituum animalium, quoad totam eorum hypostasim, phlogosis sive inflammatio;* & prout incendium vel a cerebro tantum, vel ab hoc simul & cerebello incipit, vulgo in *Phrenitida & Paraphrenitida* distinguitur, quod tantundem est ac functiones animales spontaneas fere tantum & potissimum, aut una cum his vitales lædi.

„ Phrenitis (inquit *Lommius*) his signis innoscit; febris urget acuta, atque continua, continuusque mentis error, modo his, modo aliis animæ vitalis actionibus; expeditus in omnem audaciam homo est, & vicissim tum vigiliis, tum somno difficili, turbulentoque impeditur, sic ut interrupta quiete protinus cum impetu e cubili profiliat, vociferetur, ferociat, ac modo ploret, modo cantet, verbaque sine sensu, sine ordine proferat, interrogatus ab alio omnia aliena respondeat; oculi sunt mobiles, flammei, cruenti, squalidi, quos æger crebro perfricat, modo ficci, modo lachrymis perfusi; lingua aspera & nigra, dentes strident, sæpeque cruor e naribus aliquis fertur, & interdum posteriora capitis dolent; item manibus tremit, digitisque flocos vellit, & festucas e stragulis legit; urina est tenuis flammea, interdum etiam (quod pessimum) tenuis albaque est.

Art. 581. Phrenitis, aut brevi tempore in salutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut diu protracta & post febrem superstes, demum vel sanatur, vel in alios morbos, nempe, *lethargum*, aut *maniam*, aut *melancholiam* transit, vel demum in *desipientiam perpetuam*, fracto, scilicet, (quod ajunt) cerebro.

Art.

Curatio. Art. 582. Si Phrenitis in principio febris acci-
dat, *venasectio* locum habet, & *enemata* sunt præ-
cipui usus, cataplamata pedibus admoventi de-
bent ex *fol. rut. cham. verben. rad. brion. flor. pa-
pav. errat. cum sapone*; vel eorum loco *columbæ*
vel pulli dum calent discissi; pro siti restringen-
da bibat *Palmarii* potum divinum, scilicet *a-
quam fontan. cum succo limon. & sacchar.* vel e-
mulsiones; *hypnotica* sunt caute usurpanda; in
hoc affectu *placenta rosacea* vel *flores papaveris*
cum aceto & nuc. moschat. capiti & temporibus
cum fructu applicari potest.

Boerhaavii sententia.

Vera vel symptomatica. Art. 583. Phrenitis est vel *vera*, ubi cerebrum
vel potius illius meninges utraq; primario in-
flammatione afficiuntur cum delirio & febre acu-
ta conjuncta, vel *symptomatica* ex metastasi ma-
teriæ febrilis in cerebrum.

Eventus. Art. 584. Phrenitis *vera* 3^o, 4^o, vel 7^o die
necat, vel abit in *maniam*, *lethargum*, *coma*,
catochen; A *peripneumonia* & *ileo* lethalis; a *va-
riolis* admodum mala.

*Indicationes curati-
va.* Art. 585. Hæmorrhagiæ quandoque morbum
solvunt. In Phrenitide vera prodest *venasectio* lar-
ga. „ Immo in hoc affectu (inquit *Dolaus*) ar-
„ terioromiam in temporibus institutam commen-
„ damus. „ Indicantur *diluentia* ex decoctis, *an-
tiphlogisticis* & *nitrosis* affatim exhibitis, *laxan-
tia* & *clysmata*, *capitis rasura*, *epispastica*, *cucur-
bitæ* in partibus inferioribus.

sectio Art. 586. Certe in Phrenitide (inquit D. Fre-
vena ju- „ ind) quæ febribus supervenit, sectionem vene
gularis. „ jugularis quam maxime efficacem esse expertus
„ sum, cum alia remedia minus commode res-
„ ponderint: neque efficacem tantummodo, sed

„ & adeo tutam, ut valde mirer aliquid de ef-
 „ ficiendi difficultate; nedum periculo apud scri-
 „ ptores inveniri; nam hæc vena, uti nullo fe-
 „ re labore secatur, ita & secta facillime o-
 „ mnium sanescit. (Frequentissime etiam in
 „ aliis capitis morbis gravioribus in praxi mea
 „ jugularem secui.)

Art. 587. Paraphrenitis est morbus *Pleuritidis* *Para-*
 similis, ubi diaphragma vel saltem ejusdem mar- *phreni-*
 go vere inflammatur; & longe frequentior est, *tis quid.*
 quam vulgo creditur; cognoscitur ex febre con-
 tinua; dolore inflammatorio in inspiratione ma-
 xime urgente; hinc respiratio sublimis, celeris,
 suffocativa, delirium perpetuum, convulsio, fu-
 ror, gangræna, (symptomata omnia atrociora
 quam in *Pleuritide*); & licet totum malum co-
 gnitum sit, insuperabile tamen.

Etmulleri sententia.

Art. 288. Phrenitis moderno usu vocabuli est
 delirium intensissimum membranarum cere- *Phreni-*
 bri inflammatione ortum cum febre peracuta; *tis affe-*
 veteribus *Sphacelismus* seu *Sphacelus cerebri*; est *ctus.*
 malum ut plurimum lethale, 3^o, 4^o, vel 7, die *plerum-*
 interficiens; Lethalem phrenitidem denuntiant *que le-*
 dyspnœa, facies cadaverosa, sudor syncopticus, *thalis.*
 lingua & manus tremulæ; stridor dentium, stil-
 licidium narium, &c. si in principio morbi acuti
 de dolore in bulbis oculorum conqueruntur æ-
 gri, funestissimum est signum, mox enim *deli-*
rium & *convulsiones* aderunt, quod sæpius obser-
 vavi; convulsiones superveniunt, quando inflam-
 matio cerebri incipit abire in gangrænam.

Art. 589. Cura nil habet peculiare præ cura *Cura.*
 in febre acuta cum delirio; *Tinctura papav.*
rhæad. effervescentiam sanguinis compescit; item
 cam-

camphora & nitrum; quando ab alio morbo pendeat, curato morbo primario delirium cessat; ideoque *sudorifera & alexipharmaca*, sunt propinanda, in *tinctura bezoardica*; &c. In febre ardente decoctum *tamarind.* *epithemata* etiam plantis pedum conducunt.

Acida, *Art. 590.* „*Blandiora acida & cinnabarina*
Gr. „*cum emulsionibus* inter interna remedia omne
 „*tulerunt punctum in phrenitide ex præcepto*
 „*Vvaldschmidii.* „

Septalii sententia.

Phreni- *Art. 591.* Vix in Phrenitide lenienti per os
ticis sta- assumendo, ad deturbanda excrementa, in pri-
zim vena mis viis existentia, prima die locus datur, sed
secunda. molli clymate injecto, si ejus etiam commodi-
 tas detur, mittendus est sanguis, secta in bra-
 chio vena: cum enim influxus jam desierit,
 aut majori ex parte factus sit, frustra hoc au-
 xilium revulsorium tentamus.

Cave autem ne in Tralliani, & aliorum errorem incidas, qui cum ob maniacos motus sanguinem e brachio detrahere nequeant venam frontis secant; si enim copia adsit sanguinis in laborante, ut in hujusmodi morbo majori ex parte contingit, tantum abest, ut laboranti opem feras, ut potius, attracto ad laborantem partem sanguine, morbum adaugeas: revellendus igitur potius, aut scarificatis cucurbitulis, aut, quod melius esset, venis sedis apertis.

Sed san- *Art. 592.* Neque etiam in hoc casu ad animi
guis non usque deliquium mittendus est sanguis, quod
mitten- plerisque placuisse video; quod, cum repellen-
duſq; tibus frigidis ab initio etiam usi simus, refrige-
ad ani- rato toto, ac a capite retracto adeo multo san-
mi deli- guine calido, sæpenumero, aut phrenitis hecti-
quium.

ca inducatur curatu impossibilis, aut lethargus subsequatur.

In vena frontis secanda adstrictio illa gulæ, quæ fit, ut vena intumescat, aut non multum sit violenta, aut quam brevissimo tempore perficiatur; ne quodammodo ad superna repulso sanguine, ubi ad cerebrum, & meninges pervenerit, morbum adaugeat, aut sane, eodem incrassato, magis contumacem efficiat.

Art. 593. Cucurbitulæ quæ bregmati, fronti, & reliquis capitis partibus, post evacuatum corpus affiguntur, ad extra trahendam materiam, *Post appositas cucurbitulas quid faciendū?* arentes non sint, & cum flamma, sed ex aqua calida, nec longiori tempore hæreant; & si subjacens pars in ruborem abierit, leviter eam scarificabimus; sin minus, spongiis ex aqua tepente substratum, & elevatum locum fovebimus.

Art. 594. Cavendum in hoc morbo, ne in eorum *Alvus purganda ab initio.* er orem incidamus, qui ab initio non esse purgandum censent, sed expectandam esse coctionem, maturatio magis putredinem jam factam supponit, quam corrigat; quo tempore, facto jam apostemate morbus evinci vix potest: eodem igitur vel altero die purgandum &c.

In iis qui alvo duriori sunt, rhabarbaro non ita facile utendum: si enim simul cum bile non educitur, effervescentem magis bilem reddit, facillimeque supernis partibus ob igneas partes communicari solet; & ob hanc unam causam Avic. grana quatuor, aut sex scammonii medicamenti ex rhabarbaro indidisse in phrenitide curanda censendum est quidquid dicant Græculi quidam, acriores Mauritanorum scriptorum reprehensores.

Art. 595. Quamvis in hoc omnes fere con- *Repellentia aliquando adhibenda.* veniant simpliciter refrigerantibus, solisque repellentibus prima tantum die esse utendum, ut

repellatur influens succus, æstus, & partis, & influentium humorum temperetur, dolor sedetur, & afflictæ parti robur addatur, sequentibus vero diebus miscenda esse aliqua resolventia; sæpissime tamen aliter faciendum esse, quod urgeant in augmento adeo symptomata, æstus, dolor, vigilia, & mania, ut frigidissima etiam progressu temporis in usum duci debeant Aretæus admonuit.

Cavendum tamen ne nimis assidue iis utamur frigidissimis, aut narcoticis: nam dicebat Aver. 3. *Collect.* 3. caput tuto calefit, at non citra pericula refrigeratur; periculum enim impendet; ne quem dormire volumus, postea excitare non possimus, ut ait Celsus: sæpe enim in lethargum calamitosum abire solent, ex sola mala curatione phrenitidis.

Externa qualia? Art. 596. In topicis etsi acetum in aliqua portione admisceri expediat, ut & refrigeret, repellat, & penetrationem adjuvet; neque tamen multum admiscendum est, ne ficcatione vigilias concitet; neque acrius, quod calidæ partes, & siccæ nimium prævaleant.

Neque tamen placet, quod a plerisque recipitur, ut aceti loco, acido citri, aut limonum utamur; nimium enim adstringit, & ob acerbas terrestresque partes neque pervadit, neque admixtorum penetrationem adjuvat: quin imo externos meatus constringendo, resolutionem humoris, aliis temporibus omnino impediet.

Inter legendum & observandum ex Schömberg.

Phrenitis vocatula. Art. 597. Videtur usum apud Medicos veteres obtinuisse, ut partis affectæ nomini adde-
rent terminationem *iris*, quando inflammato-
rium

rium in primis ejusdem partis morbum designare volebant, uti patet in Phrenitide, Hepatide, Nephritide, &c.

Nihil magis periculofum, quam si solis radiis exposito capite quis dormiat. Memini (inquit *Van-Svieten*) binos Mefiores, faniffimos certe, & robuffiffimos, intra binarium fic periffiffe, dum fceni acervo incumbentes, nudocapite meridiano foli exposito obdormiviffent. *Ejus or-
tus ex
solis ra-
diis.*

Durum & nervofum Phreniticorum pulfum effe, monuit Galenus, quandoque etiam tremulus undofus, & inæqualis. *Pulfus
in ea
quid?
Progne-
fis ex
oculis.*

Art. 598. Phrenitis non poteft effe fine inflammatione membranarum cerebri; inflammatio autem membranarum cerebri poteft effe fine delirio. Lacrymæ altero tantum oculo, vel ex utrifque, acres, paucæ, denfæ, eorum angulis adhærentes, peffimi funt ominis, tum quia minimum liquidi, tum quia argumento effe poterunt, ipfas non per fecretionem naturalem effluere, fed potius villis erofis, aut laffatis, adeoque corpore jam ad diffolutionem tendente.

Art. 599. Omnes homines qui difpofiti funt, ut facile incidant in Pleuritidem, & Peripneumoniam, facile Phrenitici funt. *Quæ at-
fponant
in Pleu-
ritidem.*

In omnibus morbis, ubi primus impetus febris incipit habere fomnum turbulentum, cogitate, quod adfit levis incipiens inflammatio, hæc fi per dies aliquot porrexerit, dabit perfectam Phrenitidem.

Si videam (inquit Boerhaavius) ægrum, & rogem, quomodo vales? & respondet. Quid tua refert? certi eftote, quod tum intra unam horam erit ferox, hoc Medicum monere debet, ut tum adhibeat medicamenta contra Phrenitidem nondum natam.

Omnes morbi capitis qui ab inflammatione intestinorum ut causa, sunt pessimi.

Si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conqueruntur ægri funestissimum est signum, mox enim delirium, & convulsiones aderunt; convulsiones superveniunt quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam.

Ratiocinatio funditus tollitur in dementia; imminuitur in stultitia; depravatur in delirio.

*Quæ
eamdem
præce-
dunt.*

Art. 600. Tria sunt quæ phrenitidem præcedere solent. Primum est, agitatio calidorum humorum, secundum est, eorum raptus in caput; tertium & postremum est, eorundem humorum malitia, propter quam naturæ imperio inobedientes existunt.

*Pregno-
ses.*

Art. 601. Malum si phrenitis mutetur in lethargum, non ita si lethargus in Phrenitidem.

In delirio si superveniat alvi fluxus, præsertim morbo ad coctionem tendente, solvit illud: sæpiusque vidimus ægros deliros, inquietos, & anxios diarrhœa superveniente, sequente die in melius abiisse.

Alvi fluor prodest in hoc morbo, non quod morbosam materiam evacuat solummodo, sed etiam, quod dum humoribus huc ruentibus viscerum abdominalium vasa deplentur, & sanguini impulso minus resistunt, impetus & humorum copia pulcherrime a capite avertitur, quod magni momenti est, in curatione Phrenitidis. Hic morbus citissimam validissimorum remediorum applicationem requirit, cum ex sua natura adeo periculosus, & cito lethalis sit.

Maximi momenti in praxi est, ut in cura Phrenitidis symptomatice attendatur ad Genium morbi primarii ex quo orta fuit Phrenitis. Lingua nigra in acutis fere semper post se trahit delirium.

Febres ardentes semper habent urinas tenues, & coloratas: hinc si tales urinæ sunt albidiores, tenuioresque, & adsint vigiliæ, oculorum perturbatio, lingua balbutiens, &c. prognosticare poteris brevi futurum delirium.

Si Phrenitici sint phlegmatici, furor non admodum vehemens, viresque corporis infirmæ, non est dandum *Diacodium*: nam in istis casibus semper nocet, interdum perniciofa sunt opiata.

Urinæ subjugales i. e. crassæ, & turbidæ in acutis morbis fere semper morbos capitis post se trahunt: si cum talibus urinis vigiliæ sæviant, dolores capitis, lingua arida, & ardores viscerum: prognosticato adsistentibus brevi delirium futurum.

Art. 602. Curatio ad morbum, vigiliæ, & *Phrenitidis* urinæ suppressionem est obvertenda. In illo *methodus illustrativa* vix sectio est unicum remedium: sed & penna ad radicem instar stellæ effigiata, intra nares immissa, ac fortiter circumducta, copiosum aliquando eduxit sanguinem. Præterea hypnotica repellentibus admisceri, vel seorsim adhiberi debent. *Laudani opiatæ* gr. iij. in liq. convenienti, caute adhibita, ne phrenitis in veternum abeat, laudantur. Urinæ suppressio vel sponte, vel quod ægri reddere negligunt, accidere solet, & fomentis emollientibus tollitur. Habent in isto morbo usum *Lunæ potabilis Hartmanni* gr. vj. pondere, *Pharmacum Phantasticum Bartolini*, cuius dosis a drach. j. ad ij & *Spiritus terræ sigillatæ*. *Jonstonus Med. præct. lib. IV. art. 3.*

INFLAMMATIO VENTRICULI.

Art. 603. Morbum hunc cujus diagnofin omnes ferme veteres practici præteriere sub titulo acutorum morborum *Vene Concava* descripfiffe Aretæum comperio, Fridericum vero Hoffmannum ex recentioribus titulo *febris stomachica*.

Aretæi fententia.

*Inflam-
mationis
ventri-
culi Dia-
gnofis.* *Art. 604.* Nascitur & circa venam hanc, ad quam omnia gæstria vafa spectant phlegmone, quæ & ipfa fi magna fit, celeriter hominem tollit. Ignis enim acer mordaxque in ambabus cavitatibus inclusus accenditur, paucusque dumtaxat foris apparet, ut tangenti flamma tenuis esse videatur: æger vero sese comburi existimat: pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi: frigus adest extremorum, satis aspera oris ficcitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidum est: præcordia dura sunt atque revulsa: dolor in dextera parte major, & cum eo palpitatio in longitudinem ad ilia usque perveniens: quibusdam & arteria secundum dorsum inflamatur, quod pulsatio in alteris præcordiis manifestat: nam & ipsa venæ cavæ morborum particeps efficitur juxta illam in sinistro latere posita, utpote ea, quæ in omne corpus diducitur, nihil levaminis afferente neque cutim emolliente. Cutis autem sic affectorum squallida, rugosa ac aspera est: sed in partibus prominentibus atque osseis, ut in cubitis, genibus, digitorumque articulis magis talis conspicitur. Somni tumultuosi sunt, alvus quibusdam nihil reddit, quibusdam

dam exiguum, acre, biliosum. Lotium acre mordaxque est. Mens utique his constat, sed quadam segnitie torpet, & corpus tabe consumitur.

Art. 605. Quotquot hunc habitum viderunt, ^{Quos} causi, idest ardoris speciem appellarunt, quan- ^{corripit,} do quidem quæ adsunt, sub ardoris genere col- ^{et quan-} locarunt. Per Autumnum hæc labes exoritur, ^{do faci-} cum ferum quiddam & immane sapit. Viros ^{lius.} ac juvenes occupat, quibus mala vivendi ratio laboresque tenuem corporis habitum compararunt.

Art. 606. Decimoquarto die hi plerumque moriuntur. Quibus morbus diutius trahitur, du- ^{Prognosis.} plo longiori tempore pereunt. Quotcumque autem ob initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem, mortem quidem evadunt, sed nondum morbo liberantur. Hi longo sane tempore Causo laborant, verum omnia periculosa jam desinunt, dolores, præcordiorum distentiones, & pulsuum malitia, & mentis ignavia; adhuc tamen fastidiosi sunt, languentes, consilii inopes, simulque & ardor, & fitis, & linguæ orisque siccitas ægrum discrutiant. Multum diuque trahentes spirant, & subito totum aerem una spiratione refrigerandi causa adducunt. Veruntamen si frigidam quamplurimam affatim bibunt hi brevi intervallo molestia levantur, postmodum ipsis fitis accenditur, rursusque uberrime aquam ingurgitant, & hæc est mali successio, & reciprocatio.

Art. 607. At ægregius medicus frigidam li- ^{De potus} beraliter citra noxam propinare potest, ut in ^{usu ob-} aliis ardoribus usuvenit, sed longe tutius ardo- ^{servatio.} re a vena cava oriente laborantibus eam concesserit. Quodsi ventriculus aut vescica potam

aquam expellant, neque vomitione opus est; sin id facere nequeant, a multa frigida epota multum vomendum est. Homo enim disrumperetur si tanto bibito humore nihil aut per sudores, aut per urinam, aut per ventrem effunderet.

Pauli *Art. 608.* „ Verum in calidis stomachi in-
Ægineta „ temperiebus (Ægineta addit,) & ardenti-
senten- „ bus cum resolutione ejus vel animæ defectu,
ria. „ aut aliqua cibi fuga, nulla omnino occasione
 „ excepta, quam febris, aquam gelidam potui
 „ dato cum succo uvæ acerbæ, aut malorum
 „ cotoneorum decoctum, aut claviculæ vitis,
 „ aut seminis cucumeris jus, aut pulverem ip-
 „ sius ex aqua frigida. Stomacho præterea ve-
 „ sicam gelida aqua fartam, aut cucurbitæ ra-
 „ menta imposito. Catapotia item quæ extin-
 „ guendi sitim potentiam habent exhibenda
 „ sunt.

Curatio *Art. 609.* Venam itaque in cubito protinus
ex mente cedito, multumque sanguinis, sed non semel
Arctæi. totum mittito, immo & bis, & ter, & alio die,
 quo interim vires instaurantur repetito. Dein-
 cept cataplasmate utitor, & cucurbitulam præ-
 cordiis, ubi est arteriæ tensio, necnon, & inter
 scapulas, nam ibi quoque pulsationes sunt, af-
 figito, liberiusque scarificato, & multum san-
 guinis detrahito. Verum & alvus præter con-
 suetudinem valde suppressa ad lubricitatem per
 clysterum molliores infusiones est revocanda,
 acribus autem minime utitor. Extremas par-
 tes, pedes videlicet, & manus gleucino oleo,
 aut Sicyonio, aut ex adarce unguine excalefa-
 cito, nam partes istæ in ipsis valde frigescent.
 Præterea ante cibos potui dato, quæ lotium evo-
 cant, meon, assarum, absinthium, nitrum quo-
 que inspergito, sed omnium valentissima est cu-

curbita, & cinnamomum, si quis ejus copiam habeat. Lac istis & alimenti, & medicina vim præbet: etenim refrigeratione indigent: esto autem mulieris, quæ proxime peperit, & duobus lactis cyathis unus aquæ admisceatur; lac etiam babulum optimum est, tertio loco caprinum ponitur. Oportet etiam sudores elicere. Caput sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori, & sinistrae mæmæ, quale in syncopa, superdetur. Cibaria concoctu facilia præbeantur: In cubile rectus decubitus, ut omnia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. Exercitatio modica ad sudores evocandos nec non & balneum si æger interius exardescit.

Tralliani sententia.

Art. 610. Ubi stomachus inflammationem sustinuerit, magna opus est diligentia quia maximum morbum, & necessitatem corpori affert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus resoluta, & laxante medendi ratione utendum. Nam periculum non exiguum comitabitur, neque æger alimentum sentiet, neque appetere id amplius poterit.

Art. 611. Adjiciatur igitur una cum laxantibus, etiam corroborans aliquod, nempe absynth. paulum, aut mastichæ. Attendendum autem qua re opus sit; atque ejus copia intendi magis debeat. Si igitur laxantia requirantur, adjicito fotui etiam chainæmelum: sin autem ægri vehementer febricitent etiam gelucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeo laxantium aliquod fotui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynth. rosas, cenanthen,

*Curatio
caute in-
stituenda:*

*Indica-
tiones
cura-
tive*

then, mala, palmulas in vino macerans. Summatim ad id quod urget, roborantia, & laxantia, alias aliter augemus. Non solum autem fatus, sed etiam cataplasmata aliaque medicamenta usurpari debent.

Mercurialis sententia.

*Victus
ratio.*

Art. 612. In curanda ventriculi inflammatio ne primo victus ratio instituenda est, ut aer sit frigidus, & quiescat æger, maxime vero ut *Gal.* 13. *meth.* monet, tradenda est, ratio cibi & potus; nam ptisana est cibus omnium accommodatissimus, herbæ refrigerantes decoctæ, ut cichorium, lactuca, endivia, & omnia cichoreacea, panis in aqua lotus. Vinum omnino fugiendum est, & utendum, vel sola hordei aqua, vel aqua cocta.

*Venæ se-
ctio.*

Art. 613. Instituto victu prohibendum ne inflammatio augeatur, & studendum ut ea, quæ facta est auferatur. Circa quos scopos multa sunt notanda, & primo circa prohibitionem inflammationis conveniunt frictiones, cucurbitæ, venæ sectio. Sed notandum quod quamvis dixerit *Gal.* in omni inflammatione sanguinis missionem esse efficacissimum remedium, tamen in inflammatione ventriculi parcissime est evacuandus sanguis, nisi adfuerit magna plenitudo.

*Purgan-
tia.*

Art. 614. Circa secundum scopum notandum ante hujus morbi declinationem nullum evacuans medicamentum convenire, quoniam cum hæc medicamenta trahant ab universo corpore ad ventriculum, facile inflammationem augment. Quod si aliqua conveniat evacuatio, ut *Avenzoar* monuit, solus clyster sufficere potest.

Topica.

Art. 615. Notandum omni tempore convenire medicamenta simul mixta ex adstringentibus, & discutientibus, id quod docuit *Galen.* loc. cit.

qua-

quare extrinsecus erit componendum medicamentum ex ol. de absynth. cydon. rosat. chamomel. vino, mastice, ut scilicet materia discutiat, simulque robur ventriculi conserve-
tur. Intus vero accommodata est ptisana, succus cydoniorum, lac amygdal. dulc. & amar. syrup. ros. ficc. decoct. cortic. granat. cydon. chamomel. & tandem in omnibus medicamentis tum intrinsecis, tum extrinsecis, hunc scopum habeatis, ut simul adstringatis, & discutiat.

Art. 616. Desinente inflammatione poterit *Ulcerum*
aliquod lene medicamentum exhiberi; ut man- *curatio.*
na, cassia, tamarind. ut simul possitis alvum
solvere, nec attrahere violenter ad ventricu-
lum.

Art. 617. Quodsi ulcus ventriculum infestet, *Ulcerum*
primum studendum est, ulcus abstergere, dein- *curatio.*
de consolidare, & exsiccare, & ut summatim
dicam, omnia ulcera ventriculi eo modo tra-
ctanda, quo alia ulcera, illis tamen additis me-
dicamentis, quæ etiam robur ventriculi conser-
vare possunt.

Etmulleri sententia.

Art. 618. Inflammatio stomachi est affectus pe- *Inflam-*
riculosus; &, si quis alius, peracutus; adest fe- *matio*
bris ardens, & aliqualis tumor in præcordiis, *Ventri-*
circa Ventriculi regionem dolor insignis sub *culi.*
costis nothis, cum gravi æstu ibidem, siti inex-
plebili, corporis jactatione & vigiliis; superve-
niunt deliria, vomitus, & non raro convulsio-
nes lethales, raro evadunt; 3^o, vel 4^o die fi-
niri solet; interdum, sed raro, ad suppuratio-
nem tendit, & *abscessus* rumpitur, vel in Ven-
triculi, vel abdominis cavo, malum fere semper
incurabile.

Art.

Differe-
ntia
inter
Ventriculi &
Hepatis
inflam-
matio-
nem.
Curatio.

Art. 619. Distinguendum est inter *Ventriculi* inflammationem & *Hepatis*; in priore ardor & dolor magis in profundo sunt, in hepate inflammatione magis circumscripta est, & mitiora urgent symptomata.

Art. 620. Curatio eadem est, ac in aliis inflammationibus, viz. per *venesectionem*; &c. *Sudorifera* primatum obtinent. Externe convenit cataplasma ex *stercore columbino*, *fermento*, &c. ad suppurationem promovendam ad imitationem *Sennerti*. Vid. *Boerh.*

Friderici Hoffmanni sententia.

Defini-
tio.

Art. 621. Est igitur stomachica febris (ex inflammatione ventriculi) passio acuta, ardens & inflammatoria, oriunda ab inflammatione nervosæ, & membranaceæ ventriculi substantiæ universum nervosarum partium systema afficiens, & ob id admodum periculosa.

Signa.

Art. 622. Symptomata individui ipsius comites, e quibus ceu pathognomonicis signis, cognoscitur, sunt: vehemens internum incendium, summa anxietas, dolor gravis tensivus in præcordiis, maximeque scrobiculi cordis regione, sitis magna, vigilia, inquietudo, corporis jactatio, extremorum refrigeratio, pulsus subdurus, contractus, & frequens, vel etiam inæqualis, spiratio difficilis, creber conatus vomendi, & doloris ad omnia assumpta, maxime irritantia, & medicamenta exacerbatio.

Differe-
ntia a
morbis
agnatis.

Art. 623. His etiam distinguitur ab aliis, quæ in stomachum cadunt passionibus, in cardialgico quippe dolore, sive cardiaca veterum passione, magna pariter adest circa præcordia anxietas, dolor pressorius, & acutus, usque ad dorsum pertingit, extremorum refrigeratio, as-

duus ad vomendum stimulus, corporisque inquietudo adiunt, sed in ventriculi regione ardor non tam impensus est, nec tanta sitis, & linguæ ariditas, neque etiam pulsus tam celer, & contractus. Melius quoque ferre possunt ingesta, tam alimenta, quam medicamenta, spasmus potius quam inflammatione ventriculi affecti. Erosio vero stomachi, quæ sæpius biliosas febres, choleram morbum, & iracundiam excipit, caret febre, non tam subito infestat, sed successive, per intervalla tantum ingravescit, neque dolore tam ardente stipatur, & diutius trahitur. Quæ demum in intestinis consistit inflammatio, habet tormina circa umbilicum, cum crebris dejectionibus foecum spumosarum, aut leviter eruentarum, æstus quoque totam corporis superficiem cum pulsum celeritate, & magnitudine occupans major est, ac in ventriculi inflammatione ubi extrema manus, pedes, & nasus magis frigescunt.

Art. 624. Pro differente causarum indole, & agendi potentia differt quodammodo inflammatio gradu. *Differt gradu.* Nimirum quæ a potu frigido corpori æstuanti ingesto, item & a bile per iracundiam commota, & copiosius in duodenum effusa suscitatur, mitioribus stipatur symptomatibus, non tam facile necat, diutius trahitur, & datis inter initia congruis remediis promptius obsecundat. Sæviora vero & periculosiora sunt pathemata, quæ a venenis causticis, ab emeticis acrioribusque drastringis inferuntur, & celeriter jugulant, nisi cito efficacia opponantur præsidia. Et omnium deterrima illa est inflammatio, quæ senibus, infirmis, scorbuticis, & diuturno moerore confectis, item in fine acutorum morborum accidit.

Art. 625. Sed quando irrequieta est, corporis *Eventus funestus.*
ris

ris jactatio, potus ingestus eructatur, singultuosa ventriculi, & diaphragmatis convulsio accidit, animus deficit, facies comparet Hippocratica, pulsus intermittens est, mens emovetur, & artus convelluntur, funestum eventum denunciant ex inflammatione sphacelosa facta.

Acrimonia biliosa, & causticorum obduenda.

Art. 626. Quando ab assumpto veneno caustico, septico, arsenicali, vel acerrimo purgante, emetico, mercuriali, aut metallico medicamento male præparato inflammatio accidit, non certius, non tutius, & celerioris efficaciam est auxilium, quam demulcentia, oleosa, pingua, lac scilicet, cremor ipsius, ol. amygdal. dulc. nec non olivarum, crebro, & in copia hausta. Si a bile acri corrosiva, ut in cholera, metuenda est inflammatio, tunc terrea, absorbentia fixiora, & inter hæc maxime ossa, & cornua philosophice, ut dicunt, præparata, cum decoctis gelatinosis, uti pedum vituli, & vervecis, gelatina C. C. decoct. hord. aven. cum vel sine lacte, item cum ol. amygdal. dulc. ex usu sunt. Quando porro ab iracundia vehementi obortus in ventriculo spasmus inflammatione iminatur, nihil efficacius est, pulvere absorbente nitroso, cum liquore anodyno alternatim dato, vel in aqua quadam antispasmodica, vel emulsione ex seminibus frigidis, aut papaveris albi. Postea composito spasmo, ad educendas biliosas sordes, accommodatissima rhabarbarina sunt, & passulata.

Interna discutientia.

Art. 627. Quæ ex retropulso exanthemate iminet, vel jam inducta ventriculi inflammatio est, depellitur optime emulsionibus ex semine cardui marie, cardui benedicti, napi, quatuor frigidis majoribus, cum pulveribus bezoardicis temperatis, quibus subinde nitrum cum momento camphoræ addendum. Item incomparabiles esse-

effectus præstat liquor noster anodynus, cujus quatuor partes cum una spiritus bezoardici Bussii parvis dosibus crebrius oblatus sudorem placidum movet. Si etiam miasma pestilentielle, aut aliorum contagiosorum morborum corpus subiit, quod primario ac celeriter vim suam putredinosam, & inflammatoriam ventriculo insinuat, illico lenissimum exhibendum emeticum, ac postea subjungendi pulveres blandi diaphoretici cum nitro, & pauxillo camphoræ, vel oleum bezoardicum V Vedelii ex uncia ol. amygdal. dulc. in quo drachma camphoræ soluta, ad octo vel decem gutt. dandum.

Art. 628. Præterea exterius diro huic malo, *Externa*
omnibus modis obviam eundum. Improbo *ca. & topi-*
olidiora quæ vulgo adhibentur ut sp. vin. camph. *ca.*
ol. destill. in sp. soluta, emplastra quoque stomachica. Ego quidem magno cum fructu multoties tepide tantum applicare iussi vesicam blande cum flor. emollientibus, & croco decocto plenam. Neque minus admodum proficuum censeo linimentum ex ol. amygdal. unc. ij. & camph. 3j. cum quo præcordia frequentius inungenda, & superius ponenda lintea calida. Egregium quoque ad discutendum, & sudorem movendum est epithema ex acet. rosacei unc. ij. sp. vin. camph. 3ji. essent. croci, castor. ana 3j. nitr. 3 sem. m. tepide præcordiis admovendum.

Calmette's Sententia.

Art. 629. Signa inflammationis stomachi *Diagno-*
gnostica sunt, ingens dolor cum ardore, pun- *sis.*
ctione, distensione, atque pulsatione conjunctus. Præterea tumor adest in ea parte, si non visu, saltem tactu conspicuus, qui si admota, manu paululum prematur, ægrum ad clamores, &
quæ-

quæsum incitat. Adest quoque respiratio difficilis ob descensum diaphragmatis, & hepatis illi appensi stomachum in inspiratione comprimentium; fitis intensa, linguæ siccitas, deglutitio laboriosa, ob fauces, & guttur, & œsophagum exsiccata, & corrugata, lipothymia quandoque, dum phlogosis ad os ventriculi superius extenditur propter commercium nervorum cum corde, febris vehemens ob supradictas rationes, & interdum lypiria, dum scilicet inflammatio intensa est, in qua dum interna uri videntur, exteriora rigent, unde pulsus minutus potius, & obscurus, quam magnus & plenus in hoc affectu, aliisque internis inflammationibus plerumque plenus apparet.

Sed quod hujusce phlogoseos certiore ad huc facit diagnosin, labor est stomachi, & anxietates a sumpto alimento etiam liquido, quia dolens hoc viscus minimum onus ferre vix potest. Præterea calidum admodum sumptum jusculum vix tale a stomacho perferuntur, quia ipse magis fervet, ne quid dicam de vomitu subruento hunc affectum quandoque subsequente, aut præcedente.

Diff. *Art. 630.* Cave tamen ne hepatidem seu *he-*
mentia ab patis stomacho incumbentis inflammationem
hepatiti- cum dicto affectu confundas, potissimum quan-
de. do ejus cava pars laborat; sed partium figura, & situs, symptomatum sævitia, quæ stomacho affecto major est, & inferius recensenda propria signa hepatitidis hos affectus ab invicem satis distinguunt, qui tamen complicari, & conjungi ob partium dictarum viciniam, & contiguitatem facile possunt.

Prognosis. *Art. 631.* Ventriculi phlogosis periculossima est, & facile hepati, diaphragmati, cordi, &c. utpote vicinis communicari potest, præsertim dum

dum illa ad superius stomachi orificium propagatur, quo tempore animi deliquia, & syncope contingunt.

Art. 632. Ejus curatio ut & omnium aliarum inflammationum principio statim a venæ sectionibus inchoanda est, iterum atque iterum celebratis tum in brachiis, tum in pedibus quantum scilicet ægri vires, ætas, regio, temperamentum &c. ferre possunt, ita ut in robusto, juvenili, & sanguineo corpore, & in aliis eadem proportionem ad decem, vel duodecim phlebotomias, parcas, aut largas una, duabus, aut pluribus diebus pro necessitate institutas progredi non pudeat. Hac enim via, si qua alia, morbus efficaciter reprimatur, & causa antecedens inflammationis, seu sanguis, qui præsto est e vasis gastricis exilire, ad incipientem phlogosin aut fovendam, aut ampliandam, a parte affecta revellitur.

*Curatio
a phle-
botomia
inchoan-
da.*

Art. 633. Notandum tamen in hac, & quacumque alia inflammatione, quod quanto magis progressus videtur affectus, & facta, ut ajunt, fluxio; tanto minus necessarius sit venæ sectionum repetitus numerus, nisi eadem fluxio renovari identidem videatur.

Observatio.

Art. 634. Hæmorrhoidum apertio per hyruidines, si æger huic evacuationi assuetus sit, aut eadem tumentes appareant, plurimum etiam conferre poterit; Quod vero de cucurbitis tum siccis, tum scarificatis dorso, scapulis, natibusque admotis sentiunt veteres in hoc affectu, ut in plerisque aliis, vix a neotericis laudatur, nisi forsan quid ob somni deficientiam ratione doloris excutiendum est, aut humorum in cerebrum metastasis derivanda, præsertim quando phlebotomiæ, cujus vicariæ dicuntur, locus amplius non est.

Hyrudinum applicatio.

*Remedia
interne
usur-
panda.*

Art. 635. Præter memoratas sanguinis emissiones plurimum refrigerantia conducunt in principio, & aliquo modo repellentia per os usurpata, & in modica dosi ne stomachum fatigent, assumpta; tale est oxycratum dilutum, potus frigidiusculus aquæ fontanæ succo limonium, berberis, aut malorum granatorum &c. acidulata, vel tinct. ros. rub. succus portulac. lactuc. cydonior. oxalydis, aut eorum decoctum cum syrup. acidiusculis, refrigerantibus, & paulo adstringentibus; juscula herbis refrigerantibus alterata, jus pulli seminib. frigid. & papav. alb. aliisque refrigerantibus insarcti, julepi refrigerantes, acidiusculi, & parum adstringentes aq. ros. plantag. nymph. portulac. acetos. lactuc. &c. destillata. Emuls. ex sem. quat. frig. & semin. pap. alb. parata, syrup. violac. limon. nenuphar. de papav. alb. præsertim ubi dolor urgens compescendus est, aut somnus necessario conciliandus, deliriumve, si adsit, sedandum. Quibus omnibus merito addi debet, frequens salis prunellæ usus refrigerandi, & reperiendi facultate pollens, spir. salis, sulphuris, vitrioli ad gutt. aliquot, aliaque ad febrem inflammationemque compescendas aut minuendas idonea.

Clysteres.

Art. 636. Interim dum hæc remedia adhibentur, non omitti debent clysteres emollientes, refrigerantes, & lenientes, singulis diebus repetendi cum cassia elect. lenit. diacathol. mell. violat. crysall. miner. aliisque mitioribus purgantibus, quibus alii magis refrigerantes quam purgantes intermisceri utiliter possunt ex sero lactis, oxycrato, decoct. refriger. &c. parati. Progrediente morbo dictis remediis minus insistentum est.

*Purgantia nisi
leviora.*

Art. 637. Quod ad purgantia spectat ea non minus in inflammatione stomachi quam in vomitu

mitu sanguineo suspecta haberi debent, præsertim ineunte morbo, eodem vero paululum remisso commoda sunt modo sint leniora, ut tamarindorum decoctum, & infusum, cassia, manna, syrup. ros. pallid. aut flor. persici in jusculo aut pauca ptisana dissolutum, rhabarb. infus. aut senna in minori dosi cum limonibus frustulatim incisus.

Art. 638. Exterius remedia sola, quæ institui *Remedia* cum aliquo fructu possunt, sunt foci regioni *externa.* ventriculi admoti refrigerantes simul, & repellentes, frigidiuscule applicati, declinante vero morbo non refrigerantes, sed resolventes parandi.

Art. 639. Si quid sanguinis vomitu rejiciatur *Et corrig.* adjuuge remedia, supra dictis, sanguinis fluxum *borantia* cohibentia; si lipothymia urgeant, adhibe cardiaca, & vires restaurantia sæpius memorata, parce tamen ne stomachi, aut sanguinis fervor augeatur. *interna.*

Art. 640. Quodsi in abscessum morbus degenerat, qui ex eo dignosci potest, quod dum *Abscessus obor-* fit, dolorem & febrem intendit secundum Hipp. *ientis* Aph. factoque dolor atque febris, perseverante *diagnos-* tamen tumore, remittunt. Talis abscessus ob *ss.* puris acrimoniam tunicas stomachi erodentem rumpitur necessario, vel in externa, vel in interna ejusdem superficie, unde ulcus subnascitur, quod cognoscitur ex iis, quæ precesserunt: inflammatione, nempe, & abscessu, aliisque supra enumeratis dolorem ejusdem partis, aut solutionem, atque dilacerationem efficientibus. Si in partem ventriculi concavam rumpatur, patebit magis ex vomitu sanguineo, purulento, atque secessu simili, tum ex ructibus foetidis lipothymiis &c. tum ex dolore quem stomachus ab assumptis etiam lenioribus patitur; quæ sympto-

ptomata minime aderunt, aut non ita urgebunt, si in superficie ejusdem externa, seu convexa ulcus excitetur, nisi forsan omnes stomachi membranas perforet. Ulcus denique ventriculi in quacunque ejusdem parte, seu regione sedem obtineat dejecta semper appetentia stipatur.

Ejusdem Prognosis. **Art. 641.** Prognosis in ulcere ventriculi funesta semper instituenda est, nisi idem perexiguum sit, & superficiem ventriculi externam occupet, ne quid dicam de febre lenta, & habituali ulcus hoc consequente, quæ cum maxima humorum discrasia, & quæ facile emendari non potest, semper conjuncta est.

Subsequens ulceris curatio. **Art. 642.** Si stomachi ulcus curationem recipere potest, hoc fiet potissimum per ea, quæ sequuntur remedia in exigua dosi, non minus ac alimenta ægrotantibus exhibenda. Ac primo quidem per usum ptisanæ ex consolidantibus, vulnerariis, & detergentibus compositæ, & melle incocto ad despumationem, aut saccharo, quæ plurimum detergunt, conditæ; aut jusculorum ex iisdem paratorum: ut rad. symphyt. maj. aristoloch. zedoar. gentian. pentaphyl. tormentill. cichor. lapat. acut. &c. fol. pimpinel. bugul. fanicul. scabios. pilosell. absinth. prunell. veronic. agrimon. chamædr. cent. min. cichor. fylvest. vinc. pervinc. &c. hord. integ. liquirit. passul. ros. rub. flor. hyperic. & bellid. minor. Cavendum tamen pro ratione ulceris ne nimium detergentia, & asperitate sua aut amaritudine partem ulceratam stimulantia majori dosi præscribantur, inde enim ulcus refricaretur, & recrudesceret; quare quandoque simplex hydromel. aut decoct. symphyt. & hordei cum sacch. rosac. aut conserva rosar. aliis præferri debent.

Balsamici.

Art. 643. Balsamus etiam sulphuris terebin-

this.

thinatus, spir. & ol. terebinth. balsam. peruvian. ad gutt. aliquot in juscui. aut potu magnis in hoc affectu extolluntur laudibus. Sed inter ea quæ conglutinant, & humorum acrimoniam ulcus foyentem demulcent, commendantur præ primis: decoctum cancr. fluviat. carnis junior. animalium, mucilagin. gummi tragacant. sem. psyll. & cidonyor. & alth. decoct. hordei aut hydromelite extractæ.

Art. 644. Balnea aut semicupia ex aqua dulci tepida, lactis usus ad plures dies, potissimum asini, hordeacea, avenacea, orizata valde diluta imo bochetum ex rad. chin. sassafir. aut falsæ parill. si febris non admodum vigeat, nec corpus valde exsiccatum videatur, internis in edentur ulceribus.

Art. 645. Sunt qui in ulcere præsertim diuturniore, aquarum mineralium acidularum, tanquam valde detergentium, potum per plures dies commendant, sed leviores eligendæ sunt, h. e. acidulæ magis temperatæ, aut eadem si tales non sint ptisana diluendæ, nec magna copia sumendæ sunt, ne stomachum fatigent.

Art. 646. Cathartica quia in omnibus morbis plus minus necessaria sunt, in isto quoque affectu, ut sordes stomacho innascentes abstergantur, & quæ sanguinem inficiunt expurgentur, rarius tamen, & parca manu sunt adhibenda: qualia sunt cassia, tamarindi, rhab. syrup. fl. persic. aut de cichor. composit. manna &c. Clysters vero frequentius usurpari possunt.

Art. 647. Quibus omnibus remediis adjungenda sunt, si præsertim ulcus ad consolidationem tendat, bolus armena, terra figillat. sanguis dracon. gumm. arabic. atque tragacant. manna thuris, amyllum sine calce paratum, conserv. rosar. cynorrhod. rad. symphyt. syrupi adstring. & ex

*Balnea**Aquæ
mineralium
usus**Subindo
alvus
blande
laxan-
da.**Vulne-
raria,
consoli-
dantia.*

decocto vulnerario parati, tum demum sarcocol-
la lacte muliebri nutrita, ex quibus pulveres,
opiata, electuaria &c. confici poterunt ad usum.

INFLAMMATIO INTESTINORUM.

Hippocratis sententia.

*Recti in-
testini
inflam-
mati si-
gna.*

Art. 648. Si intestinum rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat, & febris, & frequenter ad exonerandum alvum desideat, & nihil egerat, & præ inflammatione sedes exiisse videantur, & aliquando urinæ stillicidium corripiat, hic morbus fit, quum pituita ex corpore in intestinum rectum decubuerit.

*Ejus cu-
ratio.*

Art. 649. Conferunt autem calida quæ pituitam attenuare ac consumere possunt, aquosamque reddere, ut non sit ardor, nec morsus aliquis in intestino. Curare itaque oportet hoc modo. Ægrum in calidam aquam collocato, & trita grani cnidii gr. LX. in vini hemina, & olei hemina dimidia diluito, tepefacito, & infundito. Hæc pituitam, & stercus educunt. Si vero in aquam non sedet, ova cocta in vino nigro odorato ad sedem apponito, calido quopiam inferne substrato, aut vesica aqua calida plena, aut lini semen tostum, molitum, tritum, pari farina, in vino odorato, & oleo ammixta cataplasmatibus modo calidissime imposito. (Post alia topica recensita demum addit) si quidem ad hæc dolore liberetur satis est; sin minus bibat peplum, meconium album appellatum, aut aliud quoddam, quod pituitam purgat. Et quamdiu durat inflammatio, eduliis levibus nutriatur.

*Inflam-
matorum*

Art. 650. Circa intestinum tenue dolores diuturni, & circa lumbos, & ad præcordia, si ægri cibos

cibos averfantur una cum febre, his dolor in-^{intestine}
tentus ad caput progressus ipsos occidit con-^{rum pro-}
vulsorio modo. ^{gnosis.}

Tralliani sententia.

Art. 651. Nosces colicos cruciatus (& dolores ^{Intestino-}
intestinorum) ex biliosis, acribus, & calidis hu-^{rum in-}
moribus (atque proinde ab inflammante causa ^{flamma-}
vel a jam facta inflammatione) concitari, quia ^{orum}
interna morderi, exuri & lancinari videantur ^{signa.}
cum febre acuta, lingua arida, siti, vigiliis, &
singulis diebus magna ex parte accessio invadit
urina fit acris, & quæ per alvum excernuntur
biliosa, copiosaque sunt. Ad hæc quod cibus
calidioribus, potionibus, & medicamentis ægri
magis irritentur.

Art. 652. Si colicum (& intestinale) affectum ^{Purgan-}
ab inflammatione fieri contingat, nequaquam ^{tia vi-}
purgationem præsertim inter initia, & cum il-^{tentur.}
la nondum ad concoctionem pervenerit exhibe-
re audebis, alias dolorem, vigilias & tormina
augentur, quibus omnibus incrementibus in
ileosum morbum ægri incidunt. Neque enim
aliud est Ileos, quam Colici affectus intensio ac
incrementum. Quapropter purgatio inflamma-
tione tentatis danda non est, venæ autem se-
ctio adhibenda, & paulatim ex toto corpore eva-
cuatio tentanda.

Porro si propter inflammationis magnitudi- ^{Quo ca-}
nem etiam urinas supprimi contingat, venam ^{su vena}
& in talo, & in superiori pedis parte secare ^{pedis se-}
non est alienum: sæpe enim cum hoc nos fecis- ^{canda.}
semus, & alvi, & urinæ excretio sequuta est.
Alimento in his utendum est, cremore ptisa-
næ, aut avena mediocriter, item injectione per
alvum ex cremore ptisanæ, chamæmel. succo li-

ni feminis, & hydrelæo, præsertim si etiam febris vehemens urgeat. Rarum namque est Colo inflammationem sustinente, febri non oboriri.

*Externa
quæ?*

Art. 654. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acré habentia, e quorum numero est, etiam chamæmelinum oleum, & ex farina hordeacea, linique semine epithema, nec non cerata similiter, quæ componuntur ex chamæmelino, cera, rosaceo, & luteis ovorum. Ponderis æqualitas fiat ejusmodi. \mathcal{V} . Cerae unc. v. chamæmelini unc. ij. sem. farinæ fabaceæ ol. rosac. ana unc. ij. sem. lutea ovor. v. aut vj. succi lini feminis q. s. Hoc & renibus & vescicæ inflammatae pulchre auxiliari potest.

*Balnea
an ju-
vent?*

Art. 655. Balnea continua priusquam totum corpus recrementis vacuatum fuerit adhibenda non sunt. Post sanguinis autem evacuationem, & si dolor urgeat, balneo uti absurdum non est. Si vero vires refragentur, in alveum ægri descendent, corpus oleo chamæmelino illinentes.

*Vinum
quando
propi-
nandum.*

Art. 656. Vino si inflammatio adhuc fervet, & febres præpollent, abstineant, ubi concoctionis notæ apparuerint, ut si vires imbecilles videantur, non alienum est, ipsis vinum tenue, & aquosum propinare.

Jonstoni sententia.

*Definitio
& Dia-
gnosis In-
flamma-
tionis in-
testinorū.*

Art. 657. Inflammatio intestinorum est eorundem tumor a sanguine extra vasa in illa elapso, & putrescente exortus. Hujus signa sunt: dolor fixus, & distendens, tumoris perceptio, ut intestina chordæ instar convoluta deprehendantur, alvi suppressio, urinæ interceptio, febris præsentia.

*Ejus
causa.*

Causa in definitione exposita est. Autumno

ob tenuitatem sanguinis in primis affluit, quia æstate geniti humores tenues, & mobiles autumni frigore inæquali in profundum corporis pelluntur.

Curatio est ad aliarum inflammationum normam instituenda, & quidem cito, quia malum est acutum: & sæpe in gangranam, & sphacelum abit. In ea refrigerantia, quæ exhibentur, absque adstrictione esse debent, a purgantibus plane abstinendum, ne locus affectus exasperetur.

Art. 658. Dividitur secundum locum & causas.

I. Alia est per se, de qua jam egimus. Alia ab *Exomphalo* de qua suo loco. Alia ab *Enterocèle* in qua intestina statim reponi debent. Alia a *Contusione* in qua reliquis, quæ inflammationis causa adhibentur, aliquid lenientium & concoquentium addatur.

II. Alia est in tenuibus intestinis, quæ est frequentior, & in qua stomachi distentio, spiritus angustia, vomitus assidui, ut nec potus contineri queat, urget dolor, & tormina magis ad superiora vergunt. Alia in Crassis, in qua dolor ad hypochondria magis pertingit, lumborum adest gravitas, vomitus non ita continuo durat.

Etmulleri sententia.

Art. 259. Accidit in herniis, ileo, & ab aliis causis. In loco inflammato tumor rotundus tactui (quandoque) percipi solet; adest vehemens dolor pulsatorius, fixus, distendens, &c. alvus occlusa, febris, vomitus, languor, &c. frequentius in *ileum lethalem* terminatur. Commendatur *omentum vervecinum*. Vide *Ileum*

Et Curatio.

Divisio bifariam.

Inflammatio intestinorum.

Boerhaavii sententia.

*Inflam-
matio-
nis inte-
stinorum
causa.*

Art. 660. Intestina maxime tenuia, & frequentissime, in suis membranis acuta inflammatione, ut ventriculus, sæpe infestantur, a causis communibus inflammationis huc delatis; vel a materia acri potus, cibi, condimenti, medicamenti, veneni, assumpta huc delata, in plicis valvulosis detenta hærente; tum etiam ab acri, putrida, foetida materie purulenta, ichorosa, gangrænosa, biliosa, atrabilaria, ex oesophago, stomacho, hepate, liene, pancreate, omento huc appellente, hærente, rodente; denique a convulsione ingente prægressa, flatus creante, motum sistente, sicque inflammationem creante.

*Ejus si-
gna &
effectus.*

Art. 661. Nata his locis, contrahit intestina; cavitatem claudit; transitum appulsi impedit; dolorem acutissimum, ardentem, fixum creat; convulsiones violentas, ubi appulsis irrigatur, producit; alvum claudit; vomitum excitat ingestorum, & appulso- rum, citius, tardiusve post assumptionem, prout superius, vel profundius hæsit; flatus dolentes, tormina cum borborygmis acutissima; ileum; volvulum; abscessum, gangrænam, scirrhum; cancrum; febrim acutissimam; debilitatem ex dolore acerbissimo summam; mortem citissimam producit.

Prognosis.

Art. 662. Quamdiu in gradu inflammatorio subsistit, doloris Iliaci nomine imponit incautis, frigori, flatui, vento, periculoso successu adscribitur, calidis tractatur, & carminantibus, eventu funestissimo.

Cognoscitur autem facile pro vera inflammatione ex febre acuta continua, siti ingente, calore magno, pulsu duro, dolore igneo, urina flammea, debilitate summa.

Si

Si flexum Coli occupat facit *Colicum* dictum *dolorem*; si recti intestini ultima infestat, tum pro hæmorrhoidibus coecis haberi solet; solvitur dysenteria blanda subcruenta biliosa.

Art. 663. Simul ac noscitur præsens per sua *Cura* insignia tunc, statim maximo molimine tentanda *flamma* sanatio; quæ acquiritur primo missione larga, & *tionis*. repetita sanguinis, secundo assiduo injectu clysmatum laxantium, diluentium, antiphlogisticorum, sæpe repetitorum ad tertiam, quartam, & ultra vicem uno die; tertio potu assiduo calido eorundem, additis prudenter opiatis, & iis, quæ causæ singulari compertæ adversa sunt; quarto fomentis ex similibus toti abdomini applicatis, maxime ex junioribus, vivis, calidis, sanis, animalibus impositis; quinto interim caute cavendo ab omni acri, impetum augente, calefaciente, potu, cibo, medicamento, motu, animi affectu; sexto tandiu persistendo in horum usu, donec omne malum sedatum sit, nec tribus diebus redierit.

Art. 664. Si malo hoc prægresso nec debitis remediis curato; & ultra triduum semper cum *Suppu-* vehementia persistente, loco doloris, ardoris, *ratio.* distractionis, successerit horror vagus, per totum corpus sine causa, obtusus cum gravitate dolor in loco, signum erit ibidem formari abscessum; unde intra 14. dies eo rupto effluet pus; quod si in cava abdominis effluit facit mala multa ex viscerum putrefactione inde sequente ut: Ascitem, & Tympanitem, unde post lentam terribilemque Tabem, & ejus symptomata mors. Si autem in cava intestinorum pus effluit facit dysenteriam purulentam magnam, parvam, longam, brevem, prout ulceris ibi facti natura dabit, inde sæpe integræ intestinorum membranæ exeunt, & sæpe tabes sequitur.

Art.

*Cura
Suppura-
tionis.*

Art. 665. Simul ac suppurationem adesse noscitur statim inhibendus omnis victus, unde sterqus multum, durum, crassum, acre nascitur; æger pascendus solis jusculis cum leniter deterfivis radicibus incoctis, cujusmodi sequens est.

℞. Rad. scorzon. tragapog. sisari petroselin. cichor. ana unc. ij. cum jure carnis s. a decoct. ad unc. xxx. & huic jusculo admisce vitelli ovor. num. ij. salis q. s.

Decocta balsamica detergentia multum bibenda, & instar clysmatum injicienda ut sequitur.

℞. Rad. valerian. hortens. unc. ij. fol. levistici man. ij. flor. hyper. man. j. agrimon. unc. ij. aq. font. ℥ij. s. decoct. de quo bibat æger unc. ij. omni hora, & ex eodem etiam fiat clyσμα.

Aut aquæ fontanæ medicatæ larga copia bibendæ, in his pergendum usque ad perfectam sanationem.

*Gangræ-
na.*

Art. 666. Futuram gangrænam loco suppurationis prævidemus, si morbus habuerit causas violentissimas, & gravissima produxerit symptomata; atque si simul nulla benignæ resolutionis, vel medelæ signa apparuerint. His prægressis eam fieri docent subita, & sine causa, acerrimi doloris remissio; manente pulsu debili, intermittente sudore frigido, dysenteria fœtida, cinericea, ichorosa, livida, nigra, fecur sine sensu demissione; unde brevi placida mors. Malum hoc, eoque provectum raro medelam capit; curandum prius; ceterum methodus adhibita in suppuratione prodest.

Scirrhus.

Art. 667. Futurum scirrhum prænoscitur: si intestinorum inflammatio diu durans, nec in summam sævitiem ascendens, nec resolutione, nec medicamentis, nec suppuratione soluta, reliquerit in loco affecto stuporem, gravitatem, distra-

distraktionemque constantem. Tunc enim gravia & pertinacia mala simul producit, qualia imprimis: stupor, pondus, ventrisque incrementum assiduo aucta; hinc cavitates intestinalis angustiatio: fœcum ibi, & chyli stagnatio, a qua materie inclusæ putrefactio unde intestini occlusio, intorsio, & ingestorum remora, atque adeo Ileus, volvulus, vel ab acri irritante dysenteria siccior, convulsio, singultus, vomitus, dolor assiduus, febris, macies, atrophia, mors.

Art. 668. Medicamenta parum valent, quæcumque demum sint: victus sit ut dictum est, in cura suppurationis, sic fertur diu sine magno malo. Sed si per acria imprudenter applicata, maxime per valida purgantia scirrhus ad suppurationem, & corruptionem vergat, tunc cancer illic oritur, sævitque: quo casu potus ex solo lactis recentis fero convenit; victus ex jusculis avenaceis, farinosis, carnosive folis cum vitellis ovorum; clysinata blandissima ex solo decocto seminum lini, foliorum solani officinarum; vel capitum pap. alb. injicienda; medicamenta summopere demulcientia, anodyna, leniter opiata, non facile in acre transeuntia, danda.

Reliqua vero videnda sunt in Cl. Van Schvieten eruditissimo Commentario, tum etiam in hac nostra Synopsi sub titulis de Ileo, & Colica.

Farrago sententiarum.

Art. 669. Intestina tam tenuia, quam crassa, quæ membranosa fere tota, ex tunica prima a peritonæo, altera musculari, cum fibris longitudinalibus, & circularibus, nervosa, & villosa contexta, innumeris nervorum, & vasorum surculis perfusa, & exquisito sensu ac motu instructa,

Intestinorum inflammationes frequentes.

structa, & multis & gravibus morbis patent, e quibus haud postremus inflammatorius, qui ipsis ex variis causis accidit. Nam atrociam illam & lethalem quandoque pathemata; quæ assumpta venena, emetica validiora, & drastica purgantia excipiunt, ab inflammatione in sphacelum transeunte ortum ducunt. Vulnere ac læsiones intestinorum, non aliter quam inflammatione necant. Febres synochas, & ardentes, maxime cholericas, dysentericas, item plurimas malignas, neque minus exanthematicas, in primis variolas lethalem sæpe intestinorum inflammationem inducere uberius testatur dissectio cadaverum his morbis defunctorum. Convulsivam etiam Colicam, maximeque eam, quæ a podagra retrocedente ac subsistente ex cohibito, aut sufflaminato hæmorrhoidali fluxu, sanguine inducitur, iliacam quoque, ex hernia incarcerata, aut intestinorum convolutione, passionem, non alia ratione quam intestinorum inflammatione lethum inferre, est in comperto. Nihil quippe vitalibus motibus adeo est insensum, quam putredo, quæ excipit inflammationem, ac in nervosis exquisito motu ac sensu pollentibus partibus, consistit. *Frider. Hoffmannus.*

Medici *Art. 670.* Si Medici nostri temporis omnium
obser- agrorum hypochondria statim tractarent in mor-
vent hy- bis potissimum acutis, pauciores certe commit-
pochon- terent errores, quam non faciunt sprete hypo-
dria in chondriorum observatione. Qui bene noverit
acutis. hypochondriorum statum, in morbis quam bene curare noverit! quam bene præsagire! Etenim diu durans meteorismus seu tumor præcordiorum dolorosus in acutis ab hæctica intestinorum intemperie, siue nimium intento fibrarum intestinalium elatere, pendet. Quantum hic nocet remedium farrago! Quantum saccharatorum u-
sus!

lus. Quantum purgantia intempestiva! Hypochondria dolorifica cum alvo profusa pessima. Numquam sunt in tuto, qui meteorismum, & tensionem hypocondriorum diu gerunt in acutis. A labefactato viscerum naturalium tono, a labefactatis eorundem functionibus, prostratisque facultatibus talia dependent. *Baglivius*.

Art. 671. In inflammatione intestinorum venæ sectio proderit in principio morbi largiter celebrata, interne simul adhibito nitro in substantia, & aliis nitratis v. g. arcan. duplic. in quibus præter vim resolventem, refrigerantem, & laxativam conjunctam habes, item Martialia, præprimis ubi in gragrænam abit inflammatio. *Jo. Langius*.

Art. 672. Si ex inflammatione intestini dolorem fieri contigerit, caveat Medicus, ne ullo quantumvis levi medicamento subducente utatur, ne attractis ad partem inflammata ab illæsis partibus, calidis aut pravis humoribus, aut inflammatio augeatur, aut impedito transitu in volvulum desinat. Cassiæ tamen folius usum aliquando non respuerem in tali casu, quod miti illo blando, & humido calore sæpe inflammationem sedet, dolorem leniat, & suppurationem tumoris adjuvet. *Sepralius*.

Pleraque ad intestinorum inflammationis, & gangrænae curationem necessaria peti poterunt ex generali utriusque affectus tractatione suo loco tradenda; licet gangrænam intestinorum existimem incurabilem. *Deleboë Sylvius*.

INFLAMMATIO MESENTERII.

Riverii sententia.

Art. 673. In explicandis mesenterii, pancreatis, & omenti affectibus, auctores admodum steriles sunt; & major pars illorum, penitus eos omi-

Venæ sectio laudatur.

Ex inflammatione intestinis purgatio lethalis.

Gangræna lethalis.

*Quæ majora ab affecto mesenterio o-
miantur.*

omiserunt, quod cognitu difficillimi sint, & majori parte non nisi ex dissectis cadaveribus innotescant; ut ex historiis constat a Schenchio, Sennerto aliisque collectis. Frequentissimi tamen esse consueverunt, unde Fernelius asserit, sæpe in mesenterio latere plurimorum morborum causas, ut cholerae, melancholiae, diarrhae, dysenteriae, cachexiae, atrophiae, languoris, lentarum, errantiumque febrium, vomitionum, dolorum colicorum, tumorum & abscessuum.

Ejus causa. *Art. 674.* At inflammatio specialiter in hoc viscere concitatur, quando sanguis in venis meseraicis cumulat, per alicujus rami apertionem in mesenterii substantiam effunditur. Ad hanc inflammationem afficiendam plurimum confert humorum congestorum acrimonia, & erosio; lapsus aut percussio regionis hypogastricae, hepatis debilitas, corporis calefactio nimia, vel refrigerantium usus intempestivus; motus criticus naturae in febribus malignis, aut variolis, diarrhoea vel dysenteria intempestive suppressa.

Diagnosis.

Art. 675. Signa diagnostica sunt, febris languida, occulta, lenta, absque siti, & gravioribus symptomatibus: anorexia, tensionis, & gravitatis sensus subter ventriculum citra magnam duntiem, & quæ nonnisi pressu dignoscitur, citra dolorem etiam saltem effatu dignum, quia pars obruso sensu donata est: egestionem chylosam, quas plerumque ichor tenuis consequitur: sine ullo doloris sensu, modo seorsim ac sincerus, modo fecibus permixtus.

Differentia a similibus affectionibus.

Art. 676. Mitiora sunt omnia modo dicta symptomata si mesenterium solum inflammatione afficiatur: si vero una cum eo etiam hepar, lien, aut intestina tententur vehementiora sunt omnia symptomata. Speciatim vero intestina simul

simul cum mesenterio inflammari, ostendit febris hemitritæus, quam observavit Spigelius plerumque ob harum partium inflammatione ori. A musculorum abdominis inflammatione distinguitur, quod tumor, & dolor partes externas magis occupat, & levi tactu statim percipitur, & insignem dolorem ac febrem inferre solet. Distinguitur a tumoribus diaphragmatis qui paucissimis hæcenus Medicis innotuerunt, quia insignis perpetuo adest hic respirandi difficultas, hypocondria revulsa sunt, pulsus durus ac parvus citra omnem tumoris in hypocondriis sensum, aut apparentiam.

Art. 677. Quod ad prognosin attinet periculosissimus est hic affectus, qui plerumque in abscessum degenerat. Sæpe etiam materia morbifica alio a natura transmittitur, non tamen plane tollitur, unde malum recrudescit, & sæpe per multos annos, imo totum vitæ tempus perseverat, nunc febre redeunte, nunc eadem in colicos dolores mutata. *Prognosis.*

Art. 678. Curatio eadem ac hepatis lienisque inflammationis; illa igitur a suis capitibus huc erit transferenda. „ Nisi resolvatur, in abscessum, gangrænam aut scirrhum desinit. „ *Curdia.*

Art. 679. Diagnosin abscessus Mesenterii interdum facilis est, interdum vero difficillima. Si enim ab inflammatione ejusdem partis fiat „ ex signis ut in abscessu intestinorum facile „ dignoscitur, secus vero vix discerni potest. „

Calmettei sententia.

Art. 680. Abscessus & ulcus mesenterii difficilis admodum sunt diagnoseos, nisi illa dictæ partis inflammatio præcesserit, quæ ultra tempus sine ægotantis morte perseveret, quod ta- *Abscessus mesenterii diagnoseos.*

men non valde ordinarium est, & inditium dat tumorem inflammatorium discuti, & resolvi non potuisse, sed fuisse suppuratum atque in pus conversum. Si quæ tamen reconditorum affectuum, & qui nonnisi per dissectionem cadaverum plerisque innotuerunt Medicis, signa seu potius conjecturæ afferri possint; illæ ex dolore, tensione, gravitate affectæ partis, cibi fastidio sine ullo calore, & febre præcedentibus, ex magna facietate post paucum assumptum cibum, stomachi pondus mesenterio incumbens, ex febre lenta, & languida subsequente, ex vomitu, atrophia corporis, dejectionibus foetidis chylosis, sanguineis, & rupto in intestina abscessu purulentis, petendæ sunt, atque etiam ex absentia signorum alias vicinas partes affectas in specie designantium.

Jonstoni sententia.

Definitio. Art. 681. Mesenterii inflammatio est ejusdem tumor, ab humoribus cum sanguine nutriente in spatia ipsius effusis, vel glandulis altius impactis, & calore externo accedente putrescentibus exortus.

Diagnos. Art. 682. Signa sunt: febris lenta, plerumque semitertiana, dolor lumborum, nunc in utraque parte, tunc in dextera, qui se ad anteriorem regionem ventris, supra & circa umbilicum extendit, alvus suppressa, egestionis chylosæ, quas ut plurimum ichor tenuis, modo sincerus, & citrinus, modo fœcibus permixtus insequitur. Differt a doloribus ventriculi, uterinis, Colicis, & Nephriticis, signis in ipsis expositis. A pinguedine ventris differt, quia hic manu totus comprehenditur, quod summæ cuti inhærescat, secernique a musculis abdomi-

nis potest. A musculorum abdominis tumore differt, quia is circa pressus dolore afficit, nec alvum ita remoratur.

Art. 683. Curatio non est negligenda; peri-
culosa nempe tum propter febrem, qua æger
contabescit; tum propter putredinem, qua me-
senterium corrumpitur. Extenditur vero inter-
dum ad quadragesimum, interdum octogesimum
diem; interdum per vitæ tempus durat; febre,
& colicis doloribus mox redeuntibus, mox ces-
santibus. Purgantia vel nulla, vel lenia, nec
in principio, ne plus attrahatur; sed inflam-
matione ad concoctionem tendente. Sed nec
Cassia in curationis auspicio satis tuta.

Art. 684. Abscessus mesenterium infestantes *Mesen-*
sunt varii. Nam 1^o. si locum spectes vel sunt su- *terii ab-*
pra umbilicum, vel infra, vel circa; 2^o. si con- *scessus*
stitutionem, interdum mesenterium ex multis *diagno-*
magnis scirrhis conflatum invenitur. Interdum *sis.*
lapilli in eo reperiuntur. Interdum infinitos
habet abscessus, sine sensu, ac dolore, follicu-
lo proprio inclusos, ac gypseam, glutinosam,
aut liquidam materiam continentes. Cogno-
scuntur autem difficulter, & interdum non nisi
post mortem, si tamen venter intumuit, &
symptomata adsunt, nec hydropis, vel alterius
alicujus affinis morbi signa præsto sunt, suspi-
cari de illis debemus. Excluduntur autem pro-
digiose. Aliquando sponte ad alvum hæc sa-
burra erumpit, & non raro facto circuitu re-
vertitur. Aliquando inter peritonæum, & ab-
dominis musculos copiose profusa, vel in cavi-
tatem ventris rupto peritonæo defluit, aut per
abscessum exterius erumpit &c. Aliquando ægro
bene ferente id accidit. Aliquando eidem mor-
tem accelerat.

Art. 685. De eorum curatione hæc in genere *Morbi*
Curatio.
V 2 notan-

notanda . 1 . Alvum semper debere esse fluidam . 2°. Resolventibus materiis, sed levibus, vim aromaticam habentibus, blande stringentibus festinandum . 3°. Inter detergentia Syrupus Mercati ex calybe palmam obtinere . 4°. Ad consolidandum Terebinthinam Cypriam quovis modo præparatam, in primis si materia peccans in lumbis ac circa renes delitescit, omnibus præferendam . 5°. Ad citiorem abscessus maturationem balneum aquæ dulcis frequentandum . 6 . Vires etiam egregie essentia Persicaria cum oleo calchantino roborari . 7 . Acidulas, quia facultate penetrandi, & exterforia ulcera erodant, & temperiem pessum dent, vitari debere.

Etmulleri Sententia.

*Inflam-
matio
Mesen-
terii.*

Art. 686. Inflammationes, & tumores Mesenterii sæpius sunt fons, & origo chronicorum, & admodum latentium morborum, & fomites mirabilium turbarum ægros, & medicos vexantium. Dolores adsunt nunc circa dorsum & lumbos, nunc in abdomine & circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes & diuturni, subinde cum febricula erratica; dolores subinde per intervalla recurrunt.

Abscessus.

Art. 687. Quando apostema suppuratum ruptur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente æstu non raro insigni, quem puris præsertim per alvum excretio successive comitatur.

Diagnos.

Art. 688. Corpus sensim emaciatur; respiratio evadit difficilior; & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo

fundo abdominis circa, & infra umbilicum persentire affirmant, flatulentia ægros vexare solent. Sæpe multis annis affligunt huiusmodi tumores, in *scirrhosos* & *strumosos* abeuntes.

Art. 689. Curantur hæc pathemata Mesenterii, cum diuturniores fiunt, ut alii chronici affectus *cachectici* & *hypochondriaci*; tractandi sunt tamen caute, & sine violentia. Convenit externe *empl. de cicuta cum ammoniaco*, de *ranis cum mercurio*, &c. Interne *deobstruentia*, *millepedes*, *remedia ad strumas*, &c. Apertio venarum hæmorrhoidalium per *hirudines*; *purgantia* sunt nociva, *enemata* utilissima.

Farrago sententiarum.

Art. 690. Gignitur in Mesenterie phlegmone abscessus a sanguine in eam partem a venis effuso, ibique putrefacto; illa autem tactu percipitur, dolorem infert gravem, & febrem multis gravibus symptomatis stipatam; tamen ideo æger non cogitur decumbere, & negotia sua relinquere.

Abscessu rupto pus copiosum, & album defluit ab alvo, interdum mixtum fœcibus, interdum seorsim cum abscessus vergit in colon, aut rectum intestinum. Præterea in mesenterio cholera, melancholia, diarrh. dysenter. cachex., & intermittentium febrium, aliorumque latentium morborum causæ continentur, quod a Fernelio annotatum, a veteribus medicis prætermissum miror.

Art. 691. Ipsæ tamen febres, quæ ex mesenterio veniunt, & nobis cum Baglivo audiunt mesentericæ in duo merito genera sunt dividendæ acutæ scilicet, & lentæ, sive chronicæ. Quare si in infimo ventre ardor, dolor,

Qui morbi ex phlegmone mesenterii oriuntur.

Eorum signa.

cum præternaturali totius corporis æstu, pulsu celeri, virium prostratione, anxietate & inquietudine se se prodit, in intestinis hæc consistere judicandum. Febres etiam quæ cum dolore, ardore, nec non tumore imi ventris juncæ, & tandem per alvi fluxus putridos, & copiosos, vel etiam purulentos solvuntur, cum magna intestinorum difficultate ex Mesenterio provenire nil dubii est.

Ex mesenterio quoque, ibique stagnantibus corruptis humoribus prodeunt hemitritæ sic dictæ sive semitertianæ febres, quæ ex continua inflammatoria, & intermittente tertiana sunt compositæ, periculi non expertes. Notæ hæc jam fuerunt *Hippocrati*, & *Galeno*, easdemque nitide, & accurate descripsit *Spigelius* peculiari libro. Discrepant tamen a nostris in eo, quod quotidie circa vespæram, & alternis quoque diebus, levi accedente horrore ingravescendo, junctum habeant abdominis dolorem, ventrisque tumorem, & quandoque ad aliquot hebdomadas protrahantur, & nonnumquam in febrem lentam, & hecticam concedant. *Frideric. Hoffmann.*

Utiles
Animad-
versio-
nes.

Art. 692. Dolores palpitantes circa umbilicum, intestini tenuis, aut mesenterii inflammationem indicant, sæpe delirium movent, & in tympanitidem pessimum desinunt. Qui colicus dolor fixus est in ventre cum calore lancinate, pulsu duro, & siti intensa ab Inflammatione vel Erysipelate intestinorum oriri timor est, & a nonnullis tamen vocatur *Collica convulsiva*. De Gorter.

Curandi
ratio.

Art. 693. In inflammationibus hujusmodi statim mittendus est sanguis e brachio quacunque hora, dum necessitas urget. Præter sanguinis missionem, omnia ex nitro hic, uti & in aliis inter-

internis inflammationibus juvant. Aliquando utor nitro perlato, interdum vero antimoniato cum hordei decoctione, vel potius decoctione rad. vel fol. scabiosæ, cujus potentes sunt vires in internis viscerum inflammationibus ad præcavendum gangrænifinum. Fuge nimiam remedium copiam. Si tamen ingens fuerit pravorum humorum in primis viis apparatus fomentis, & clysteribus minuendus. Et si hæc non fuerint satis, potio aliqua tamarindata leniens danda, dummodo tamen gravis ardor, & extrema inflammationis rabies contrarium non requirant. Maxima opus est in hisce casibus prudentia, & cautione. Nam ut sæpe vidi liquidorum cursus in mesenterio, veluti strangulatur a nimium congestis ibidem humoribus, & veluti de repente pereunt ægri. Pulsus tunc est parvus, & infelix, ac lethalis, licet reliqua salutem promittant. Nonnulli in hisce casibus more solito chinam chinam præscribunt sed infelici successu, nam hoc remedium impuro corpori dare, sæpe in ægroti perniciem vertitur præcipue in maximo apparatu humorum in Mesenterio. *Baglivus.*

INFLAMMATIO PANCREATIS.

Ettmulleri sententia.

Art. 694. Inflammatio Pancreatis est affectus perquam occultus; vigilias, lipothymias, aliaque gravia symptomata inferens, in *abscessu* plerumque terminans. Interdum superveniente salutaris *fluxu cruento* curantur hi morbi.

Inflammatio Pancreatis.

Tozzi sententia.

Morbus
Pancre-
atis ab
iis Me-
senterii
disting-
guere
difficile
est.

Art. 695. Pari modo ac Mesenterium ipsum Pancreas quoque affici multoties compertum est: nam & obstrui, & inflammari, & obdurescere, & abscessus pati observatum est.

Horum viscerum affectiones propriis signis internoscere difficillimum. Suspiciari autem aliquando licebit de inflammatione, aut abscessu in Mesenterio, & Pancreate, postquam ad maturitatem pervenerint, & purulentæ egestionēs comparere cœperint, neque jecore; neque liene in humorem elato. Affecti autem Pancreatis longe difficilior conjectura erit, etiamsi a positu subter ventriculum; quis non se fallere arbitretur? Cum a diaphragmate id ipsum prodire possit; itemque a musculis lumborum, & spinæ adjacentibus.

Eorum
curatio
pariter
difficilis.

Art. 696. Sicut autem ista cognitu perardua sunt, ita & curatu difficillima; nam etiamsi maturuerint, non tamen facile aut per alvum, aut per vias urinæ ibidem congesta repurgantur; quamobrem retentum pus vel corruptionem afferet, vel si alio deferatur; novum, & quidem graviorem morbum patiet, ut Colicam affectionem, Paralyfin, Ischiadem, Dysenteriam. Quin & postquam abscessus fuerit mundatus, etiam inductum ulcus vitæ periculum minatur, cum nequeat convenienter abstergi, & consolidari, licet opportuna remedia adhibeantur.

Remedia
tamen
quæ ju-
vare pos-
sunt.

Art. 697. Veruntamen naturæ opera in hoc plurimum valet, illamque proinde Medicus promovere debet, exhibendo primum, quæ inflammationem, si fortasse prænoscat, impediunt, qualia sunt omnis generis Bezoardica, stibium
dia-

diaphoreticum; sal volat. C. C. Viperar. succum. sp. sal. armoniac. dulcis redditus, Elix. P. P. tinct. martis, & antimon. item sperm. coet. sang. hirci, mumia, coagulum leporis aut hædi, extractum hyperici, & baccar. juniperi. Potiones vulnerariæ optimæ quoque sunt, præcipue disrupto jam apostemate. Terebinthina pariter fructuosa est, ut & balsamum Peruvianum, Tolutanum, & ligni Guajacii.

Art. 698. Quodsi necessarium sit, inchoatum *Diure-*
naturæ motum per vias urinæ promoverè, con- *tica*
ducent diuretica, aquæ thermæles; ocul. cancr. *quando*
sal cardui benedicti, & centaurii minoris, ve- *adhiben-*
rum salis balsamum colore aureum, sapore dul- *da.*
ce, & contactu linguæ volatile; pulvis, & es-
sentia macis, extractum glycyrrh. Trochisci
Gordoni

Art. 699. Si demum remaneat ulcus, suffitus *Mercu-*
ex cinnabari cum balsamis miram opem affer- *rii usus*
re consueverunt; atque horum usu quosdam bre- *efficacis-*
vi salutis restitutos vidi: etenim ab inducto sen- *simus*
sim ptyalismo e ductibus salivariis educitur hu-
mor ille, qui in pancreate, & mesenterio resta-
gnat ob communionem glandularum inter se,
& præcipue illarum; quæ in mesenterio sunt,
cum colli glandulis. Neque verendum de in-
terno mercurii usu, modo rite præparatus sit,
& diaphoreticus evaserit.

INFLAMMATIO HEPATIS.

Celsi sententia.

Art. 700. Morbus jecoris modo longus modo *Hepati-*
acutus esse consuevit. Acuti morbi signa sunt: *tidis de-*
sub præcordiis dextra parte dolor vehemens, *scriptio.*
idemque ad latus dextrum; & ad jugulum, hu-
me-

merumque partis ejusdem pervenit, eoque magis, si in gibba ejusdem parte inflammatio consistat; tunc enim usque adeo dolor vehemens est, ut ager convelli videatur, cujus nonnumquam manus quoque dextra torquetur; horror validus est. Contra si in sima seu concava jecinoris parte sit inflammatio plus fastidii, & nausea oboritur, unde bilis evomitur, interdum singultus prope strangulat.

Longioris vero morbi ubi suppuratio in jecinore est, signa sunt: dolor modo remittens, modo intendens, cum dextri præcordii duritie, & tumore, & post cibum major difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio ubi inveteravit malum, venter & crura pedesque intumescunt, pectus, atque humeri, circaque jugulum utrumque extenuantur.

*Cura-
tionis
ratio.*

Art. 701. Initio sanguinem mittere optimum est; tum venter solvendus est: si non potest aliter per nigrum veratrum, & imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida, quæ deducant, quibus recte iris vel absinthium adjicitur, post hæc malagma. Cibi potusque dandi fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt, præterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satireja, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri baccæ, pini flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo coto-neo medium, columbæ jecur recens, & crudum, sed parce assumpta. Neque alienum est, absinthium contritum ex melle, & pipere, ejusque catapotium quotidie devorare: abstinendum utique est, ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis jecur lædit. Profusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida si æstas tepida; item liberalis unctio, & in balneo sudor.

Art.

Art. 702. Si vero jecur vomica laboret, eadem facienda sunt, quæ in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam ultra id scalpello aperiunt, ipsam vomicam adurunt. Vide Hipp. Aph. sect. VII. aph. 44. 45.

Ettmulleri sententia.

Art. 703. Inflammatio Hepatis & ejusdem ab- *Hepati-*
 scessus vocatur alias Hepatitis. In genere perci- *tis.*
 pitur in omni Hepatis inflammatione dolor ob-
 scurus & tensivus ac gravitativus in dextro hypo-
 chondrio & ejus profundo, qui sub suppuratione
 punctorius plus minus evadere solet; adest
 febris lenta plus minus vero acuta pro ratione
 gradus inflammationis; ægri fere supini jacent,
 præsertim si diaphragma afficiatur, & tussis ari-
 da affligit. In genere in *pleuritide vera* omnia
 symptomata sunt acerbiora, in *hepatitide remis-*
siora. Periculosum est malum, & quod sæpius
 ad mortem deducit ægros; aut discutitur, aut
 successive suppuratur, aut in *scirrhum* degene-
 rat; *abscessus* nunc per alvum, nunc per uri-
 nam, interdum per tussim expurgatur; *singul-*
tus est pessimum signum.

Art. 704. Convenit *venesectio* in pede, pro- *Curatio.*
 sunt *sudorifera*, & *antipleuritica*, *antihecticum*
Poterii, *sperma ceti*, *nitrata*, *saturnina*, *cam-*
phorata & circa finem *diuretica*: externe *epithe-*
mata penetrantia & *discutientia*, postremo *sup-*
purantia, rupto abscessu *vulneraria* & *balsamica*
 interne.

Art. 705. Omnibus inflammationibus internis *Phthisis*
 suppuratis & male curatis supervenire solet *phthi-* *sequi*
sis. De *hepatitide* præ omnibus consulatur *Boer-* *solet.*
haave.

Inter legendum, & observandum.

Signa
Hujus
inflam-
matio-
nis. *Art. 706.* Jecinoris inflammatio ex tumore duro, & tensione dextri hypochondrii, quæ ad umbilicum usque non raro extenditur; Æger febricitat nec in dextrum latus decumbere potest, alvi segnitie laborat, urinas reddit rubentes, &c.

Curandi
ratio. *Art. 707.* Hic morbus eadem omnino ratione qua pleuritis curandus est, in primis ab initio usque vena brachii, & pedis tundi debet; atque in potum porrigenda ptisana ægro dulcificans, refrigerans, & diuretica.

De ab-
scessu je-
curis. *Art. 708.* Aliquando inflammatio hæc suppuratione desinit, unde hepatis abscessus oritur. Hujus generationem cognoscimus ex incremento doloris, tensionis, & duritie partis affectæ; tum etiam a febre, quæ crebris horroribus stipatur, quos ardentes sequuntur calores. Absoluto perfectoque pure jam hæc omnia symptomata iminuuntur.

Remedia
ad ab-
scessum. *Art. 709.* Generalibus adhibitis remediis phlebotomia videlicet, & purgatione: jecuris apostema cataplasmatibus emollientibus tractandus est ut sequitur.

Cataplasma. *℞. Medulla panis albi & recent. unc. x. lactis libr. ij. coq. ad consist. emplastr. tum add. vitell. ovor. unum. j. croc. pulv. ℥ij. ol. ros. unc. j. m.*

Hoc vero cataplasma ad maturandum tumorem admovetur; & ubi fluctuationem exoriri digitis explorantibus percipitur, in loco abscessus perforetur abdomen atque ut pus contentum facilius dimanet jubendus est ægro situs corporis ad hoc obtinendum aptior. Deinde vulnus plurima diligentia, & cautione tractetur; cavendo quo minus fieri potest, ne detectum re-

maneant, quia aer semper noxius est iis partibus, quæ ab eo naturaliter non tanguntur.

Si pus ad intestina usque pervenerit, quod ex alvi egestionibus cognoscitur, clysteres lenes, & deterfivi jubendi ex decoct. fol. malvæ, alth. verben. foem. &c. compositi quorum ana m. j. in aqua coq. & colat. add. mellis unc. iij.

Si vero pus ad stomachum vergat vomitum procurato, propinando ol. amyg. dulc. cum jure tepido vel aqua.

In quotidianum potum dabitur ægro ptisana diuretica, vel aqua pura nitro medicata, qua assatim bibendo plurimum levaminis lucrabitur.

INFLAMMATIO LIENIS.

Tralliani sententia.

Art. 710. Inflammato liene dolor cum tumore, & tensione, multaque gravitate vehementer urget, interim obstructio membri excitatur unde scirrhum ex inflammatione plerumque contrahit, interdum etiam sine dolore augefcit, durusque efficitur, quod tactu subinde cognoscere possumus. (Sed hoc ubi contingat absque prævia inflammatione ad morbos frigidos spectat).

Signa inflammationis ex humore bilioso sunt, quod totum corpus calidum est, & sine febre videtur, quæ tamen quovis tertio die exacerbatur, oculi tincti sunt, urinæ coloratiores, acresque, aut flavæ, aut rubræ existunt, ægri sitiundi frigidam bibere appetunt, animo sunt abjecto, cito furiunt, os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, & ventrisurbatione, linguam habent flavam, atque alia id genus similia, quæ bilem testantur, sustinent.

Signa

Ex hu-
more
melan-
cholico.

Signa ex humore melancholico sunt; cutis & urina nigrior; gingivæque similes, sitis etiam, & si ægri frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt.

Ex pi-
tuitoso.

Signa ex humore pituitoso sunt: color pallidus in cute, oculis, & lingua, ægri non sitiunt sed cibos appetunt.

Hoc item scire licet, quod ex bile omni tertio die ægri febricitant, ex melancholia omni quarto, & ex pituita quotidie.

Remedia.

Art. 711. Si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est; quare venam brachii sinistri interiorē secabis, & cum sanguis fluit attendendum est, ne rubens valde sit, & purus, an lividus. Nam si lividus est, aut æquo rubentior, copiosius auferri debet, si purus, ac sincerus, paucior; verum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Post sanguinis missionem levibus medicamentis alvus ducenda est, ut herba mercuriali, polypodio, cnico, atque similibus, veleorum loco clysteres juvant, & si in ventriculum humores influunt etiam vomitoria. Deinfomenta adhibere convenit ex vino austero si lævis affectio est, cui additur ol. omphacinum, & rosaceum, si calor urget. His adjicies: rosas, lentiscum, rubum, & simile quid adstringens, si affectio valida sit, absque calore. Quod si frigidus sit in liene humor adjuuge pulëgium, & si hoc satis non proficiat: thymum, origanum, & nardinum oleum impone.

Erismulleri Sententia.

Art. 712. In inflammatione *Lienis* eadem fere sunt symptomata in sinistro hypochondrio, ac

in inflammatione hepatis in dextro ; ideoque
diagnosís, prognosís, & cura fere eadem sunt.

Jonstonii sententia.

Art. 713. Signa inflammationis lienis sunt : *Spleniti-*
tumor in sinistro hypochondrio versus antero-*dis signa.*
ra quasi protuberans, & hominem quasi medium
cingens, sic a renis sinistri qui dextro elatior
dolore, & inflammatione distinguitur : pulsatio
& palpitatio illius lateris ob arterias, quibus a-
bundat. Febris continua quartanæ periodum ser-
vans. Respiratio ob diaphragmatis compressio-
nem difficilis.

Art. 714. Cl. Van Schvviecten in comment. *Ejus*
ad Boerhaav. aph. 958. postquam descripsit histo- *suppu-*
riam cujusdam ex lienis inflammatione suppu- *ratio.*
rati adjungit, Videtur autem, & Hippocrates
,, observasse lienis suppurationem : jussit enim
,, splenem, maximum jam, & sublatum, inuri,
,, ut in hepatis vomica consuluerat, ad pus
,, educendum. Et in alio loco antea ad §. 488.
,, citato de lienosis agens monet, morbum quan-
,, doque in hydropem degenerare, & contabe-
,, scere ægros ; quibusdam vero lienem suppu-
,, rari, qui usque sani fiunt ; quibusdam etiam
,, durum, & magnum lienem consenescere :
,, Aretæus etiam hoc pulchre monuit dicens :
Incrementi autem notæ sunt, febres dolores, &
horrores : multoties enim remittunt, post brevem
autem calorem rigore, & dolore vacant ; hac de cau-
sa interdum in splene abscessus latuit : raram e-
nim, & sensu carens etiam in sanitate viscus.
Exitus autem talis morbi notavit Hippocrates :
dicens : *Qui lienosi dysenteria corripiuntur, iis*
oborta longa dysenteria hydrops, aut lenteria suc-
cedit ac intereunt. Paulo post tamen dicit : *Lie-*
nosis

posis dysenteria succedens, bonum; Verum materia lienem occupans per venam splenicam facili via in hepar tendit.

Farrago sententiarum.

*Antiquorum
feracitas in
morbis
lienis.*

Art. 715. Satis frequenter mentio morborum lienis apud veteres fit, ita tamen ut merito suspicari liceat, quod quandoque, & morbos vicinarum partium sub titulo lienis male affecti, descripserint. Verum minus frequenter quam alia viscera lienem inflammari notavit Trallianus lib. VIII. cap. 12.

Signa.

Art. 716. Præcipua signa inflammati lienis sunt, febris acuta continua, dolor in loco lienis, quandoque ad humerum, mammam, & claviculam sinistri lateris protensus, quare non videtur improbabile, quandoque sub pleuritidis nomine tractari lienis inflammationem, cujusmodi historiam ab *Antonio de Haen* apud *Batavos Hagæ comitum Medico* acceptam, refert *Van Schvvietten*.

Cognoscitur item hic morbus ex calore, & gravitate lateris sinistri, tum etiam ex pulsationis sensu ibidem loci, difficultate respirationis cum febre acuta continua.

Remedia.

Art. 717. Eadem omnino ratione huic morbo ac hepatis inflammationi medetur. Externe prominenti tumori applicari debet cicutaë emplastrum. & si inflammatio in abscessum, abeat oportet eundem aperire, ulcusque subsequens juxta Chirurgicæ Artis præcepta curare, cum omnes interni abscessus magni momenti semper haberi debeant. *Boudon.*

INFLAMMATIO VESICÆ;

Aræti sententia.

Art. 718. Inflammatione urinariam vesicam tenente, urina retinetur, abdomen intumescit, dolor acutus totum ventrem occupat, vesica turgēt, decimo die luteus sudor exit, pituita vomitur primo, deinde bilis: universum corpus friget, sed pedes vehementius. Si malum vires majores acquirat, tum febres cum singultu hominem corripunt: micant arteriæ inordinatis, frequentibus, ac pusillis motibus: rubida facies est, sitiunt, animo ancipites sunt, mens non constat, nervi contrahuntur. *Inflammatio-
nis ves-
icæ u-
rinariæ
signa.*

Art. 719. Hæc omnia faciunt, non tam vesicæ inflammatio, quam grummi sanguinis, calculus in cervicem delapsus, & ea quæ vesicam deurunt: ut venenosa quædam, & cantharides, aut bupreste; unde tota alvus majorem vim patitur, neque longa mortis mora interponitur. *Causa.*

Art. 720. Acuti vesicæ morbi intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriusve hominem perimunt; refrigeratio enim, & extinctio caloris ingenti sequitur, quæ necrosis græci dicitur seu gangræna. *Prognosis.*

Art. 721. Curatio ex Ægineta elegantior est: Sanguinis detractio quam primum occurrendum est, mitigatoriaque facultate præditis asperginibus, & cataplasmatibus utendum ex ruta, anetho, fœnugræco, althææque radice. Clysteriis item mollibus ex oleo, & papavere, & adipe anserina. Opii quoque obolus semis, cum mirrha crocoque, ac oleo sedi immitendus. Mulsa propinanda. Abstinendum a valde lotium cientibus, multaque potio. *Curatio.*

- „ tione, nisi acris, & biliosus humor excedat,
„ tunc quippe copiosiori potui indulgendum.
„ Sumatur item cucumeris, & peponis semen.
„ Victus ratio quæ febricitantibus expedit.

Inter observandum, & legendum.

Signa. *Art. 722.* In vesicæ inflammatione dolor atque ardor in pube percipitur, atque urine suppressio, tenesmusque tenet, æque ac febris, delirium, & vigilia.

Remedia. *Art. 723.* Hujus inflammationis curatio a phlebotomia inchoanda est; quæ sæpius etiam repeti debet, prout symptomata requirere videntur. Clysteres ex lacte injiciendi sunt, & potus jubendus ex hordei decocto, cum vel sine nitro.

Balnea quoque, vel semicupia adhiberi possunt.

Perinæum vero decocto rad. & fol. malvæ, alth. parietar. capit. Papav. & fol. salicis, vel ol. aneth. chamæmell. ros. vel nymph. sæpe fovere præstat. Si urinæ suppressio diutius protrahat mictus adjuvandus est syringa in vesicam immissa, quam non raro necesse est aliquandiu introductam relinquere.

CAPUT III.

Sive Fasciculus Morborum tertius.

DE AFFECTIBUS CAPITIS
& Nervorum in genere.

Art. 724. **C**larissimus noster Sydenhamus a *Proœ-*
quodam interrogatus, quam ob *nam.*
rem non de morbis Capitis, æque ac de aliis,
scripserat? summa modestia ac candore respon-
diffe dicitur, *quoniam illos nondum intellexi.*
Et equidem agnoscendum est scientiam nostram
in hac regione valde mancam ac imperfectam
esse; utcunque tamen in hunc oceanum prope-
modum ignotum descendendum est, & a juvan-
tium, & lædentium contemplatione, quoquo-
modo possumus, cursus natura & experientia
ducibus dirigendus est.

Cheyne de natura fibræ epitome.

Art. 725. Diuturnorum morborum origines in *Origo*
genere sunt tres. 1°. *Humorum lentor sive tena-* *morbo-*
ritas. 2°. *Eorundem acor & acrimonia.* 3°. *De-* *rum*
perdita aut saltem imminuta fibrarum tensio sive *chroni-*
elasticitas. Omnes nervorum morbi ab infimo *corum.*
oscitatione nempe, & pandiculatione ad usque
summum, nempe apoplecticam dispositionem,
varii tantum videntur gradus unius ejusdemque
morbi, *debilitatis scilicet, aut relaxationis de-*
fectusque elasticæ facultatis partium solidarum,
quorum causæ sunt, ea quæ comitantur *lentorem*
& *acrimoniam humorum.*

Art. 726. Morborum Nervinorum tria sunt ge- *Naturæ*
nera. Primum est eorum, quorum symptoma *morborū*
X 2 præ-

Nervi
norum.

præcipuum est *facultatis sentiendi debilitas temporaria aut perpetua, vel totalis ejusdem cessatio*, quam sequitur motus voluntarii suspensio; hujusmodi morbi ab humorum lentorum, & viscosorum copia nimia tanquam causa principali oriri videntur. Multi sunt hujus generis morbi ab usque gravi apoplexia, qua omnium simul nervorum origo comprimitur, omniumque vibratio, ne ad animæ sentientis sedem propagetur, intercipitur, ad sensum ingenique hebetudinem, & stuporem. Huc etiam aliquatenus referenda sunt *hypochondriacorum & hystericarum deliquia & paroxysmi*. Secundum est eorum, quorum præcipuum symptoma est *motus voluntarius aut impeditus aut abolitus*; tales sunt morbi generis paralytici, a paralyti universali usque ad segnitiam, & inexpeditum inhabilemque artuum motum, membrorumque frigiditatem; atque hi fibrarum & nervorum & præcipue muscularium debilitati, imbecillitati, aut tono amisso deberi videntur. Tertium denique eorum est, quorum præcipua symptomata sunt *spasmi, contractiones, & convulsiones muscularum*: tales sunt morbi convulsivi dicti ab epilepsia, & convulsione, hypochondriacis & hystericis paroxysmis, usque ad oscitatum, & pandiculationem: & hi in universum acriori stimulo debentur, quorum origo est falsa quædam & erodens acrimonia fluidorum, acida præterea & stimulans aura, vapor, aut obstructa perspiratio. Hæc Nervinorum morborum per genera sua distributio maxime naturalis, & latissime patens videtur. Fibrarum infirmitati indivulsus comes adhæret, & pro ejus gradu minor majorve est omnium functionum animalium *languor & debilitas*.

Indica-
tiones
Curati-
va.

Art. 727. Ex prædictis patet tres indicationes sive intentiones curativas oriri; scilicet, prima est

est diluere, attenuare, eorumque lentorem tollere, & canales obstructos aperire & meabiles efficere. Secunda est humorum acrimoniam tollere, molecularum nexus dissolvere & spicula frangere. Ultima denique & præcipua intentio est solidis partibus tonum suum & vim elasticam reddere. Huic enim ultimæ intentioni assequendæ minime al- laborandum est, antequam duabus prioribus felicem operam tamdiu dederimus quamdiu id postulare videtur morbi indoles. Quamdiu enim humorum lentor aut acrimonia manet, frustra, aut si succedat, magno ægri damno fibræ corrugantur, & intenduntur, & profecto hoc monitum est maximi momenti. Præmissis universalibus, primæ intentioni satisfaciunt quæcunque particularium pondere, agilitate, aut quavis proprietate, succis crassis, viscidis, lentis, incidendis, attenuandis & fluidis reddendis idonea inveniuntur: Talia sunt *calomelas, athiops mineralis, cinnab. antimonii & nativ. antimonium diaphoreticum bezoardicum minerale & Joviale, sal Jovis, succz antiscorbutici, vina & cerevisiæ medicat. decoct. & lign. &c.* Inter ea primum locum tribuo *cinnab. antimonii*, quæ scilicet ex omnibus una ventriculo minime molesta est, nec ita facile torminibus intestina excruciat, aut catharsin ciet, præcipue recens & artificiose elaborata. Ipse ego maximas ejus vires sæpe miratus sum, cum, nullo alio medicamento simul adhibito, laudum ejus vel minima pars communis esse posset.

Art. 728. Ad finem secunda intentione propositum assequendum, mirabiles profecto sunt vires medicamentorum *sulphureorum*; eidem etiam proposito conducunt medicamenta *absorbentia & Alcalina dicta, gummosa & volatilia*: diligenter interim cavendum est, ne *volatilia* intempestive nimiave copia ingerantur: tunc enim humo-

ribus haud satis dilutis, eos nimia vi agitabunt & ardorem febrilem excitabunt. In *gummosis* insignis est incidendi, & attenuandi vis, *saponi* æmula; medicamentorum autem *smegmaticorum* vires in obstructionibus referendis, & ictero speciatim domando satis notæ sunt. Sed cum eximia calefaciendi vi polleant, nunquam adhibenda sunt antequam humores satis diluti fuerint. Ultimæ denique intentioni, quæ est fibras laxatas constringere, remissas intendere & corrugare, sequentia accommodata sunt, *cortex Peruv.* *cortex Eleutherii*, *viscus arboreus*, *cinnam. calam.* *arom.* *cort. aurant. amara* quæcunque, *catechu. rhabbarum torrefactum*, *styptica*, *e ferro parata*, *aque chalybeata*; reliquis vero omnibus præstat *cortex Peruvianus*, ut a multiplici experientia per multos annos didici in omnibus laxæ fibræ morbis. *Tincturam Burgundicam* præscribere soleo.

C E P H A L A L G I A.

Celsi sententia.

Descriptio. *Art. 729.* In Capite interdum acutus, & perifer morbus est, quem *κεφαλαία*, *Græci* vocant, cujus notæ sunt horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sicut vox supprimatur; vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est.

Curatio. *Art. 730.* In dolore, qui acutus est, & qui supra consuetudinem intenditur, convenit *venæsectio*, sed nisi intolerabilis sit, supervacuum erit.

erit venam secare; satiusque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere; si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam; sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit.

Vuillisi Sententia.

Art. 731. Si dolor capitis inveteratus, & fere *Prognosis.* continuus fuerit, ut jure suspicemur eum a tumore *phlegmonode*, *erysipelate*, *scirrha*, *abscessu*, aut *vermibus* oriri; curationis spes exigua aut nulla superest. Si dolor capitis sit immanis, atque vertiginem, vomitionem, aliosque affectus aut convulsivos aut soporosos adjunctos habuerit, frequenter in *apoplexiam* lethalem, aut *epilepsiam*, *paralysin*, *cæcitatem*, *surditatem*, &c.
 „ Quum caput parte aliqua (*inquit Lommius*)
 „ aut circumcirca dolet, si pus, vel aqua vel
 „ sanguis naribus, ore, aut auribus exit, scire
 „ licet malum solvi.

Art. 732. Ad curationem hujus morbi detra- *Curatio.*
 ctio sanguinis e venis sedalibus *hirudinum* suctu locum habet, item *aque minerales cathartice*, *cremor tartari* in sero lactis solutus, *vesicatoria*, *opiata*, *infusum Coffee*, *fol. salvia*, *rorismarini*, &c. instar *Theæ* epotum. *Millepedes* quoque curandis Cephalalgis pertinacibus opem sæpe egregiam præstant. Dolor capitis post morbil- *Post mor-*
 los aut *variolas* totidem horis a pastu accedens, *billosa ut*
 præmissis universalibus, *antiscorbuticis & chaly-* *variolas.*
beatæ curatur.

Ettmüllerii sententia.

Cephalalgia calida. *Art. 733.* Cephalalgia est vel calida ; prout sanguis magis fervet ; tunc sensus caloris præsertim circa frontem percipitur ; vel frigida , cum nihil tale occurrit , sed potius frigus sentitur , aut saltem adest gravedo capitis. Ex omni Cephalalgia per consensum frequentissima est illa , quæ fit ex *stomacho*. Cephalalgia *habitualis* inveterata est difficilis curatu , terminare solet in *vertiginem* , *apoplexiam* , *epilepsiam* , *paralysin* , *cacitatem* , *surditatem* , &c. Ex omnibus dolor capitis *scorbuticus* est contumacissimus.

Biliosa & pituitosa. *Art. 734.* „ Cephalalgia (*juxta Dolæum*) recte dividitur in *biliosam* & *pituitosam* ; in priori casu dolor est valde acutus cum insigni ardore ; particulæ biliosæ acres vel salino-sulphuræ in sanguine abundant ; ideoque adhibenda est *venasectio* , leniter *purgantia* , aliaque ad temperiem sanguinis alterandam , temperandamque facientia. In cephalalgia *pituitosa* materia peccans est crassa ac tenax , indeque dolor gravativus , adest stupor mentis , segnities ; hæc species *cathartica* fortiora postulat ; proficua sunt decocta *lignorum* , *salia volatilia* , *cinnabarina* , *cephalica* , potus herbæ *Theæ* ; si malum a stomacho debilitato trahat suum ortum , tunc conveniunt *corroborantia* , *stomachica* , *acidulæ spadenses* , &c. Ad Curam Cephalalgiae in genere apprimè conducit dosis *pil. cathartic. cum mercur. dulc. Æ.* & *laudan. gr. j.* hor. somni & aliquoties repetita , item decoctum *e lignis cum roremarin. salia volatilia* , *cinnabarina nativ. succinata* , *samphorata* , potio *Theæ (Coffee.)* In contumaci

maci capitis dolore empl. de *ranis cum mercurio* capiti raso apponi potest.

Art. 735. Hemicrania (cum dolet dimidium caput) est gravissima species Cephalalgiae; præmissis universalibus experimentum est singulare cataplasma factum ex *rad. cucumeris asinini vel brion. cum verben., & absynth. &c.* Hemicraniis deploratissimis (inquit *Turner*) laborantes *Arteriotomia* temporum aliis omnibus incassum tentatis, feliciter liberavit; iddemque ab aliis præstitum novi; Si dolor capitis sit in modum hemicraniae (inquit *Chesneau*) & parvum locum occupet, etiamsi adsit febris continua, nihil applicatione *ranunculi* præstantius inveni; universalibus præmissis, dolorem ad miraculum tollit; ad hunc modum utor, dextra capillis, si sit locus pilosus, parti dolenti imponatur quodvis emplastr. adhæsivum cum foramine in medio ad amplitudinem denarii, ut in applicatione *Pyrotici* solet fieri; deinde supra foramen applicentur *folia ranunculi contusa, multo succo madentia*; in tenero loco, & depilato duarum horarum spatium cutem aperit, in capite vero, ubi pili nascuntur, non facile aperit, sed parte in tumorem elevata dolorem sedat. Hoc unum advertendum, ut circa oculos ponatur parva quantitate propter palpebrarum, & partium circumjacentium inflationes, quas gignit, stupendas, nullius tamen periculi.

Hemicrania

Baglivi sententia.

Art. 736. Sunt qui ob nimium sensum, sive fibrarum ariditatem, capitis dolore laborant; in quo casu, quoniam dolor solidi vitio potius quam fluidi oritur, ad *narcotica* libenter veniendum; nam tuto applicari possunt, quoniam

Dolor capitis ob nimium fibrarum sensum.

non

non aliud debent efficere, quam obtundere nimium fibrarum sensum: ter aut quater observavi dolores capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo *pulv. de Guttet.* ad ʒj. dato, feliciter cessisse.

Farrago Sententiarum.

Euporist. Art. 737. „Acerrimi dolores capitis *euporisto*,
 „sanari possunt nempe *strophio* aqua frigida
 „*madido* collum circumdante, & cum a nativo
 „calore incalescit linteum pro novo permutan-
 „dum, unde dolor quasi excantatus definit, &
 „rediens eodem stratagemate elusus fugatur;
 „(*sed temerarium est experimentum.*)

Arterio-
tonia. Art. 738. In hoc malo *Parisiis* nihil frequen-
 tius, quam *sectio arteriæ temporalis*; aliquando
 chirurgus transversim secatur; idque felicius quam
 ubi punctum incidit, sicut enim magis coeunt di-
 visæ arteriæ partes *Trophimus Serrier. M. Hom-*
berg memorat exemplum *Cephalalgiae pertinacis*
 ac inveteratæ per combustionem accidentalem
 curatæ.

Remedia. Art. 739. Camphora in spiritu quolibet ce-
 phalico, & naribus attracta Cephalalgiam sedat,
Greenfield.

Varia. Art. 740. Succus *hederae terrestris* naribus at-
 tractus, cephalalgiam penitus aufert, *Raii* hist.
 plant. videatur locus, pag. 567.

In Ce-
phalalgia
habitua-
li. Art. 741. In cephalalgia habituali, & perti-
 naci pulvis *maris syriaci* est fere specificum;
 dos. ʒß. ut ab amico medico accepi.

Art. 742. Refert *Ruyschius* (*Obs. Anotom. &*
Chirurg. obs. 40.) casum pertinacis Cephalalgia,
 quæ omnibus remediis incassum tentatis Seta-
 ceo Nucæ admoto demum conquievit. Quous-
 que applicatum hoc remedium persistebat nul-

lus dolor ægrum vexabat , sed eodem remoto ,
mox revertebatur , quæ sane alternatio diu per-
severans , evenit demum ut omnino cessaret ,
ægerque in valetudinis gratiam rediret .

Art. 743. Capitis dolor diversa sibi nomina *Nomina*
sumit habita ratione partium capitis quas exer- *quæ ca-*
cet . Quando totum caput tenet dicitur *Cepha-* *pitis do-*
lalgia , quando hujusmodi dolor totum caput te- *lori tri-*
nens diuturnus , & pertinax est *Cephalea* voca- *buun-*
tur , si nisi dimidium capitis exercet futura sa- *tur.*
gittali limites ponente *Hemicrania* , si nisi pars
quædam capitis inter sagittalem , & temporalem
futuram posita afficiatur *Ovum* , si demum nisi
particula quædam ubivis in capite excrutietur
Clavus nuncupatur .

Art. 744. Si dolor a sanguinis densitate , *Remedia.*
exoriri videatur , qui cum per vasa meningum
libere circulare nequeat , nec per ea *Pericranii* ,
discentis horum vasorum fibrillis sensum doloris
faciat , tunc evidens est , quod remedia præcipi
debent , quæ densitatem sanguinis attenuare ,
ejusque retardatum motum concitare valeant .
Hinc Lexici Medicinalis Auctor sæpe laudatus
tamquam efficacissimum auxilium commendat
ut .

℞. Salv. majoran. chamædrios ana ℥j. betonit. Pulvis.
vel ejus flor. tum flor. rorismarin. stechad. ana ℥
sem. exsicc. f. pulv. cujus quolibet mane ℥j. in cya-
tho vini albi propinetur .

Dum per dies x. vel xij. hoc remedio utitur
æger , pro potu ordinario sequentem adhibeat *Pti-*
fanam .

℞. Rad. chin. unc. j. sassafr. ℥iij. coq. in aq. font. Piisa-
℥iv. usque ad tertie partis consumpt. & colat. ser- na
vetur usui .

Si dolor a sanguinis effervescentia , & rare-
factione producat , ob quam meningum fibræ ,
dedu-

deducuntur remedia sunt , quæ crasso sulphure abundant; ut inde volatilibus sanguinis particulis firmatis nimia agitatio impediatur. Huc mirabiliter facit ptisana .

Altera. ℞. Rad. nymph. unc. ij. aq. font. lib. iv. bull. per horæ quadrantem, & in fine ebullit. adde fol. la-
*Etuc. man. j. sem. anis. pug. j. opii gr. ij. in nodulo su-
 spens. sal. tartar. ʒj. tum continuata ebull. per alter-
 rum horæ quadrant. Colet. liquor. & servetur usui.*

De hoc bibat, æger ter in die cyathum ma-
 ne scilicet, post prandium, & vespere cubitum
 iturus, & continuare poterit, per quinque vel
 sex dies.

Narco- *Art. 745.* Quoad opii, & narcoticorum usum
tica. observandum est, generalia prius præmittenda
 fore, puta phlebotomiam, & purgationem, qui-
 bus frustra adhitis narcotica parva admodum do-
 si primo porrigentur, deinde vero sensim gene-
 rosius. Quodsi ex opio somnus nimis diuturnus
 forte consequatur, talicasu acetum naribus ad-
 moveri debet, atque etiam injici.

Obser- *Art. 746.* Dantur etiam capitis dolores a lym-
vationes phæ inter pericranium diffusæ acredine produ-
& moni- eti, qui nulla meliori ratione abigi possunt,
sa. quam admoto vesicante.

Tum etiam quidam alii dantur continui sæ-
 pe etiam intolerabiles ab exotico quodam cor-
 pore intra cranium genito, aut fluctuante pro-
 ducti, quibus nisi instituta cranii terebratione
 nullatenus subveniri potest.

Observandum est diligenter, an qui capite
 dolore laborant, intestina, stomachumque impu-
 ritatibus conferta gerant; nam in iis cuncta re-
 media irritè præscribuntur, ni vomitorio, &
 purgante primæ viæ evacuentur.

Qui dolores a causa scorbutica, aut aphrodi-
 siaca generantur, impetendi sunt remediis spe-
 cifi-

cificis, & causæ corrigendæ ac subigendæ idoneis, secus enim quælibet alia remedia inutiliter cederent.

Sæpenumero tamen pertinax inveteratusque, capitis dolor imminuitur porrectis ad odorandum salibus volatilibus oleosis, elix. propriet. aq. Reginæ Ungariæ, sp. volat. sal. armoniac. aliaque spirituosa; sed effectus diuturnus quidem non est, nec obtinetur, nisi ubi ex densitate sanguinis dolor proficiscatur; nam si ab ejus tenuitate veniat, tunc aucta agitatione effectus contrarius obtinetur.

Verbena inter specifica ad capitis dolorem celebratur, tam si decoctionis forma intus assumatur, quam si externe applicetur.

Art. 747. Inter Topica sequens Epithema laudatur. Topica.

℞. Sem. jusquiam. unc. j. acet. rosat. unc. v. diger. in phiala vitr. sup. ciner. calid. dein instilletur vel Spongia applicetur fronti.

Aliis arridet magis, locum doloris vin. spir. camphorato sæpe humectare, alii vero fronti applicare hederæ terrestris cum aceto contusa folia. Nonnulli item testantur ipsius hederæ succum naribus attractum pertinacissimas hemicranias sanare.

Turnerus affirmat felicissime hemicraniam curasse secta arteria temporali, postquam incassum omnia alia remedia adhibuerit, atque adjicit ab aliis Chirurgis fide dignis accepisse, eosdem arteriotomiam pro tali morbo optimo cum successu celebrasse.

Si capitis dolor similis est hemicranix, ait Chesneau, nec nisi parvam capitis partem occupet, tunc utut febris urgeat, præstantius non inveniri remedium, quam præmissis generalibus ranunculi folia sequenti ratione admovere. Loci
affe-

affectu cutis novacula depilatur, si pilosus locus est, tum adhærens emplastrum extenditur, in cuius medio foramen satis latum adsit, quemadmodum in causticorum applicatione usuvevit, quod foramen foliis contusis, & proprio succo imbibitis repletur. Bihorii tempore in loco non piloso, & satis molli cutis dehiscit, in capileoso vero cutis integra manet, sed tumor elevatur, quo mediante dolor simul conquiescit. Cavendum ne remedium hoc nisi parva admodum dosi locis prope oculos admoveatur; Extraordinarias intumescencias in palpebris locisque propinquiorebus excitat, si paulo majori dosi applicatur.

VIGILIAE NIMIÆ, Seu Pervigilium.

Inter legendum & ex Observatione.

*Vigilia
nimia.*

Art. 748. Interdum est morbus solitarius sine alia evidente ægritudine; ita tamen ut nonnulli istud sine molestia singulari ferant: alii vero mox languorem & appetitum prostratum inde percipiunt; ab alio morbo fere semper pendet.

Prognosis.

Art. 749. Quod caret alterna requie durabile non est.

*Quibus
potissimum
accidunt.*

Art. 750. Melancholici, maniacy, & similes præ aliis molestissima patiuntur pervigilia, ita ut quidam melancholicus per quatuordecim menses fuerit vigil & insomnis; & tales, utut per longum tempus in continuis sint vigiliis, hoc malum tamen sine insigni virium debilitate perferunt.

*Senum
vigilia.*

Art. 751. In senum Vigiliis non *anodyna* sed *confortantia* & *aromatica*, *analeptica* ex vino *dulci*, &c. sunt optima.

Art.

Art. 752. Somnus naturalis est status corporis, in quo imminutus est spirituum influxus in organa externa, nempe respectu motus eorum in vigiliis, non tamen penitus abolitus est. In somno omnes secretiones, excepto sudore vel insensibili perspiratione, minuuntur. Somnus moderatus ad sanitatem plurimum confert, coctiones perficiendo, & vires redintegrando.

*Somnus
quid &
ejus
commo-
da.*

Art. 753. Si vigiliæ in bona valetudine, aut in morbis chronicis, ab animi angore, a labore, a studiis, vel a crapula exoriantur, omnes hujusmodi causæ removendæ sunt, tunc somnus conciliabitur. Quod si ab interna quadam dispositione producantur emulsionum ope somnus invitandus est, qui si nondum accedat, adhibebuntur pilulæ Styracis, quarum dosis a gr. vj. usque ad xviii. vel dictæ de Cynoglossa, quarum dosis a granis viij. ad gr. xx. vel etiam Laudanum liquidum Sydenhami cujus dosis a gutt. x. usque ad xxx. vel aliud Laudanum liquidum cujus compositio hujusmodi est.

*Curatio
pervigili-
lii.*

*℞. Caryophyll. cinamom. macis ana ʒ sem. sal. Laudanum li-
tartar. ʒij. extr. opii frustulatim incisi unc. vj. vin. hispan. ℥vj. infund. per sex dies in vase probe clauso, & filtrato liquore relinquitur ad subsidendum. quidum
Eodem demum decantato servetur usui. Dos est
gutt. xx. vel xxx. cum vino, aqua, aut alio liquore
propinandus.*

Hujusmodi Laudanum ex facilioribus paratu est, ejusque compositio probe comparata atque concinnata videtur, ideo hic tradere non dubitavimus. Pluribus quidem in Xenodochiis Angliæ magni usus est. Qui vero tantam ejus copiam sibi comparare non amant proportionaliter imminutis componentibus parcius manum operi admoverye possunt.

Art.

Epithe-
ma.

Art. 754. Ad conciliandum somnum hoc habet remedium Rulandus.

℞. Aq. rosar. unc. viij. opii gr. j. croci gr. xl. m. quo imbibito strophilo temporibus applicabitur.

Art. 755. Inter Soporifera clysteres quoque recenseri debent, ex decoctione fol. nenuphar. lactucæ C. C. &c. in qua opium a gr. iij. usque ad gr. vj. dissolvitur.

De nar-
coticorū
usu.

Cavendum tamen ne opium aliaque narcotica senibus temere præscribantur, ut eosdem in somnum disponamus, nec hisce remediis utendum est, ubi morborum Crises iminent.

Lava-
rium.

Art. 756. Quibusdam ad conciliandum somnum arrident lotiones quædam cujusmodi est quæ sequitur.

℞. Fol. vitis, salicis, nenuphar, chamamel. aman. j. capita pap. alb. num. iv. cum toto, aq. font. q. s. f. decoctio, qua, facies, tempora, manus, pedesque abluentur atque lincis eadem madefactis ac imbibitis obvolvuntur.

Pisana.

Art. 757. Ad somnum incitandum sequentis ptisanæ usum laudat Van der Linden.

℞. Capit. papav. alb. num. ij. hord. integr. man. j. glycyrrhiz. unc. sem. aq. commun. lib. ij. ebull. ad consumpt. quartæ partis, & colat. sit pro potu ordinario.

Clyste-
res.

Art. 758. Quidam eadem de causa clysteribus utebatur ex cortic. rad. mandragoræ capit. pap. alb. & semin. aneth. lacte coctis. Hujusmodi decoctio congrua equidem videtur ad usum enematis, sed prudenter eadem adhibenda est, quod dictum etiam de narcoticis omnibus generaliter intelligimus.

M O R B I S O P O R O S I :

Inter legendum & ex Observatione.

Art. 759. Coma seu cataphora, lethargus, & *Morbi*
 carus sunt affectus soporosi secundum magis & *soporosi.*
 minus, potius quam essentialiter a se invicem di-
 screpantes; in hoc conveniunt, quod *saporem*
morbificum inducant; fiunt ut plurimum ab una
 eademque causa, nimirum pituita in cerebro
 collecta.

Art. 760. Coma est somnus profundus, a quo *Coma.*
 tamen æger excitatur, & oculos aperit, & res-
 pondet, iterumque mox profunde obdormit.

Art. 761. Lethargus comati similis est, sed cum *Lethar-*
 febre & delirio conjunctus; lethargici (inquit *Au-*
gustinus) leviter sunt excitandi suis nominibus ex-
 clamati; etenim jugiter titillatu, vel impressio-
 ne forti ac punctationibus hoc facere, nihil aliud
 erit, quam strictionem asperare ob inquietudinem
 vexationis; blando articulorum fricamento uten-
 dum est; linguæ asperitatem vel ariditatem *spon-*
gia infusa aqua calida humectemus, &c.

Art. 762. Carus est somnus adhuc profundior *Carus.*
 sine febre, ex quo æger excitatus oculos vix
 aperit, & non respondet; attamen vellicatus
 sentit integra manente respiratione; est proxi-
 mus ad *apoplexiam* gradus.

Art. 763. Ex his affectibus, eorum cura, qui *Curatio*
 a febre pendent, & sunt ejusdem symptomata, *horum*
 in capite de febribus recensetur; & reliqui, qui *affectuum*
 febre carent, tanquam leves *apoplexiæ* gradus spe-
 ctari possunt. Ubi morbi soporosi aliis morbis,
 febribus, &c. superveniunt, non temere secan-
 da est *vena*, sed *purgatio* instituenda, & quidem
 in his casibus medicus magni nominis *D. Rad-*
cliff.

cliff. resin. Jalap. Dj. ausus est exhibere successe mirabili. In caro, lethargo, aliisque soporosis morbis *acetum naribus insufflatum* plus excitat quam spiritus quilibet volatilissimus Alkalinus.

Coma vigil. *Art. 764.* Coma vigil est, quando adest quoad externa sensuum organa somnolentia summa, quoad interna perpetuæ vigiliæ; æger clausis oculis permanet, & somnum capere videtur, attamen dormire nequit, variis imaginibus & deliramentis impeditur; raro est morbus *solitarius*, sed potius *symptoma* febricitantium; signum esse solet imminentis *Phrenitidis*.

V E R T I G O.

Ægineta sententia.

Vertiginis causa. *Art. 765.* Accidit affectio vertiginosa, primigenia, seu essentialis, quando gelidus glutinosusque humor cerebrum occupat: unde ea correpti, etiam levi de causa facile concidunt, ut si quando extrinsecus circumagi aliqua, v. gr. rotas, vortices, turbines, conspexerint, vel si ipsi quoque in ægrum vertantur: interdum vero quando capite incalescunt, ex copia sanguinis in eo delati, commotisque in eo humoribus, atque etiam spiritu. Nonnumquam vero coarctatis in angustum cerebri cavernis; perforatu cranii rupti, ex quibus sane vehementissimi cruciatus oriuntur.

Præcedit autem primigeniam affectionem capitis dolor violentus, carus, sopores, & sibila aurium. Læduntur nonnulli quidem odoratu, aliqui vero gustu.

Quibus vero per consensum oris ventriculi vertigo accidit, cardiogmus hos, & nausea consequun-

sequuntur „ Hæc autem vertigo ex stomacho
 „ *sympatica* dicitur.

Art. 766. „ Modum quo fit vertigo ceteris *Ejusdem.*
 „ veteribus, & recentioribus quibuscumque pri- *plicatio.*
 „ mus omnium explicavit *Pitcarnius*. Cujus ver-
 „ ba hæc sunt: „ Dixi in descriptione morbi hu-
 „ jus, cum esse apparentem rerum prorsus im-
 „ motarum motum circularem; unde patet,
 „ res visas eundem semper locum servare. Igi-
 „ tur cum motus iste circularis verus non sit,
 „ atque visus sit, nec in rebus ipsis, vel obje-
 „ ctis, nec in spiritibus animalibus; quærendus
 „ erit in nervo optico, aut oculo, aut in alio
 „ quopiam intra oculum condito, sive canali,
 „ sive liquore.

„ Et patet, objectum videri debere circula-
 „ riter motum, si imagines, quæ ab eo ve-
 „ niunt, incidant in diversas retinæ partes suc-
 „ cessive, v.g. sinistrorsum progrediendo, dum
 „ objectum revera est immotum, & imagines
 „ ab eo emanantes eandem semper repræsen-
 „ tant distantiam, illud, inquam, videbitur per
 „ dextram a sinistra in gyrum moveri. Hoc
 „ autem fieri potest, objecto immoto, oculoque
 „ solo moto.

Art. 767. Vertiginosi in accessione quidam *Curatio.*
 concinnis odoramentis, frictionibus, ac aliis
 consimilibus excitandi sunt. In relaxatione ve-
 ro discutiendæ affectionis gratia, sanguis ante
 omnia detrahendus, deinde hiera purgandum.
 Interposito temporis spatio clystere acriori uten-
 dum, ex centaurii, aut colocynthidos decocto.

Post hujusmodi inanitiones caput cucurbitu-
 lis occipitio adglutinatæ incisa cute scalpello
 laniabitur; post hæc apophlegmatismis, & Per-
 nutamentis utendum.

Quos vero calor capitis, & aurium tinnitus

molestat; veluti quando vapores calidi per arterias ascendunt, etiam arteriarum post aures incisio adhibenda est,, En quousque veterum præcepta monitaque nos cum nostris Theoriis despeximus!

Villisi Sententia.

Vertigo. Art. 768. Vertigo est affectio, in qua objecta visibilia, circumrotari videntur, sentiuntque affecti perturbationem seu confusionem spirituum animalium in cerebro, ut nervos non rite influant; quare facultates visivæ & locomotivæ sæpe aliquatenus vacillant, ut laborantes corruant, & non raro a tenebris obfuscentur.

Prognosis. Art. 301. Quoad morbi hujus sedem notabile discrimen occurrit; frequenter enim *anterius* confita est, & vix omnino *caduca* est, & therapiam admittit; quandoque autem *posterius* orta longe periculosior existit, & non raro in *apoplexiam* vel *paralytin*, aut in morbum *convulsivum* transit.

Curatio singularis. Art. 770. Pro Vertiginoso post alia incassum tentata hunc in modum præscripsi; ℞. pulv. rad. paon. mar. ℥ij. flor. ejusd. ℥j. sterc. pavonis albiss. ℥ss. sacchar. albisc. ℥ij. dos. circiter coch. j. bis in die superbibendo haust. decoct. *salvia* aut *rorismarini*, *Coffee vinctura* imprægnati; vix credibile est quantum ab hoc remedio juvamen recepit, post mensem sanus evasit.

Ettmulleri Sententia.

Tres gradus hujus morbi. Art. 771. Vertigo a vertendo; omnia enim in hoc affectu circumrotari videntur; attamen non semper adest talis circumgyratio; sufficit enim motus *tremulus & undulatorius*. Tres sunt gradus, 1^o. *vertigo simplex*, quando sit saltem cir-

circumgyratio subito evanescens. 2o. *Vertigo te-
nebricosa* seu *scotomia*, quando oculi caligine ob-
scurantur, aut apparent coram oculis varii co-
lores. 3o. *Vertigo caduca*, quando æger protinus
concidit, atque hæc ad *epilepsiam* quam proxi-
me accedit.

Art. 772. Dum res externæ gyrari videntur, *Evena-
tu.* hoc fit in oculo non in cerebro, non enim in ce-
rebro videmus. (de *Ætiologia* hujus morbi extu-
nica retinæ dimotione videatur *Bellini*) Verti-
go gravior & diuturnior ut plurimum in senibus
apoplexiam, in junioribus *epilepsiam* prænuntiat;
modo *anteriorem*, modo *posteriorem* capitis par-
tem affligit; illa est curabilior, hæc periculosior.

Art. 773. Vertigo frequenter fit per *consensum* *Curatio.*
a vitio stomachi, vel primarum viarum; in hoc
casu convenit *vomitorium*; remedia *stomachica*
specifica, *antepileptica*, &c. Pro cathartico extra-
ctum *hellebori nigri* & *mercurius dulcis*; conve-
nit *venesectio* in plethoricis; *sternutatoria* sunt
præcipue vitanda. Præmissis ergo præmittendis,
ad *stomachica* & *specifica* deveniendum est, *se-
men sinap.* omni mane comestum est egregium,
item *aromatica*, *confectio alkerm.* *cinnab.* *antimon.*
radix peon. *flores lilior.* *convul.* *salvia*, *rosmari-
nus*, *stercus pavonis* est specificum nobile; *cinnab. nativ.* *spiritus* & *salia volat.* *succinat.* &c. lau-
dantur.

Mayernii sententia.

Art. 774. Methodus medendi in vertigine hoc *Methodus me-
dendi.* modo se habet; si adsit plethora, sanguis mit-
tendus est; post *venesectionem*, (si necessaria sit)
præsentibus nausea vel appetitu prostrato, vel
aliis affecti ventriculi indicibus *emeticum* propi-
nandum est; deinde *purgatio* per sedem instituen-
da,

da, & postea *specifica* exhibenda. *Calamus aromaticus* quocunque modo sumptus ad vertiginem valet, imo pro secreto habetur. Medicus quidam *Germanus* multos curavit pil. sequent. per plures dies exhibitis, (si recte conjecturam faciam *vide locum*) *℞. Sacchar. saturn. q. v. tereb. Cypr. q. s. f. f. pil.* dosis una gr. iv. vel v. pendens. *D. Glisson* Cantabrigiensis medicinæ professor, gravi vertigine per tres septimanas conflictatus, irritis aliis remediis, vertici raso apposuit empl. ex *flor. sulph. & alb. ovorum*, a quo sanatus est, ut ipse retulit *D. Bate. Pyroticum* vel *setaceum* applicetur posteriori collo; *canterium* bregmati post omnia. *Electuarium epileptie. Batean. elect. Peruv. epileptic. Fulleri.*

Farrago sententiarum.

Monita *Art. 775.* Periculosior est vertigo idiopathica, quam sympathica, quæ ex aliqua *prædicta* terius corporis partis infra caput positæ læsione oritur.

Magna est hujus affectionis cum Epilepsia cognatio, facilisque in eam transitus; non obscure tamen ab ea differt cum materia, tum symptomatis; in hac vero convulsio est, in illa neutiquam.

Vomitoria in Vertigine sæpius prodesse constat; cumque Vertiginosi non raro sponte vomant, hinc opinio inolevit Morbi causam fere semper in ventriculo latere, quod secus est: Emetica autem juvant, quia maxima humorum a cerebro fit revulsio, & spiritus in eotumultuantes quamprimum coercentur.

In incremento mali membra hominis resolvuntur, isque humi reptat; nausea fit, & vomitus aut pituitæ, aut flavæ atræve bilis; Fla-

væ bili succedit *insania*; atræ Melancholia; pituitæ Epilepsia.

Art. 776. Vertigo non raro futuram Apople-^{Curatio-}xiam antevertit, quare nec negligenda est nec^{nis ratio} usus remedium, quæ tantum malum præcave-^{in Verti-}re possunt, posthabendus. *Vide quæ dicuntur in*^{gine.}
Titulo Apoplexiæ. Aliquando cum hypochondriacis conjungitur passionibus, quo casu ad congrua remedia confugiendum est. *Vide Tit. affect. Hypochond.*

Quodsi nulli harum causarum vertiginis origo tribui possit, inter Cephalica remedia, ea quærenda sunt, quæ eidem obistere valeant. Priusquam vero eis manus admoveatur quando Vertigo insignis est, & ægri habitus plethoricus prætereunda non est sectio venæ in brachio, & pede, vel etiam venæ jugularis, dein Emeticum præscribitur, & post aliquot dies purgans aliquod pharmacum, His præmissis ad tollendas obstructions sequentia usurpari possunt remedia.

℞. Calyb. limat. subtilis. pulv. omnique cupro Pulvis expertes unc. sem. Cass. lign. pulv. unc. j. & sem sacchar. fin. pulv. unc. iiij. misc. de quo ter in die assumantur gr. xxx. cum apto vehiculo, & per quinque vel sex hebdomadas in ejus usu continuetur.

Jejuno stomacho prima dosi mane arripitur, post quam jubetur incessus, vel ad consueta munera obeunda æger ablegatur, altera dosi tertia hora post prandium sumitur, ultima vero dosi trihorio postcœnam. Deinde curatio hoc altero remedio persolvitur.

℞. Anagallid. flor. rubr. Hyperic. ana man. j. Detorq. aq. comun. lib. ij. sem. ebul. per horæ quadrantem, & colatur. quotidie mane hauriatur per dies x. vel xij. Hoc vero remedium in Convulsionibus quoque præstat.

*Præser-
vativum
ad Apo-
plexiam.*

Art. 777. Si Vertigo Apoplexiam minatur D. Schmitz semina Carvi vino macerata deinde exiccata tamquam optimum præservativum plurimum commendat, cujus dimidium cochleare ægro cubitum ituro quotidie exhibetur, ut eadem semina aliquamdiu masticata deglutiat.

A P O P L E X I A.

*Defini-
tio.*

Art. 778. „ Apoplexiâ est repentina suspensio omnis sensationis, & privatio motus totius corporis, excepto cordis & pectoris, quæ frequentius motu solito fortiori ac viâ, lentiori aguntur. “

Cœlii Aureliani sententia.

*Apople-
xia signa
eam præ-
sagien-
tia.*

Art. 779. Apoplexia ita dicitur, quod tanquam ex lethali percussu repentinum faciat casum. Signa præsagientia aliquando nulla; interdum vero gravedo, vel dolor capitis, aut vertigo, aut aurium tinnitus, in solitos usus difficilis motus, vultus inæstitudo, saltus membrorum, præcipue labrorum, tremula locutio, oblivio mox dictorum, vultus plenitudo; sed hæc symptomata sunt etiam communia in *epilepsiam* vel *maniam* venturis. „ Torpores & fluxus pores (inquit *Hippocrates coac.*) præter consuetudinem advenientes, futuram *apoplexiam* vel *paralysem* denuntiant. „

*Paroxys-
mus.*

Art. 780. In paroxysmo ægri voce privantur, mente capti repente cadunt, immoti, respiratione & pulsu tantum superstitibus, color plumbeus, atque involuntaria illacrymatio; crescente morbo, vultus adductio, ita ut longior nota videatur imago, præcordiorum prominentia, & to-

& totius corporis frigidus torpor, pectoris fir-
dor, & superiorum partium sudores frigidi.

Boerhaavii Sententia.

Art. 781. Causæ Apoplexiæ frequentiores sunt, *Causæ frequen-*
1. Polyposæ sanguinis concretiones. 2. Spissi- *tiores.*
tudo inflammatoria cruoris. 3. Crassa, gluti-
nosa, pituitosa, iners totius sanguinis natura.
4. Simplex plethora vasorum a quacunque cau-
sa. 5. Tumores intra cranium nati (quibus
addi possunt sanguinis vel seri *extravasationes*
ex contusionibus vel concussionibus vi externa im-
pressis, & innumeræ aliæ *causæ latentes*.)

Art. 782. Divisio apoplexiæ in *sanguineam*, *Divisio*
& *pituitosam* est utilis, sed non perfecta divisio, *Apople-*
quum & *serosa*, & *atrabilaria*, & *polypsa* sit, *xia.*
& *alia*.

Art. 783. Lenis Apoplexia solvitur supervē- *Prognosis.*
niente sudore multo, calido, æquabili; urina
multa, crassa; hæmorrhoidum; mensium vel
alvi fluxu, vel febre magna. Paulo gravior so-
let mutari in *paralysin* alicujus partis musculo-
sæ; totius lateris unius; unde *hemiplegia*; vel
omnium partium infra caput; unde *paraplegia*,
quæ raro curatur, semperque memoriæ, judi-
cii, motuumque læsiones relinquit. Exquisita
apoplexia in mortem cito finitur, raro septi-
mum diem excurrens.

Art. 784. Curatio varianda est pro ratione *Curatio*
causarum; si a causâ frigida, pituitosa oriatur, *varia.*
conandum est statim, ut pressio lentoris gluti-
nosi a capite avertatur per derivationes in alia
& opposita loca, & per *evacuationes universales*;
in usum veniunt *vesicantia*, *caustica*, *frictio-*
nes, *ligaturæ*, *apophlegmatismi*, *sternutatoria*,
purgantia valida, *clysmata acrida*; ut sequens
M. Pul.

24. *Pal. colocynth.* ʒß. *fol. tabach.* ʒß. *coq. in aq. font. q. s. ad ʒx. admisce sal. gem. ʒij. f. enema.*
 In usu tamen horum omnium augetur sæpe malum, materie magis mota & impacta, viribus tamen mox projiciundis per evacuantia: hinc in concilianda dissolutione semper *evacuationi & avulsioni* studendum, quantum res pati queat; inde regula (*Hippocratis*). *Venesectio*, ni juvet, occidit (& *Celsus* occidit vel liberat.)
 Si vero a causa calida oritur, & morbus inflammatorius videtur, tum illico mittatur sanguis magna copia ex *venis jugularibus*, & repetatur pro re nata, unde, si morbus sit sanabilis, levamen accipiet; diarrhœa omni arte obtineatur; *diluentia, attenuantia, & diuretica* ingerantur; detineatur æger, quantum fieri potest, e lecto, saltem a decubitu declivi. De reliquis lector ipse consulat auctorem.

Ettmulleri sententia.

Hujus affectus prodromi. *Art. 785.* Signa Apoplexiæ aliquando probabiliter futuræ sunt: dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illacrymationes, scotomiæ, incubus, vocis tarditas & hæsitantia, oris distortionem, dentium stridores in somno, stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremarum partium.

Paroxysmus. *Art. 786.* In hoc affectu omnes functiones animales subito cessant, homo quasi fulmine percussus, & attonitus in terram jacet, sine motu, (hinc dicitur morbus *attonitus & sideratus*) respiratione ipsa plus minus imminuta, cum vel sine stertore, pulsu adhuc nonnihil vegeto, & perquam duro, nisi in casu admodum periculoso, ubi deficit; color faciei & oculorum ut pluri-

plurimum rubet, facies tumida; æger profunde dormit, & nequit suscitari; interdum resolvitur vesicæ, & ani sphincter: supervenit tandem spuma circa os.

Art. 787. Hemiplegia seu hemiplexia est quando solummodo dimidium capitis, & reliqui corporis afficitur (*more Apoplexia.*) Hemi-
plegia.

Art. 788. Apoplexiæ causæ proximæ sunt, vel impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum; venus nimia potissimum in senibus ad Apoplexiam multum disponit, ut & animi affectus graviores, ira, &c. Contusiones & concussionēs capitis, scabies retropulsa, vapores mercuriales, gas seu halitus carbonum. Apople-
xia cau-
sa.

Art. 789. Apoplexia est morbus admodum hæreditarius; omnes, qui Apoplexia moriuntur, suffocati intereunt, unde quo *liberior est respiratio*, eo major est spes salutis, & contra; spuma circa os est fere semper signum lethale. Est mor-
bus hæ-
redita-
rius.

Art. 790. *Barbette* in curanda Apoplexia *inunctionem mercurialem* commendat; metus est de vomitu excitando, ne suffocatio acceleretur, quod non paucos medicos deterret. In Apoplexia *sanguinea* venæsectio est necessaria; in *pituitosa* omittenda, quoniam nociva est, sed potius exhibendum est *vomitorium antimoniale*; æger non debet in lecto decumbere, sed erectus sedere; *enemata acriora* sunt injicienda parata ex *lavend.rut. majoran. nicotian. rad. pyreth. irid. nostr. vin. benedict. sal. gem. pulp. colocynth. in petia ligat.* &c. In ipso paroxysmo non neglectis universalibus conducunt *salia volatilia, sudorifera*, speciatim *aurum diaphoret. Poterii, cinnabarina, species diamb. confect. alherm. sudorifera ex lignis* declinante paroxysmo aliquandiu continuata sunt maxime proficua. Curatio.

Art.

Prophy-
laxis.

Art. 791. Pro præservatione, præmissis rite universalibus præ reliquis multum laudatur frequens *salvia* usus quocunque modo; in *cubebis*, *cardamomo*, *sem. senap.* & *crucæ* singulares latent vires, maxime pro senibus in forma pulv. vel aliter in vehiculo appropriato assumptis. „ Item „ *fonticuli interscapulares* hodierno usu comprobantur. “

Colez Sententia.

Causa
Apople-
xia sin-
gularis.

Art. 792. Auctor putat acerbum frigus, & gelu diutinum anno 1683. numerum *apoplecti-
corum* annis succedentibus adauxisse.

Art. 793. Potio infusionis *rorismarini*, *salvia*, *beton. lilior. convul.* &c. instar *theæ*, item *Coffee*, & fumisuctionis *nicotianæ* ad præcavendam Apoplexiam laudantur; *balsama odorifera*, *Apoplectica dicta*, & usus *ptarmicorum* inordinatus damnantur. Sanguinem detrahit manu maxime liberali ad unicas scilicet, 30. 40. 50. imo 60. hancque praxin non modo ex propria experientia stabilire fatagit, sed etiam auctoritate celeberrimi D. *Gibbons*, neque in junioribus tantum, verum etiam in ætate provectioribus injungit; & instantiam profert cujusdam annum 77^{um} agentis, a quo sanguinis inter 20. & 30. uncias detraxit, & tantundem alia vice intra ejusdem septimanæ spatium ob *vertiginem* aliqualem superstitem.

Catherwoodii Sententia.

Arterio-
tomia.

Art. 794. Auctor pro virili conatur, & nulum non movet lapidem *arteriotomiam* introducere tanquam *phlebotomia* longe præstantiorem in hoc morbo curando; locum designat in arteria

teria temporali, operationemque neque difficilem esse, neque periculosam asserit; accurate digitis detinenda est arteria, ne subvolutet, & vulnus infligendum est non punctura, sed per incisionem cum dextra mucronis lanceolæ elevatione; detracta sufficiente sanguinis quantitate, premendum est vulneris orificium in os temporale cum digito maximo, quo *thrombus*, si accadat, cito dissipabitur, & fere momento temporis fluxus sistetur.

Art. 795. „ Verum enimvero mihi videtur *Cui com-*
 „ author noster meras umbras consectari, ut *modo*
 „ *Hecrules* stramineus apparet, novam crepat me- *adhiben-*
 „ rhodum; sed quomodo stabilitur hæc praxis? *tur ista*
 „ Inter paucas, quas adducit hoc affectu labo- *praxis,*
 „ rantium, historias; unicam tantum per arte- *dubita-*
 „ *riotomyam* curati affert, sed de his non libet *tur.*
 „ morari. Utcumque vero res se habeat, mini-
 „ me futurum videtur (ut recte admonet D. Fre-
 „ *ind*) ut nostri unquam homines huic medi-
 „ cinæ generi assuescant. “

Farrago sententiarum.

Inter legendum & ex observatione.

Art. 796. In paroxismo Apoplectico intume- *Varie-*
 scunt venæ jugulares, necnon pulmonum, quæ *mortis*
 non raro rumpuntur in Apoplexia demortuis. *causas*
 In defunctorum cadaveribus sæpissime repertum *detexit*
 est *serum viscidum* in cerebri ventriculis, ali- *Anato-*
 quando *sanguinis* ingens copia in sinibus, ali- *mia de-*
 quando *tumores* ad pugni magnitudinem juxta *functo-*
 conarium inter cerebrum, & cerebellum; talis *rum.*
 (observante *Drelincurtio*) semestri spatio primo
cæcitatem, dein *surditatem*, subinde sensuum
omnium abolitionem, & postremo *necem* intulit.

lit. In cerebro Apoplexia mortui (*inquit Cheselden*) observavi universa vasa sanguifera plurimum distenta, ventriculos ipsamque cerebri substantiam lymphâ supra modum abundantes, & duram meningem magnopere incrassatam, &c. *Vomitoria* (*inquit Dolans*) experientia teste, quicquid reclamet *Sylvius*, divinam afferunt opem. „ Nullum est potentius remedium „ *vino emetico* in omni soporoso affectu, dos. „ $\mathfrak{z}\text{ss}$. vel $\mathfrak{z}\text{ij}$. per os, $\mathfrak{z}\text{ijj}$. vel iv . in enemate. „ Si injecta enemata præter rationem moram „ faciunt, sollicitanda est dejectio acribus suppositoriis, speciatim incidatur frustulum *fa-* „ *ponis Venet.* in formam Glandis. “ *Venesectio-* *nem* in omni Apoplexia, & in omni ætate, & in summa quidem senectute admittimus; timidis, loco hujus, *hirudines* vel *cucurbitulas* concedimus.

Pulsus fortis sæpe decipit in expertes.

Art. 797. *Rhodius* observavit, quod in omnibus affectibus *comatosis*, præcipue *lethargo*, & Apoplexia, pulsus dum ex parvo fiebat magnus, & sensim in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur; pulsus etenim in hoc affectu est ut plurimum fortis & plenus, quod multos decipit.

Nota bene.

Art. 798. Apoplexia demortui ante triduum non sunt sepeliendi, quia omnes humores intra illud spatium moventur, & nonnulli ante illud tempus revixisse observati sunt. *Barbette*. Linimentum sequens ut specificum in *lethargo* & Apoplexia habetur; \mathfrak{v} . ol. *succin. spic. castor. ana* $\mathfrak{d}\text{ij}$. *flor. hiperic. succ. rut. express. ana* $\mathfrak{z}\text{ijj}$. *m.* illinatur cervix, &c. Item summum & fere unicum remedium in Apoplexia sunt *cucurbitæ* capiti impositæ. *Riverius*, *Zacutus Lusitanus*, &c. Cum morbi vis maxima est, admoveatur *cauterium actuale* inter primam, & secundam nuchæ vertebra.

Art.

Art. 799. Remedia sequentia interdum pro Remedia
 re nata in usum adduci possunt; *antimonium* ^{varia.}
diaphor. antihæcticum Poterii, aurum fulminans,
aurum Mosaicum, cataplasma suppedale, cata-
plasma de hælecibus, elaterium, elect. antiapople-
cticum, emplastr. cephalicum, elixir. peon. Myn-
sicht. enema acre, enema apoplecticum, ens vene-
ris, flores salis armoniac. martiati, gargarisma
ad pituitam, infusum cephalicum, pil. volat. ster-
nutatoria omnia (flores Bezoin. aliis ptarmicis
adjecti illa multo efficaciora reddunt) pulv. ad
gutturam, tinctura epileptica, vinum benedi-
ctum, &c.

Art. 800. Genericæ Apoplexiæ causæ sunt: *Apople-*
 1^o. Plethora, seu nimia sanguinis copia; 2^o. *xia caus-*
 Ejusdem sanguinis, & lymphæ seu serositatis *sa.*
 rarefactio: 3. Hujusmodi liquorum visciditas
 ac densitas. 4^o. Spirituum animalium progres-
 sio interrupta. Alias itidem peculiæres hic mor-
 bus causas recipere potest: ut capitis ictus vel
 contusiones a casu, unde sanguis ruptis in ce-
 rebro vasis per cranii cavitatem extravasatur;
 cerebri ipsius morboſi tumores, polyposæ con-
 cretiones in ipso cerebro genitæ &c.

Art. 801. Ex hisce causis ea hujus morbi di- *Commu-*
 visio oritur, propter quam plurimæ Apoplexiæ *nis hu-*
 species a quibusdam numerantur; sed commu- *jus mor-*
 nior divisio atque simplicior, duas tantum A- *bi divi-*
 poplexias ponit, *Sanguineam* videlicet, & *lym-* *sio.*
phaticam, quæ etiam *Pituitosa* vocatur.

Art. 802. Peculiaris sanguineæ Apoplexiæ si- *Signa*
 gna, quibus a Pituitosa distinguitur, sunt: vultus *Apople-*
 color rubentior, & quasi inflammatus, vasa *xia san-*
 magis solito plena ac tensa, atque hinc pulsus *guinea.*
 durior, & fortior.

Art. 803. Apoplexia vero lymphatica sensus *Signa*
 quidem, & vocem ut sanguinea adimit; sed in *Lympha-*
 hac *rica.*

hac, nec rubor ille cernitur, nec vasa adeo inflata reperiuntur, unde pulsus æque ac respiratio, tametsi debiliores, in statu naturali ferme persistunt.

*Curatio
Sanguinea.*

Art. 804. Si vasa cerebri turgescencia non dehiscunt, nec contentum humorem effundunt, sperandum est, ut citis largisque phlebotomiis vel in brachio vel in pede vel in jugulo institutis circulatio in pristinum libere restituitur; quodsi ex nimia distensione rumpantur, tunc nullus sanationis locus remanet, nisi forte humorum extravasatio a quadam externa causa producta fuerit; quo casu mediante Terebellæ operatione: ut in fracturis Cranii usuvenit, exitus humori perforatione ejusdem Cranii conceditur.

Phlebotomia.

Art. 805. In Sanguinea Apoplexia nonnulli ex recentioribus Medicis phlebotomiam in pede institutam ceteris omnibus potiore habent, quia validiorem revulsionem præstat; sed oculatissimi Practici jugularium sectionem quoque commendant. Utilissimum credimus, quod ab initio usque, tempore quinque vel sex horarum, ad tres vices usque vena brachii tundatur, atque inde sanguinis emissiones vel a pede vel a jugulo juxta magnitudinem morbi pluries etiam reiterentur.

*Curatio
Lymphatica.*

Art. 806. In Lymphatica Apoplexia conservandæ sunt ægro vires ut morbi vehementiæ resistere possit, quare necessaria non videtur phlebotomia, quæ nisi caute admodum ac prudenter juberi debet. Præcipua autem indicatio est, quod æger motus suos temperet, idcirco spirituosæ, & irritantiæ, quæ ejus sanguinem excitare valent, nisi proficiuæ, & utilia valde reputanda sunt. Methodus in hoc casu, quam plurimi commendant, hujusmodi est.

Art.

Art. 708. Frictiones oportet ad caput, ad *Frictio-*
dorsi spinam, & ad collum cum calidis siccis- *nes.*
que lineis in appis instituantur, atque etiam ad-
hibitis liquoribus spirituosius acribusque: ut Aq.
meliss., spir. lavend., spir. vin. &c. Convenit
etiam Tempora atque nares confricare sequenti
Balsamo Apoplectico.

℞. Mosch. ℥j. ambr. gris. ℥ij. sem. sacchar. cand. *Balsa-*
parum. misc. super porphyrit. dein add. ol. nuc. mo- *mum A-*
scat. per express. extract. unc. j. & sem., tum add. *poplecti-*
ol. destill. majoran. flor. Aurant. ana ℥ij. ol. succin *cum.*
rectif. ℥. sem. ol. destill. basilicon. lign. rhod. ana
℥j. sem. ol. cinamom. ℥j. atque demum add. bal-
sam. peruvian. nigr. unc. j. flor. benzoes ℥ij. Zibeth.
gr. viij. f. balsam. s. a.

Servandum est hoc Balsamum in vase vitrea-
to, & probe clauso, ejusque quantitas si mi-
nor desideretur, eadem proportionem singula
ejus ingredientia imminui debent, quemadmo-
dum præscripta formula sistit. Aliud quoque
Balsamum ex *Pharmacopea Bateana* habetur,
quod vices præcedentis exerere potest, & hu-
jusmodi est.

℞. Ol. destill. cinamom., caryophyll. lavendul. *Aliud*
citr. majoran. menth. rut. rorismar. salv. absynth. *Balsa-*
lign. Rhod. ana gutt. xij. ol. rectif. succin gutt. vj. *mum.*
bitumin. judaic. pulv. ℥ij. ol. nuc. mosc. expr. unc. j.
balsam. peruvian. q. s. m. & f. balsam. s. a.

Si de hoc aliquid per nares immittitur vel alio
quovis modo externe applicatur, caput inde
roboratur, frigidi humores excutiuntur, spiri-
tusque animales revivescunt; quod in Apople-
xia, in Syncope, & in Paralyfæque convenit.
Interne etiam usurpari potest a gr. iv. usque ad
gr. x. una cum Electuario quovis Cephalico.
Sternutatoria quoque plurimum auxiliantur, ubi
de lymphatica Apoplexia agitur; Summatim igitur

tur, ut paucis dicam, omnia ea hoc in casu juberi possunt, quæ nervosum sistema excitare, movere, ac irritare valent.

Vomitoria.

Art. 808. Eodem tempore Emeticum porrigendum est ægro, quare Vinum Emeticum hoc in casu ceteris antecellit, cujus unc. ij. propinantur, & si intra duarum horarum spatium nullum effectum edit dosis reiteratur, quæ si iterum nihil præstat, conclamatum est. Loco hujus vini Tartarus Emeticus cum aliquo liquore exhiberi potest, cujus dosis ad normam temperamenti ægri, ex Medici prudentia concinnanda est, necesse est autem ut dupla saltem ea, quæ ut plurimum adhiberi solet, porrigatur, quare a gr. viij. usque ad gr. xij. jubendus, secus vel nullum, vel levem quidem effectum ederet. Alterum quod laudatur Emeticum est.

℞. Rad. Asari pulv. ʒj. Piper. pug. j. detur in Vini calidi cyatho ad vomendum.

Nota bene.

Art. 809. Ceterum notandum est quod si Apoplexia a stomachi repletionem, & a crapula veniat, vomitoria tunc specificam virtutem obtinent nulli secundam. Ast in sanguineæ Apoplexiæ principio numquam danda, secus inflata vasa, & turgentia rampendo noxia plurimum confectaria afferrent. Caute igitur, & prudenter jubebuntur, atque tunc maxime tutus eorum usus erit, quando jam alvus ob Ptisanam laxativam ingestam copiose deponere incœperit.

Cordialia.

Art. 810. Statim post sumptum vomitorium, cordiale aliquod spirituosum ingerendum, cum apto quovis vehiculo dabitur ægro, præ ceteris *Lilium Paracelsi* laudibus celebratur amplissimis, cujus dosis tunc ad L. vel LX. gutt. usque augebitur, cum liquore aliquo pingui propinabitur, & maxime cum jure carniū; alias œsophagum stomachumque accenderet, & excoriaret.

ret. Hac adhibita cautione ad centum guttas usque porrigi potest, dilatum nempe in jure carniū, & cochleatim ingestum.

Art. 811. In apoplexia vero sanguinea omni- Nota bene.
gena etiam cordialia adhibere, neutiquam licet, sed mitiora tantum, & temperatiora, ut confect. hyacint. aquæ cordiales simplices, meliss. scorzon. &c. & ubi cordialia valentiora usurpentur, utaq. magiss. meliss. Reg. Hung. Imperial. &c. necesse erit easdem aqua communi temperare; siquidem cordialia nimium spirituosā nullo modo conveniunt, utpote quæ motum sanguinis concitant, vasa turgescētia rupturæ proxima disrumperent.

Art. 812. In apoplexia lymphatica curandum est, ut æger agitetur, & motum edeat, incessumque experiatur, quamobrem famulorum opera sustentus pedibus progredi adigetur, ejusque manus identidem percutientur, aliisque modis vexabitur, & discrutietur, ne obdormiat.

Eidem quoque acres clysteres injicientur ex. Clysteres.
gr. juxta formulam seq.

℞. Rad. cyclamin. man. j. salv. origan. centaur. min. rad. pyrrhetr. ana man. sem. pulp. colocintid. num. j. coq. per horæ quadrant. in f. aq. quant. colat. add. sal. commun. ℥ij. aceti par. f. clyst.

Si hujusmodi enema aut aliud simile, nihil præstet ad Nicotianam confugiendum erit, cujus clyisma efficacissimum quidem est, quodque sic componitur.

℞. Funis nicot. unc. j. vel pro debilioribus unc. sem. quo frustulatim resecto coq. cum aq. commun. lib. j. sem. usque ad tertium. Filtrato liquori adde hiera picra unc. j. f. Clyster.

Art. 813. Scapulis cucurbitulæ scarificatæ applicentur, ubi etiam emplastrum vescicatorium Cucurbitula scarificata.
extendetur, quod retro aures itidem admoveri

poterit ; vel etiam spiritu vitrioli hoc emplastrum , ut magis irriter , inspergetur .

Herrina. Art. 814. Si horum auxiliorum ope æger nondum expergiscatur , sternutatorii pulveres mediante fistula in ejus nares perflabuntur , qui rad. pyrrhetr. helleb. alb. irid. florent. fol. betonic. & flor. lil. convall. componi poterunt ; vel aq. magist. melliss. aut Reg. Hung. &c. per nares subinde injicietur .

Clyster præservativus. Art. 815. Cæterum cavendum ne multitudine remediorum æger obruatur , & ubi expergescit , ac mentem recuperaverit , quotidie injicietur ei per tres successivos dies sequens enema .

℞. Senn. unc. j. aq. commun. lib. j. sem. coq. ad consumpt. tertiæ partis, & colat. add. hier. picr. unc. j. fiat enema .

Hujus ope non solum ægri intestina evacuantur , sed is quoque paralyti facile apoplexiam sequente præservabitur .

Circa emeticum notandū. Art. 816. Si vero commoditas nulla adfit , emeticum apoplectico propinandi , licebit saltem pugillum salis in ejus os immittere , posteaque cyathum urinæ hauriendum porrigere , cujus ope facile ad vomitum incitabitur .

Specificum apoplecticum. Art. 817. Laudabile item est , secum habere sequens remedium , quod per se lymphaticam apoplexiam sæpissime sanat , vel a quo saltem tempus comparatur , ut alia fortiora remedia celebrentur , medicique auxilium obtineatur .

℞. Sp. vin. sulphur. sal. commun. ana ℥j. misc. & in vase vitreo probe clauso hac mixtura agitetur ,

Mixtura. De qua mox gutt. viij. cum vini albi cyatho apoplectico exhibebuntur , cui itidem imperabitur , ut se se moveat , & incessum experiatur , vel saltem absque violentia , eundem concutiemus .

Præservativus. Art. 818. Ut lymphatica apoplexia avertatur fumus

sumus nicotianæ per fistulam mane, & sero usurpare juvat; expedit etiam, ut semel in mense alvus hyeme solvatur, & æstate binæ emetica adhibeantur.

Si sanguinea ingruit apoplexia, vel quempiam eadem minatur, quater in anno instituenda phlebotomia est, & singula vice die sequenti opus est alvum laxare, ut inde causa effervescentiam sanguinis producendi apta, atque adeo vasis turgentis eorum dehiscenciam, & liquidi contenti effusionem in cerebro efformandi, evacuetur.

Art. 819. Si demum quis se se stupidus, gravis, & in somnum immodice proclivis nanciscatur, quæ indicia pituitosam apoplexiam minantur danda opera erit, ut excitato vomitu, vel ingesto purgante corpus evacuetur, deinde sequenti spiritu internæ vires erigentur, qui non solum utiliter in hujusmodi apoplexia adhibetur; verum etiam in lethargo in catarrhis suffocativis &c.

℞. Castor. cinamom. succin. ana ℥j. sal. volat. vi- per. 3. sem. aq. theriacal. meliss. spirituos. sp. vin. ana unc. j. diger. super ciner. calid. in vase probe clauso per horas xij. deinde destill. per alembic.

*Spiritus
compositus.*

Hujus dosis est cochlearis dimidii ter in die pro iis, qui ab apoplexia tenentur, & singulo bi-duo semel, pro iis, quos idem morbus minatur.

Art. 820. Observandum est, quod finitis omnibus lymphaticæ Apoplexiæ symptomatibus concedendus est, somnus ægro in trihorium usque protractus, & identidem expergefactus finitur, ut eundem iterum capiat, etenim operæ pretium est, vires labefactatas, & a morbo non minus, ac a remediis imminutas tali pacto confirmare ac restituere. Diligenter tamen invigilabitur attendendo: an ejus somnus naturalis est, atque mitis: an contra durus, & opprimens, quo casu mox expergefactus agitabi-

*Observanda
circa somnum.*

tur diu, atque ad incessum ineundum adigeretur.

*Quoad
recidi-
vam.*

Art. 821. In eadem serosa apoplexia morbi recrudescentiæ spatio 24. horarum sæpe redire solent, atque per priorem hebdomadam sunt timentæ, siquidem ut plurimum funestæ. Quare ut eadem avertantur, exactum valde regimen ægro præscribetur, atque eidem dabuntur subinde purgantia, atque demum aptiori anni tempore adventante ad thermas ablegabitur, ut ad *Borbonianas*, ad eas *Aqua sextia*, & *Vichy* &c.

*Notus
ordina-
rius.*

Art. 822. Quousque morbus persistit, adhibeat æger pro potu communi ptisanam ex rad. scorzon. glycyrrh. fol. betonic. meliss. vel similia.

*Prægn-
ans.*

Art. 823. Quando omnia quæ pro apoplectico erigendo usurpantur, nullam evacuationem præstant, sed stertor accedit, & viget, tunc pronuntiabis jam rem habendam in desperato.

L E T H A R G U S.

Inter legendum & observandum.

*Defini-
tio & si-
gna le-
thargi.*

Art. 824. De lethargo alibi meminimus h. e. num. 761. sed ibi eundem tanquam symptoma ceteris morbis accedens, & sudorem inducens consideravimus, nunc vero eundem, ut morbum per se & idiopaticum, habemus.

Art. 825. Lethargus igitur somnus est, profundus cum febre lenta, in quo, si ægri excitantur, mox in eundem somnum relabuntur. Qui hoc tenentur stupidi sunt, & obliviosi, vix mente valent, atque omnium actionum sunt incapaces. Hinc verissimillimum est, hunc nisi minorem Apoplexiæ gradum fore.

Curatio. *Art. 826.* Ejus curatio eadem omnino ratione perficitur, ut in apoplexia, sectis videlicet brachii, & pedis, nec non jugularibus venis, si indicia adsint a sanguinis copia produci; quod si

a pi-

a pituita veniat, purgantia adhibenda sunt, vomitoria, sudorifera, sternutamenta &c. Ut verbo dicam, torpentes spiritus excitari debent remediis acidis, volatilibus, acribusque, somnum interrumpentibus, inducentibusque vigiliam. Neque diu hærendum, quin fortioribus purgativis ægri alvus cito laxetur, quæ si per os ingeri, nequeunt, clysterum ope saltem immitti poterunt.

Existimarunt nonnulli sanguinis emissionem a jugulari proficua futuram, etiam quando morbus a fero cerebrum inundante proficiscitur.

Ad excitandos spiritus commendant, ut subinde aliquæ aceti guttulæ in ægri os instillentur, vel ejus naribus, vel sp. sal. ammoniaci, vel bals. apoplect. subjiciatur &c.

Veluti specificum ad lethargicos excitandos celebratur succus foeniculi, vel rutæ cum aceto temporibus naribusque admotus.

Art. 827. Observavit *Rhodius*: quod in omnibus affectionibus comatosi, præcipue lethargo, & apoplexia, pulsus, dum ex parvo fiebat magnus, & sensim in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur.

Prognosis.

HEMIPLEGIA, PARAPLEGIA, seu Paraplexia.

Aretæi sententia.

Art. 828. Apoplexia, paraplegia, paresis, paraly-
 ralyfis omnia genere eadem sunt: aut enim mo-
 tionis, aut tactus, aut utriusque defectus est:

*Paraly-
 sis spe-
 cies seu
 denomi-
 nationes
 varia.*

interdum & mentis, interdum & reliquorum sensuum. Apoplexia enim totius quidem corporis, & sensus, & motus, & mentis resolutio est. Paraplegia est tactus motusque remissio; sed in membro uno, puta manu crureve. Paralysis autem motus tantum fere est, actionisque defectio. Quod si nonnunquam solus tactus deficiat (raro enim id evenit) potius anæsthesia, idest, sensus abolitio, quam paresis, idest defectio, nominatur. At si Hippocratis apoplecton, idest, attonitum cruris secundum rectum, dicat illud tanquam mortuo simile, inutile, & insanabile vult significare. Quod enim in toto corpore est vehemens apoplexia, illud in crure paraplegiam vocat; patet ergo, ait Cl. Van Schv., vietten, quod antiqui vocaverint paraplegiam, idem illud, quod hodie dicitur paralyfin; nam & in illa quandoque una cum motu sensus integre perit, ut & postea dicitur, & par-tis singularis, non vero totius corporis vitium est. Id ipsum innotescit etiam a descriptione quam *Trallianus* dat de vitio resolutionis, quod Græci paresin, & paralyfin nominare consueverunt; nam subjungit differt ab apoplexia, quod ipsa quidem totius corporis sensus, & motus abolitio est; resolutio autem, quod dimidia pars corporis, vel una tantum emoritur.

Paraplegia ab apoplexia diff-ferentia. *Art. 829.* Ex istis ergo intelligimus Paresin, & Paralyfin unius ejusdemque morbi sinonima esse, paralyfin, & paraplegiam pro uno eademque morbo veteres habuisse ab apoplexia levitate tantum diverso, quin imo comperimus Galenum paraplegiam non solum, sed etiam hemiplegiam generali paralysis nomine comprehendisse.

Art. 830. Hujusmodi vero græcarum vocum signi-

significatio juxta neotericos ita se habet. Quando omnes universi corporis partes afficiuntur, ita ut sensum, & motum amittant, morbus est *apoplexia*, quando omnes sub capite, ita afficiuntur, dicitur *paraplegia*, quando omnes in alterutro tantum latere *Hemiplegia*, quando partes quædam ubicumque corporis *Paralyfis* nuncupatur. Distinctionem ergo, quam habet *Etmullerus* de hemiplegia, & paraplegia a paralyfi, quamque Auctor noster prosequutus est, nos cum Boerhaavio ejusque Commentatore eximio D. Van Schvvietten irritam reputamus. Nam una eademque paralyfis, si totum unum latus occupet *hemiplegia* est, si omnes cervici suppositas partes *paraplegia*. Vide Boerhaav. aph. 1018. eadem enim ubique affectio est, pro numero partium corporis, quas detinet, tantum versa.

Art. 831. Observat itidem Aretæus, quod si caput primo in dextra parte patiat, sinistra vultus, & trunci corporis resolvitur, si autem læva, dextra nervorum laborat. Hoc ideo evenit, quod nervorum initia permutata sunt. Neque enim, inquit, dextri nervi in dextras partes secundum rectum usque ad extremum progrediuntur: sed ab initio enati protinus ad oppositos transeunt, se invicem in figuram hujus litteræ X. quam græci chiasrum vocant, permutantes. Utque semel dicam, sive omne simul corpus resolutionem nervorum patiat, sive aliqua membra, sive ab alterutra, sive ab utraque parte, nervi de capite fluentes alia ratione patiuntur.

Paraplegia hemiplegia & Paralyfis eadem sunt.

Permutata nervorum a capite resolutio.

Ettmulleri sententia.

Ratio no. *Art. 832.* Paraplegia seu paraplexia, & apoplexiam. *minum.* plexia particularis, in altero tantum latere hemiplegia nominantur. Interdum afficitur totum corpus, excepto capite, ex obstructione spinalis medullæ; frequentius est morbus *secundarius*, interdum vero *primarius*: sensus, vel motus, vel alteruterque totaliter abolentur, vel multum imminuuntur.

Paraplegia ab apoplexia differt. *Art. 833.* Paraplegiæ, quæ apoplexiam, epilepsiam, aliosque morbos immediate sequuntur, vulgo *paralyses* vocantur, sed *paralysis* est longe alius affectus, ut infra manifestum erit.

Curatio. *Art. 834.* Vomitus in omni paraplexia convenit, & purgatio ad primarum viarum emundationem, venesectio convenit in plethoricis; proximo loco sudorifera valde conducunt, cum specificis interspersis, decoctum *sassafr.* cum *roremarino* & *bacc. juniperi*; aliquando datur *aurum fulminans* ad gr. iij. vel iv. de reliquis internis medicamentis vide *apoplexiam* & *paralysin*; balnea ex *formicis* revera singulare quid obtinent in *paraplegiis* curandis.

PARALYSIS, & PARESIS.

Ettmulleri sententia.

Paralysis *Art. 835.* Paralysis est gravior, & paresis *levis* & *gravior* affectus; paralysis proprie est resolutio, & *Paresis.* relaxatio. ligamentorum & membranarum motui inservientium, non ab obstructis nervis proveniens,

niens, sed a mera membranacearum & nervearum partium resolutione, & sic a *paraplegia* distinguitur, quæ ab obstructione nervorum exoritur; hæc sequitur *apoplexiam*, *epilepsiam*, *convulsiones*, *vertigines*, &c. qui affectus in se mutuo sunt permutabiles, & plerumque desinunt in *paraplegiam*; Illa vero sequitur alios morbos longe diversos; viz. *scorbutum*, *malum hypochondriacum*, *colicam*, & frequentior est in regionibus, ubi vino & spiritibus indulgent; aut oritur etiam subinde a causis externis, ex fumis metallicis, &c.

Art. 836. Paralyfis cæteris paribus facilius curatur quam *paraplegia*, quæ plerumque omnem *Curatio difficilis*, medici operam eludit; motus saltem amissus, superstitute sensu restituitur; *tremor* superveniens est bonum signum recuperandi motum. „ Atrophia vero aut frigiditas pessime ominatur. „

Art. 837. *Purgatio* lenis tantum insitui debet *Curatio*. cum *mercurio dulci* & *extracto hellebori*, *specie diaturb. cum rhabarbaro*, *pil. fœtid.* &c. & postea *sudorifera*, remedia *apoplectica*, & *epileptica*, *viparina*, *succinata*, *lumbricalia*, ex *milleped.* & *formicis* parata, *antimonialia*, *martialia*, *bezardica*, *aurum diaphoreticum*, *antiscorbutica*, & *specificæ* in sero lactis cocta, quando a dolore *colico* ortum ducit; & externe pro abdomine illinendo *galbanetum Paracelsi*. Galbanetum Sennerii est præstantius medicamentum. Vid. *Pharm. Batean.* In genere *urticatio* morbi resoluti est maximi usus, expertus loquor. *Thermæ naturales*, balnea ex *formicis* parata, *unguentum martiatum*, *nervinum*, *paralyticum*, &c.

Villisi sententia.

*Defini-
tio para-
lyseos.*

Art. 838. Paralysis est partium nervosarum a debita dissonantia resolutio; sive relaxatio; cuius ratione motus & sensus, nempe: aut alter tantum, aut simul uterque in toto corpore, vel in quibusdam partibus, debito more exerceri nequit.

*Unde
provenit.*

Art. 839. Mentis hebetudo, oblivio, & stupiditas, frequenter in paralyfin mutantur. Paralysis aliis affectibus frequentius supervenit, quales præcipui sunt *carus*, *apoplexia*, *scorbutus*, *convulsio*, *colica*, *arthritis*, &c.

*Difficile
curatur.*

Art. 840. Paralysis ab apoplexia, carō, convulsione, colica, aliisque cerebri, aut systematis nervosi affectibus superveniens, si non brevi tempore in melius alteretur, aut medicamentis cedat, plerumque insanabilis perstat; hominibus propectæ ætatis, cacochymicis, valde scorbuticis, aut intemperatis accidens, etsi affectus haud immanis fuerit, difficile tamen curatur.

Curatio.

Art. 841. *Phlebotomia* passim non omnibus convenit; & si hanc vetamus, non tamen ob eandem cum veteribus rationem, supponendo paralyfin esse morbum frigidum; præmissis universalibus, viz. *vomitorio* & *catharsi*, cerevisia medicata parari potest ex *salvia baton*, *stachad. lign.*, *sassafr. cortic.*, *Vvinter*, &c. Quidam paralytici sunt frigidi, alii calidiores ex constitutione, ideoque remedia debent esse diversi generis, ut in ipso *scorbuto* evenire solet. Remedia in hoc affectu insigniora sunt *viperina*, *pulv. rad. serpent. virgin.*, *gum. guaiac. tinct.*, *succin. sp. C. C. succinat. pulv. arz. comp. chalybeata*, *antiscorbutica* omnia, præcipue *succi antiscorbutici cum aqua raphan. aurantii*, &c. Externe *fotus*, *linimenta*, *cucurbitule*, *vesicatoria*,

*ria, urticationes, item immiſſio membri reſol-
ti in grana hordei poſt cereviſiam ſubductam,
vel intra ventrem vel thoracem beſtiæ recens ma-
ctatæ, aut denique balneum artificiale vel natu-
rale. His non ſuccurrentibus proveniendum erit
ad remedia magna, viz. diaphoretica, ſalivantia,
vomitoria fortiora, &c. ſudorifica uſitatoria ſunt:
decoctum guaiac. ſpiritus & oleum ejusdem, miſtu-
ra ſimplex, flores & ſpiritus ſalis armoniac. au-
rum diaphoreticum, ſal. viper. bezoar. min. tinct.
antimon. &c. Nullum datur præſtantius remedium
quam therma noſtræ Bathonienses; quosdam ta-
men deterius reddunt. „ Pro pauperibus & ni-
„ mis procul a Bathonia degentibus Therma ar-
„ tiſciales ad imitationem naturalium ad hunc
„ modum fieri poſſunt: ℞. calc. viv. lbiv. coq.
„ pauliſſer. in aq. commun. cong. xx. vel xxx. pro
„ ſemicupio.*

Inter legendum & ex obſervatione.

Art. 842. A ſpirituum inopia fit paralyſis, ut *Cauſa*
in ſenectute valetudinaria, poſt immodica ſan- *paraly-*
guinis, liquoris genitalis, &c. diſpendia, e ſan- *ſeos.*
guine enim effoeto pauci ſpiritus in cerebro pro-
creantur.

Art. 843. Credibile eſt papillas cutaneas eſſe *Papillæ*
tactus organum, ideoque hic ratio reddi poteſt, *cutaneæ*
cur ſuperſtite motu ſenſus poſſit aboleri, viz. *tactus*
quia motus per nervos fit, ſenſus per papillas *organum.*
haſce.

Art. 844. Ad membra paralytica plurimum *Remed-*
valent fomentationes quotidianæ ex formicis & *dium ex*
earum cubilibus in aq. font. coct. interdum præſen- *formicis*
taneam opem & firmum conſtanſque robur par- *& ex*
tibus affectis afferunt; eodem tempore uſurpetur *ſem. ſi-*
oleum ſequens, ℞. ſem. ſinap. parum contuſ. q. v. *nap.*

ſp. la-

Sp. lavend. q. s. ut madescat; infunde frigide per horas 24. deinde oleum prælo exprimatur; cum quo inunge cervicis vertebrae, & spinam dorsi, & etiam partes affectas. Nihil potentius est in affectibus paralyticis (inquit *Chesneau* experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebrae lumborum, vel in musculis concretum, quam *oleum philosophorum*, & *oleum terebinthinae*, quod secundo exit post spiritum, aureique est coloris. Si membrum paralyticum extenuetur, vix aut ne vix quidem restituitur.

Vires terebinthinae & Chio. Art. 845. D. *Harris* in observationibus de morbis gravioribus asserit *therebinthinam e Chio* in hoc affectu vires plane admirandas obtinere; atque hunc in modum præscribit. *℞. tereb. e Chio ℥iij. solve in vitel. ov. immiscendo syr. de stachad. ℥j. aq. lact. alex. ℥iv. m. f. haust. singulis auroris capiend. ad quartam vicem.* Addit præterea se dedisse *tereb. venet. ℥vj. vel ℥j. in haust. similiter dissolut. non modo in paralysis, verum & in arthritis, & in rheumatism. cum optimo successu.*

Paralysis Laryngis & Pharyngis & gula. Art. 846. Larynx, pharynx, & gula quandoque Paralyfin patiuntur. Paralysis *laryngis* prohibet deglutitionem liquidorum, non vero solidorum; quoniam epiglottis non perfecte claudit rimulam laryngis. Paralysis *pharyngis* prohibet deglutitionem solidorum, non vero liquidorum. Paralysis *gulae* omnimodam deglutitionem tollit. Interdum deglutitio læditur ex contractura spasmodica gulæ, quod hypochondriacis, & scorbuticis est familiare.

Curatio. Art. 847. Epispastica sunt applicanda; antispasmodica & antiparalytica externe & interne usurpanda sunt, gargarismata & linctus in loquela amissa convenientia hic locum habent; speciatim *succus salviæ cum nuc. moscat. castoreo* frequenter & diu in ore detentus. „ Cataplasmate sequent.

„ sequent. in praxi nostra quandoque usus sum ;
 „ 2℥. pulp. raparum coct. ℥iv. herb. rut. contus. m. ij.
 „ sem. sinap. ℥j. pulp. alb. græc. euphorb. an. ℥ij. sulph.
 „ viv. ℥iij. ol. succin. gr. 100. ung. nervin. q. s. m. f.
 „ cataplasma gulæ applicandum.

Art. 848. In paralyfi linguæ solus succus *sal-* *Paraly-*
via obmutescentiam solvit; sequente gargarisma- *sis lin-*
 te foelici cum successu in praxi aliquando usus *gua.*
 sum;

2℥. Fol. *salviæ rorismarin. ana m. j. hyssop.*
puleg. ana m. s. sem. staphid. agr. sinap. ana ℥ss. coq.
 in q. s. aq. font. ab ℥vj. Colaturæ add. *succ. salvia*
depurat. ℥ij. oxymel. scillit. aq. regin. Hungar. ana
℥j. syr. stæchad. ℥iij. m. teneat coch. ij. in ore ali-
 quandiu & deinde expuat, idque fiat frequen-
 ter in die.

Art. 849. Arbitramur (ait *Lancisius*) potissi- *Cur que-*
 mam causam facilioris solutionis Paralysis in *dampar-*
 cruribus esse directionem vasorum, tum san- *tes egrius*
 guinis, tum spiritus animalis, proxime ad per- *quadam*
 pendiculum positorum; contra vero causam cu- *facilius*
 rationis difficilioris in brachiis esse positionem *recupe-*
 vasorum transversalem, per quam eadem con- *rentur.*
 situuntur ad rectos vel rectis proximos angulos
 cum arteria magna, vena Cava, & spinali Me-
 dulla. Liquida enim, quæ per directionem, per-
 pendiculari proximam fluunt, expeditius mo-
 ventur, & impedimenta quæ ipsis obijciuntur,
 promptius amonent, quam eadem liquida si fle-
 xuoso, aut angulari itinere devolvantur. Com-
 pertum est venæ sectionem sæpius repetitam ma-
 lum plerumque exacerbare, illiusque frequen-
 tioribus accessionibus viam sternere: in ejus ve-
 ro locum scarificationes sex vel octo cucurbitu-
 lis administrandas commendamus.

Art.

*Celsi ob-
servatio.*

Art. 850. Solent, qui per omnia membra resoluti sunt, celeriter rapi; at si correpti non sunt, diutius quidem vivunt, sed raro tamen ad sanitatem perveniunt, & plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa.
Celsus.

*Curan-
da est ut
lues ve-
nerea.*

Art. 851. Cura hujus mali a curatione *luis venereæ* non abludivit multum, adeoque *mercurialia, sudorifera, decoct. e lign. &c.* profunt. Externe *inunctiones, spirituosæ & penetrantia* non in parte affecta, sed in spina dorsi; ut *unguentum nervinum, martiatum, ol. tereb. sal. volat. &c.* Item maximo cum emolumento sequens emplastrum spinæ dorsi admovetur; *℞. Empl. de ranis cum quadruplo mercurio ℥j. camphor. ʒß. malaxetur cum ol. succin. & fiat emplastr. Voaldfchmid.*

*Tinctu-
ra Pit-
carnii.*

Art. 852. Tinctura antiepileptica *Pitcarnii*, in cap. de *epilepsia* tradita purgantibus orba ab autore laudatur.

*Remed-
ia alia
varia.*

Art. 853. Virtutes & usus remediorum sequentium lector ipse expendat: *Cataplasma de rapis, cinnabaris antimonii, emplastrum de pyrethro, enema apoplectic. enema terebinth. fœtus spirituosus, galbanetum Sennerti, guttæ Goddardianæ, infusum cephalicum, linimentum paralyticum, oleum lumbricorum* (per distillationem mira præstat), *pluviz adguttetam, spiritus sanguinis, succi scorbutici, tinctura cantharidum, tinctura epileptica, unguentum ad atrophiam, unguentum salino volatile.*

*Altera
curatio-
nis me-
thodus.*

Art. 854. In simplici Paralyfi seu in ea, quæ ab Apoplexia non dependet sanguinis eductio necessaria omnino non videtur, sed exordien- dum ab Emeticis, quorum uno alterove propi- nato

nato acris Clyster jubebitur, quemadmodum sequens est.

℥. Senn. unc. j. aq. commun. ℥ j. sem. ebull. ad consumpt. tertiæ part. colat. add. Vini Emet. turbid. unc. j. Hieræ colocynthid. unc. j. sem. f. clyst. loco vini Emetic. & Hieræ prædictæ addi potest ipsius colocynthid. unc. sem. si viridis est vel ℥ij. si sicca.

Clyster

Præterea pulveres sternutatorii quoque conveniunt; ut qui ex Betonica, Salvia, Lauro, Nigell. Roman. & Hellebor. alb. parantur, atque externe Lumbricorum oleum vel Petroleum &c. fricando artus inungitur, a nucha vero usque ad lumbos frictiones habeantur cum spir. Vini Camphor. Lavendul. circa dorsi spinum frictionibus insistendo.

Sternutatoria.

Art. 855. Hujusmodi externa remedia, cum plurimum opitulentur, nullo modo præteriri debent. Quare alterum hic sistimus plurimi habendum, cujus usus diu continuandus.

Pomata.

℥. Visc. pomor. man. iij. contundant. in mortario, dein coq. cum axungia dulcis suis lib. j. sem. per horæ quadrant. expressæ; decoctioni add. Cere unc. j. thuris ℥ij. m. super ignem tempore iij. vel iv. minut. semper agitando, & conservetur pomata.

Pro ejus usu primo coram igni fricatur æger, & abluitur vino albo, calente; exsiccatoque vini madore partes paralyticæ maxime vero junctura hæc Pomata inunguntur, cujus quantitas fater magnitudinem exæquans manibus arrepta inter fricandum linquitur ut lique scat; dein mapis calidis confricati artus obvolvuntur. Hujusmodi linctus ter in die repetitur, iisdem mapis semper adhibitis, quæ cum priorem adipem ferant, minus absumunt de eo, qui noviter apponitur.

Art. 856. Loco hujus pomatæ sequens etiam

Pomata altera.

A a

usur-

usurpari post ab eodem descripta, qui Auctor est
Diction. Medicinal. Bruxell. evulgati.

℥. Butyr. recent. non saliti, Vini ana lib. j. salu-
roris marin. hyssop. minut. concis. ana man. j. coq. per
hor. dimid. colat. fortiter express. add. Vin. spir.
cyath. j.

Linimen-
tum.

Art. 857. Miras habet virtutes ad huc mor-
bum sequens quoque linimentum.

℥. Ol. laurin. Terebinth. ana unc. iij. Ol.
Nard. Petrolei ana unc. ij. Vini Canarini vel
Hispanic. unc. iij. Sp. Vini unc. ij. coq. usque
ad Vini consumption., & versus finem add. Pi-
per. pulv. unc. sem. Rad. Pyretr. pulv. ʒij. Castor.
pulv. ʒvj.

Art. 858. Quo linimento collum, dorsi spina,
& lumbi coram igni perfricantur, inde vero map-
pis calidis loca fricata obteguntur. Id vero non
expeditur, nisi æger antea purgetur. Purgatur
enim mediante gunum. Gutt. gr. iv. Merur. dulc.
gr. x. & Extract. Helleb. nigr. gr. iv. Hujus autem
extracti præparatio ita se habet.

Extra-
ctum Hel-
lebor.

℥. Hellebor. nigr. pulverat. unc. j. infund. in
cyath. sp. vin. & diger. super cineres calidos sæpe
miscendo ut vin. sp. tinctur. extrahat. Ubi vi-
deris tincturam eductam, eandem decanta, &
super remanentiam tantundem sp. vin. noviter
affunde simul identidem miscendo, donec rur-
sus aliquantisper tingatur, atque liquore hoc
etiam decantato cum priore in vase vitreato ad
cinerum calorem inditur, ut ad extracti consisten-
tiam evaporet. Hujus extracti dosis est ad gr. x.

Si spatium duodecim dierum tres hujus extra-
cti doses debitis intervallis assumantur, qui al-
vi segnitie laborant, id commoditatis sibi vin-
dicant, quod ut cetera purgantia post effectum
alvum segniorem relinquunt, hoc contra eandem
lubricam deinceps facit.

Art.

CAP. III.

Paralysis.

371

Art. 859. *Stocherus* sequens Topicum ad Paralyfin magnopere commendat. Topicum
aliter.

℥. *Urtic. maj. man. iij. Chamamel. man. j. sal. commun. unc. iij. cumini unc. j. contud. in mortario & cum aq. commun. lib. v. coq. ad consumpt. quarta partis.*

Hac vero decoctione membra paralytica abluuntur mane, & vespere quotidie, quæ inde in appa eodem liquore inebriata obvolvuntur, & quatrduo prætergresso ol. vulpini usque ad perfectam sanationem inunctio continuatur.

Art. 860. Artificialia Balnea ad hunc morbum quoque laudantur. Eadem vero sequenti ratione parari possunt. Balnea
artifi-
cialia.

℥. *Bacc. Laur. sulph. viv. ana lib. sem. Rad. gen- rian. man. iij. enul. campan. aristoloch. long. ana man. ij. concis. radicibus eadem cum reliquis coq. in aq. commun. f. q. pro Balneo.*

Art. 861. Purgantia fortiora in hujus morbi principio angue pejus sunt vitanda cum non raro mortem intulerint; eadem in primis admodum officiunt, quando paralysis vel Scorbuto vel Colicæ succedit. Eadem quoque cautio adhibenda est pro Clysmatum usu, quæ principio nisi emollientia juberi debent, progressu vero etiam acria, ut ea sunt, quorum supra meminimus, (§. 854.) vel ut sequens se habet. Nota-
ne.

℥. *Salv. origan. centur. min. ana man. j. pulp. pomi coloquint. f. decoct. pro Clystere.*

Art. 862. Plurimum item ad hunc morbum decoctio celebratur Baccar. Juniper., & Lauri, cujus aliquot propinatis cyathis, æger ad sudandum disponitur. Sedori-
fera.

Art. 863. Pro potu communi in Paralyfi Pti- sana quædam jubenda est ad normam sequen- Potus
commu-
nis.

℥. *Aq. commun. lib. ij. in qua per hor. quadr. Curatio.*
A a 2 ebull.

ebull. Rad. Irid. flor. unc. j. mell. unc. ij. Durante coctione Mel deſpumetur, & colat. ſit proſu.

Para. *Art. 864.* Si morbus Apoplexiam conſequa-
ſſis ab tur, remedia ſupra titulo Apoplexiæ commen-
Apople- data diutius continuanda, quarum doſis tantum
xia. & tempus eadem ſumendi, habito reſpectu cir-
 cumſtantiarum, temperari debebunt. Nam mi-
 nus equidem frequenter porrigi poſſunt, ſed ſi-
 mul danda opera, ut frictionibus membra affe-
 cta in priſtinum reſtituantur.

Nota be- *Art. 865.* Monendum eſt: quod ſi pars affecta
ne. extenuari, & contabefcere incipiat; aut tempe-
 ramentum ægri ad bilioſum vergat, inter haben-
 das frictiones penetrantia, & ſubtilia nimis re-
 media caveantur.

Aqua- *Art. 866.* Utilius quod dari poteſt conſilium
rum mi- iis qui Paralyſi correpti fuere eſt: ut quovis
neralium anno ad Aquas Minerales ſulphureas ſe confe-
ſus. rant, ut ſunt ex ad aquas Sextias, ad *Burbon-*
Lancy ad Vichy &c. in Gallia, & *Bathonianæ*
 apud Anglōs. Si vero in caſſum harum aquarum
 uſus cedat, quidam Præcticus conſulit, ut æger tan-
 quam ad ancoram ſacram ad Balnea Montis Au-
 ri Alvernix confugiat, maxime vero ad Balnea
 Neryniana, quæ ſæpe optimos præſtitiffe effe-
 ctus teſtatur, modo per plures annos adeantur.

C A T A L E P S I S.

Catale- *Art. 867.* Catalepiſis ſeu Catoche, Latinis &
ſis. Arabibus congelatio dicta, eſt affectus in quo æ-
 gri manent rigidi in eodem ſtatu, quo prehenſi
 fuerunt: interdum tamen non nihil audiunt, vi-
 dent, recordantur, & poſt narrant; ſi quid ori-
 ingeratur deglutiunt, impulſi incedunt. Milites
 in obſidione Metenſi haſtam in manibus tenue-
 runt,

runt, equites turinam sequebantur, non minus quam congelati. Est morbus raro occurrrens at satis acutus, intra 3. aut 4. ad summum dies jugulans; quandoque fit metastasis in *epilepsiam*, *apoplexiam*, vel *melancholiam*: in genere paucissimi restituuntur; nemo liberatur, cui secundo catochus supervenit.

Raro occurrrens,
Gravissime curatur.

Ettmulleri sententia.

Art. 868. Cataplexis seu catoche, est affectus rarissimus, & summe mirabilis; in quo cessat omnis sensus internus, & externus, & motus, ita ut ægrorum membra rigida sint, & instar statuarum in sua positura; impulsa tamen moventur, sed tamen denuo in ista, per motum acquisita figura, fixa permanent. Vulgo pro *ecstaticis* habentur. „ In hoc affectu (inquit *Doctus*) alvi ac urinæ fit suppressio; respiratio tamen integra, & illæsa manet, & sanguinis circulatio, ægris vero immoti manent, instar *Marpesie cantis*.

Morbi
descri-
ptio.

Art. 869. „ Quoad curam, in genere ab omnibus practicis tam veteribus quam neotericis hunc morbum ejusdem farinæ medicamentis, quibus *apoplexiam* curari lectori patebit; unde jure merito *apoplexia inversa* nuncupatur. Remedia omnia profunt, quæ viscidum quodcunque incidere vel attenuare, & proratione occasionis evacuare valent; excellunt *salia volatilia*; conveniunt *vomitória antimonialia*, *epispastica*, *antispasmodica*, *antiparalytica*, &c.

Curatio.

Boerhaavii Sententia.

Causa proxima. Art. 870. Hujus morbi causa proxima est immobilitas sensorii communis, prout primo momento insultus se habebat. Ergo sanguinis cerebrosi, glandularum cerebri, emissariorum ejus absoluta est quies, ut in initio. Omnes quidem in eo morbo functiones cerebri læduntur, & illæ, quæ inde pendent; soli muscoli sic manent tensi, ut in initio erant; cæterum respiratio & pulsus supersunt, at plerumque leves. Diffecta cadavera demonstraverunt arterias venasque cerebri valde turgentes, fortiter impacto denso cruore; in morte plerumque finitur.

Curatio. Art. 871. Solvitur interdum *larga narium hæmorrhagia*; ideoque curatio tentatur hæmorrhagiæ ex naribus prolectu, hæmorrhoidalis, menstruive fluxus prolectu; sternutatoriis, vomitivis; vesicatoriis; fonticulis (inter-scapularibus); setaceis; victu humectante.

Inter legendum, & observandum.

Definitio. Art. 872. Catalepsis universum corpus repente in tali situ, quo illudprehendit, firmissime rigidum detinet, ut gestus oris, oculorum, ac membrorum plane eosdem servet: rarissimus est affectus.

Curatio in paroxysmo. Art. 873. Curatio hujus morbi duplex est, vel tempore paroxysmi, vel extra eundem. In paroxysmo a calidioribus stimulantibus abstinendum est, si morbus ab humorum nimio orgasmo, expansione, ac stagnatione oriatur: ut maxime in hysteriis.

Extra paroxysmum. Art. 874. Extra paroxysmum curatio varia esse debet pro diversitate causæ morbi, si oriatur.

tur a copia sanguinis vel a consuetis suppressis hæmorrhagiis per idoneas phlebotomias occurritur, aliisque congruis remediis opitulatur. Si a melancholia, evacuationes sanguinis nocerent; sed victus humectans, blanda solventia, & spirituosa remedia profunt: ut serum lactis, fructus horæi, mel, vini spiritus, & similia. Similiter hæc omnia juvant si catalepsis per diuturnas febres exhaustum corpus prehenderit. Si ex validis animi affectibus optimum remedium imo unicum peregrinationes, & suscepta itinera exhibent.

Art. 875. Sternutatoria absque successu in paroxysmo adhibita sunt, vomitoria quidem utilius, ubi mali fomes circa ventriculum sit. *Notabile.*

STUPOR SEU TORDOR, & obdormitio membrorum.

Art. 876. „ Stupor vel torpor in genere est *Stupor.*
 „ sensus tactus vel motus, vel utriusque imbecillitas, quæ quidem plerumque est aliqualis *seu Torpor.*
 „ paralytis scorbutica inchoata; saltem istius
 „ morbi plerumque est prodromus. Si plura simul occupet membra *hemiplegiam* aut *apoplexiam* minatur. Stupor in facie *torturam oris*
 „ portendit.

Art. 877. „ Huc quoque pertinet affectus a *Obdormitio.*
 „ a quibusdam *obdormitio* membri unius vel plurimum vocatus. Hæc obdormitio videtur esse
 „ affectus ex torpore, & dolore aliquali simul
 „ mixtis, qualis a causa externa plerumque
 „ excitatur, compressione scilicet membri vel
 „ nervorum in eo, unde influxus spirituum animalium inhibetur, qui postea laxatis nervis
 „ copiose, & subito in illud recurrunt, & subi-

„ tam alterationem faciunt, quam dolor ille vel
 „ molestia sequitur.

*Historia
 singularis.*

Art. 878. „ Novi quemdam fere sexage-
 „ narium, *colica nervosa diuturna* laboran-
 „ tem, nimirum triginta plus minus annos per
 „ menses aliquot illum quotannis affligente,
 „ in hunc affectum tandem incidisse silente fe-
 „ re colica aut saltem leviter ac impotenter
 „ dolente, nempe *in stuporem, & torporem, &*
 „ *obdormitionem brachiorum & crurum, præcipue-*
 „ *que manuum, & tarsorum, & musculorum ocu-*
 „ *larium*. Huic imperavi *rhabarb. ℥j. vel ʒss.*
 „ alternis vel tertiis diebus hora aliqua ante-
 „ meridiana masticare; opobalsami purissim.
 „ gr. xx. *vel xxx. in sacchar. crystall. instillat.* se-
 „ mel vel bis in die deglutire, cerevisiam, &
 „ spiritus ardentes omnimodis prorsus interdi-
 „ xi. Porro bis tantum in die victum capere
 „ consului; jentaculum scilicet, & cœnam, id-
 „ que ad intervallum *novem ad minimum horarum*
 „ omisso prandio; Aquam Spadensem intercœ-
 „ nandum ad sitim potare loco cerevisiæ te-
 „ nuis, vel aq. commun. atque ex hac metho-
 „ do, dum hæc scribo, melius se habere vide-
 „ tur. *Vires Pisselæi Indici* nondum exper-
 „ tum est.

T R E M O R.

Ettmulleri sententia.

Tremor. *Art. 879.* Tremor est malum morbis *convul-*
sivis affine, in quo cum motu naturali, & vo-
 luntario simul aliquid *convulsivi* concurrit; est
 affectus seipsum oculis prodens. Tremor super-
 venit animi passionibus gravioribus, speciatim
 iracundiæ, & crapulæ, sed hic est *accidentalis*
 & tran-

& *transitorius*; metalli fossiles, & metalli fabri subinde tremunt; nimia Venus ad tremorem disponit; senio confecti fere semper tremore plus minus afficiuntur.

Art. 880. Tremor interdum periculosus est, *Prognosis.* quoniam facile degenerat in alios graviores affectus nervinos; in *paralysin*, *apoplexiam*, *lethargum*, *spasmodum*, &c. in senibus est incurabilis. Tremor qui supervenit mulieribus post partum ex retentis quibuscunque in utero est periculosus affectus; subinde enim *epilepsias* lethales infert.

Art. 881. Tremori succurrunt omnia ea, quæ in *paralyticis*, *apoplecticis* & *convulsivis* morbis conveniunt, & quæ *nervina* dicuntur: privatim cerevisia *salviata*, proximo loco *stachas Arabica*, & *rosmarin. melissa*, *majorana*, *radix*, & *semen pæon. bacc. juniperi*, *rob. ejusdem*, decoctum e lignis, *aromata*, *castoreum*, *stercus pavonis*, *cinnabarini*, &c. Quoad externa eadem sunt ac in *convulsione tonica*, quibus addi potest usus *thermarum* (*psychrolusia*.)

Farrago sententiarum.

Art. 882. Tremoris curatio inquit Auctor *Alia* diction. Medicinal. exordienda semper est a remediis, quæ obstructions tollunt, quemadmodum *quædam remedia.* Pulvis est aperitivus, & correct. universalis Helvetii, cujus præparationem in Tractatu suo de frequentioribus morbis prostat Tom. I. pag. 201. Similis huic est quem mox subnectimus.

2. Croc. mart. aperitiv. rore pp. unc. ij. Stib. diaph. solar. ℥ij. cinnab. nat. succin. flor. Benz. ana ℥ij. sal. sabin. ℥ij. Cinamom. macis ana ℥j. sem. fœcul. bryon. Ari ana unc. sem. f. pulv. subtil. cu

cui add. essent. caryophyll. fœnicul. ana gutt. xxx.
 & in phiala probe clausa servetur.

Hujus pulv. gr. xx. mane stomacho jejuno , cum azymo ingeruntur vini cyathum aqua mixti superbibendo , inde ad incedendum æger pergat , ut facilius medicamentum è stomacho egredi possit . Eadem dosis itidem tribus vel quatuor horis a prandio ingeritur , similisque iterum vespere vel dum cubitum itur . Sic usque in triduum continuatur ; quarto vero die purgans sumitur , vel si stomachum gravatum sit vomitorium . Tum pulveris usus die sequenti renovatur , & sic persistitur usque in quartum , quinto vero purgans sumitur , & eadem methodo reiteratur pulvis per quinque dies , & purgans sumitur sexto . Si opus est finita hac Methodo iterum iterumque a principio renovatur , quia credibile non videtur in morbis inveteratis , nec cito , nec facile posse salutem recuperari .

Hujus item pulveris vires non solum in hac affectione juvant ; sed etiam Melancholiam Hypochondriacam , Scorbutum , Hæmorrhoides , & pallidos Virginum colores egregie sanant , modo continuetur usus quousque diuturnitas affectionis reposcere videtur .

Ad ma-
nus tre-
morem .

Art. 883. Si manus tremunt , oportet easdem ter in die , præcipue mane , sequenti decoctione abluere .

℥. Urine hom. sani lib. iv. aque in qua fabri ferrarii candefactum metallum extinguunt tantumdem fol. Artemis. man. vj. coq. usque ad tertie partis absorptionem . Nulla colatura hujus decoctionis instituitur , sed arrepta herba incocta , eadem manus confricantur , carpique abluuntur .

Tremor
a fumo
metalli
co .

Art. 884. Si ab Hydrarg. tremor veniat , vel a quovis alio metallo Hochsternus pro specifico sequentis potus usum celebrat .

℥.

4. Rad. cannae unc. ij. fœnicul. unc. j. cerevis. vel Vini lib. ij. sem. coq. ad tertiæ partis absorptionem, & colat. sit pro usu. Hujus subinde cyathus propinatur cum regimine calido, & sudor elicitur.

Ar. 885. Quoad huc facientia Topica Fore- *Alia*
Topica. stus laudat frictiones cum ipsa ægri urina. Similiter membra trementia ablui possunt Aq. urtic. Mens. Maii colectæ; item olea Nard. Lumbric. Salv. Majoranæ, Lauri plurimum præstant ut, etiam Unguent. Martiatum &c.

Art. 886. His similibusque auxiliis, qui ætate *Prognosis.*
 valde non invalescunt, facile roborantur, firmanturque, senes contra ab habituali inveteratoque tremore numquam liberari possunt.

C O N V U L S I O.

Art. 887. Convulsio sive contractura est nervorum musculorumque versus suam originem, involuntaria, & perpetua retractio, & ita distinguitur a *motibus convulsivis*, qui suas habent interpolationes: Estque vel *universalis*, *tetanus* dicta, qui dividitur in *emprosthotonum*, & *opisthotonum*; vel *particularis*, quæ membrum quoddam vel articulum privatim respicit, hujus speciei est *spasmus cynicus*. *Convulsio ejusque divisio.*

Hippocratis sententia.

Art. 888. Convulsio dicitur de illis partibus nostri corporis, quæ contrahi possunt, atque in illa contractione persistere, & propterea non contrahuntur humores, quod fluxiles sunt, nec contra ossa, quia omnino stabilia. Contrahuntur igitur illæ partes, quæ medium tenent locum, *Quænam partes corporis convulsionibus subjiciantur.*
 luti

Iuti quæcunque vel nervi sunt, vel de nervis participant.

Convul-
sionis
causa.

Art. 889. Causæ convulsionis sunt, vel nimia caliditas cum superflua humiditate, vel nimia frigiditas cum adjuncta siccitate quare convulsio fit a repletionem, vel ab inanitione; attamen eadem quandoque fit ab aliquo conjuncto absque ulla qualitate, vel materia in re attracta, quemadmodum si dum ventriculus attrahitur, viscus insequens attrahatur. Hinc eadem causæ, vel sunt intrinsecæ, quemadmodum hæc, quas diximus, vel extrinsecæ veluti ex hellebore potionem, ex vulnere, ex sanguine multo fluente, ex immodica purgatione, ex ebrietate, ex aeris constitutione frigida, & humida, ex vigilia, ex labore, & violentia atque ex æstu vehementi.

Convul-
sionum
species.

Art. 890. Tres sunt convulsionis species, quarum prima appellatur *Tetanus*, & est quando cervix una cum reliquo corpore immobilis manet, & in neutram partem inflecti potest. Hanc latini vocant *distensionem*, & Celsus *rigorem*. Secunda nuncupatur *Emprosthotonus*: & hæc fit quando caput, cervix, reliquumque corpus in pectus contrahitur. Tertia nuncupatur *Opisthotonus*: quæ fit quando caput in scapulas convellitur.

Convul-
sionibus
obnoxii.

Art. 891. Subjiciuntur convulsioni: caput dolentes, exsudantes, & alvum suppressam habentes. In dentitione ubi alvus parum deponit, & febris acuta non accedit, sed altiore somno pueri utuntur. Qui post acceptos in ulceribus humores ab iisdem præter rationem liberantur.

Prognosis.

Art. 892. Quartanis capti non convelluntur, si vero convellantur, quartana superveniente immunes fiunt. Si ebrius quisdam repente obmutuerit convulsus moritur, nisi febre corripiatur; nam qui a convulsione, aut distensione

nervorum tenentur, febre superveniente liberantur, contra vero si convulsio in febre appareat febris eadem die, aut postera, aut tertia sedatur. Quare febrem convulsioni supervenire melius est, quam febri convulsionem; atque adeo si puerperis convulsio fiat, febrem excitato: & cerato multo tepido in vesicam immisso ac per clysterem infuso colluito. Convulsio ex helleboro, ex vulnere, ex hæmorrhagia, ex vigilia, ex ileo, ab angina absque tumore in faucibus, ex febre acuta, ex medicamento potione mala est, sæpe vero lethalis; maxime si eadem die non desinat, nam qui convulsionibus corripuntur quatuor diebus pereunt; si vero hos effugerint sani fiunt.

Art. 893. Convulsioni sic mederi oportet. *Curatio.* Ignis ab utraque lecti parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur, minore tamen pondere, quam quod insaniam facit, & ad tendines posteriores sacculi imponantur; nam articulos induratos, vel ab inflammatione prægressa, vel a convulsione operæ pretium est sanare aqua calida in utriculam infusa ac superimposita.

Schmitzii sententia.

Art. 894. Spasmus cynicus, qui est distortio *Spasmus* utrumque latus oris obsidens (sin vero alterutrum *cynicus.* tantum latus convellatur, *tortura oris* dicitur, *Ettmuller.*) a rictus canum ira percitorum & ad *Tortura* mordendum sese comparantium similitudine *oris.* appellatur. Ex se turpe est malum & difficile curatu, exitialium morborum, ut *apoplexia*, aut *epilepsia* non raro est prodromus. *Ligatura*, qua, tanquam capistro, facies ad figuram naturalem reducat. Medicamenta *antiparalytica* &
an-

Curatio. antispasmodica sunt usurpanda. „ Pro homine
 „ quodam octogenario sequens linimentum præ-
 „ scripsi, non neglectis interim appropriatis in-
 „ ternis quorum nunc oblitus sum; & præter
 „ spem omnem curatus est. *℞. sapon. venet. ℥ij.*
 „ *camphor. ℥ij. ol. mac. per express. aq. regin. Hungar.*
 „ *ana ℥ss. sp. sal. armoniac. gr. xxx. ol. junip. gr. xl.*
 „ *ol. castor. ℥ss. misce.* „

Cælii Aureliani sententia.

Aureliani descri- ptio. *Art. 895.* Interdum buccas adducit in postero-
 rem partem tanquam ridentibus; nunc palpebras,
 & nares, collum etiam, atque humeros rapit, &
 ita patientes facit commoveri tanquam onus hu-
 meris bajulantes transferendi ponderis causa (sed
 hæc species videtur esse *emprosthotonus*.)

Aliunde.

Curatio. *Art. 896.* „ In hujusmodi spasminis particulari-
 „ bus post *evacuationes* (si indicentur) factas, ex-
 „ hibenda sunt remedia *antiscorbutica*, & *anti-*
 „ *spasmodica*: Inter hæc eminent expressiones
 „ *millepedum*, *castoreum*, *elixir peonie* & deco-
 „ ctum *guaiaci*, & ultimo ad *topica* devenien-
 „ dum est; pars affecta, in artuum *contracturis*,
 „ si fieri possit, in *intima bovis* aut *vervecis* re-
 „ cens cæsi immistatur, & ibi tamdiu detinea-
 „ tur, quamdiu animal calet; commendantur
 „ balnea præcipue *sulphurea*, & *balsamum galba-*
 „ *ni terebinthinat.* a Sennerto.

Ettmulleri sententia.

Convul- sio toni- ca. *Art. 897.* Convulsio *tonica* est convulsio proprie-
 dicta, viz. quando pars convulsa rigida manet,

ac metus est, ne omnino contracta permaneat. In India orientali epidemicum malum est varii generis convulsio, de quo eleganter scribit Bonrius.

Art. 898. Inter universalia clysmata sunt valde Curatio. proficua; remedia interna sunt: *carminativa, cephalica, antiepileptica*, in pertinaciori malo decoctum *e lignis*. Externe *linimenta spirituosae & penetrantia*, speciatim *lumbrici vivi* applicati, ol. & sp. *lumbricorum camphorat. ol. succin. cum petrol. galbanetum Paracelsi cum ol. euphorb. ol. terebintb.*

Aliunde.

Art. 899. Spasmi sive motus convulsivi sunt *Spasmi* contractiones musculorum non constantes, sed *sive motus convulsivi* cum interjecta aliqua quiete alternatim cessantes & celeriter redeunt ab involuntario & irregulari spirituum animalium influxu. Tales cernuntur in *epilepsia*, in *passionibus hystericis & hypochondriacis*, aliquando in *scorbuto*, in *febris malignis* male judicatis, in *capitis vulneribus & contusionibus gravioribus*, &c. sed hi affectus seorsim tractantur. Motus convulsivi sive spasmi ab ataxia spirituum a summitatibus vel originibus nervorum inordinate descendentium oriuntur. *Tensio convulsiva* solidarum partium est una ex primariis causis, quæ *equilibrium* destruunt inter solidas & fluidas. Jour. de Scav.

Art. 900. Lethalis evadit convulsio ex eo *Unde lethales* so- lum, quod suffocationem inducat convulsis mu- sculis respirationi dicatis.

Farrago sententiarum.

Art. 901. In acutis morbis, maxime circa fi- *Prognosis.* nem, convulsiones sunt lethales: ut in phreniti- de

de &c. Ab iis magis periclitantur pueri quam adulti. Si mulier ex abortu convellatur, raro evadit, nisi vapores sint in causa *Aretaus*. Narcotica convulsiones a doloribus, & vigilia productas sedant; sed si convulsio cum somnolentia, & epilepsia jungatur periculum augent.

Remedia *Art. 902.* In curatione convulsiones generalia *quadam.* remedia, primo tum specifica usurpanda sunt. Et si pulsus bonus appareat, nihil magis phlebotomia juvat. In habitu vero corporis pituitoso pulvere cornachino alvum purgato *Baglivus*.

Art. 903. Convulsiones formam sæpe mutantur, & diversorum morborum speciem simulant, nam & tussim, & colicam, & asthma, & vomitum, & Ileon, & tympanitidem, & cardialgiam, & nephritidem faciunt. In iis omnibus morbis ab hac causa productis *Laudano* feliciter obviam itur.

S I N G U L T U S.

Tralliani sententia.

Singultus. *Art. 904.* Singultus est motus diaphragmatis convulsivus. *Sternutatio* singultui superveniens illum solvit, quoniam est motus spasmodicus ei contrarius. Interdum est malum diuturnum per plures dies, menses, annos, affligens; aliquando penitus incurabilis, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi aut diaphragma, aut nervos afficiens, fere subesse solet.

Cura. *Art. 905.* Quoad curam (est morbus *primarius* vel *secundarius*, si *posterior* habenda est ratio morbi a quo pendet, in genere *antispasmodica* & *stomachica* sunt adhibenda) *Laudanum* cum *cardiacis*, *zinzib. condit. stomachica*, *carminativa*,
præ-

præmisso vomitorio, vel purgatione cum calomel.
&c. Externe cataplasma ad singultum Mynsicht,
quod componitur ex fermento acricum pulv. ment.
& aliis aromat. cum ol. castor. &c. malaxat. Qui-
dam cum spongia aut pane calido applicant ven-
triculo fotum humidum factum ex aceto cum ca-
storeo, pipere & sinapi cocto. Interne pelliculæ in-
ternæ ventriculi gallinæ exsiccatae & pulverisatæ.
Ubi pertinacior perdurat (in morbo primario)
ad septimanas aliquot in corpore robusto sem-
per provocandus est vomitus.

Art. 906. Virgo hoc morbo laborans per lon-
gum tempus post permulta remedia incassum ten-
tata, solo spiritu aruginis ab empirico exhibito
curata fuit. Bonetus. Spiritus
aruginis.

Art. 907. Eruditus medicus usum remedium Remedia
varia.
sequentium probe calleat, aurum Mosaicum, ca-
taplasm. stomach. fatus spirituosus, fatus stomachi-
cus. Et præ reliquis julap. muscatum, quo non-
dum hætenus novi præstantius remedium (inquit
Fuller.) aliquando enim divinitus succurrit, &
singultum superat. Hanc veritatem testatur
praxis nostra. Diascordium larga dosi ad ℥ij.
in febribus, Sydenham. (imo ad ℥iij. dari
potest.)

Art. 908. Si causæ singultus fuerint viscosæ, Remedia
singul-
tus ex
viscidi-
tate.
& crassæ, cum hic affectus sit stomachicus, ace-
tum juvat, præcipue, quod vocatur scilliticum,
item oxymel, quod ex eo comparatur; item vo-
mitum ciere. Singultientibus ex hac causa de-
coctum spicæ nardi, & rutæ auxiliatur, tum
etiam mulla. Usus autem sum, præter hæc etiam
extrinsecus in stomacho: castoreo, styrace, & ma-
stiche, oleo ipsa incoquens, & stomachum ve-
hementer ex eo fovens. Porro castoreum, &
potum, & olfactum in his probe opitulatur.

item nardus gallica, asarum, spica nardi, anisum, cuminum, & ligusticum.

Ex acridine.

Art. 909. Quodsi recrementa rodentia, & corrupta fuerint in causa, temperata aqua utendum est, & pane ea imbuto, ptisanaque copiosa, pisciculo, qui aceti paululum habeat, & pullis columbarum; hujusmodi vero singultientes purgandi non sunt.

Ex inanitione.

Art. 910. Sin autem ob evacuationem aut febrem singultus accedat, talis merito quidem periculosus est, quare utendum aqua creberrima, unctione, & omnibus, quæ evacuatis adhibentur. At in inflammatione, ea quæ actu frigida sunt vitari debent, sed continue tepida usurpanda, paulatim ea sorbendo.

Nona bene.

Art. 911. At si multis atque multis tentatis æger nihil levetur, festucam, aut lapillum, aut simum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito ac statim singultus desinet. In Cyrene hoc quoque didici. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum 40. & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum alligatum cito singultum finit. Cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistrae manus alligato, hoc Æthiopes ad austrum habitantes facere dicunt. Nonnulli vero panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturque, alii vero rutam ex vino, aut mulsam coctam potui præbent, alii apium, aut castoreum &c. Eximie facit etiam gargarizatio, & aurium, orisque detentio. Non autem oportet pleraque contemnere &c.

Farrago sententiarum.

Prognosis.

Art. 912. Singultus in dysenteria lethalis; tum etiam in hæmorrhagiis, malus item ex hypercatharsi. In ileo, in hepatis inflammatione,

in

in Colica, tum in omnibus inflammationibus, & gangrænis perniciosus est.

Art. 913. Curatur phlebotomia, & purganti- *Curatio.*
bus sæpe repetitis, maxime vero potu lactis vacini, nec non ol. amygdal. dulc. julapiis, emulsionibus, aliisque hujusmodi. Narcotica quoque conveniunt, & vomitus excitari potest, vino emetico cum infusione fol. fennæ propinato. Hæc autem cuncta remedia habita ratione circumstantiarum, & ex cognitione causæ singultum facientis cum prudentia, & grano salis adhiberi debent.

Art. 914. Sternutationem singultum tollere docuit Hippocrates, quod etiam occurrit in Platonis dialogis, sed hoc semper verum non est, maxime si a ventriculi repletionem aut ab irritante humore affectio hæc producat. *Nona bene.*

STERNUTATIO.

Art. 915. Sternutatio est motus convulsivus musculorum expirationi inservientium & diaphragmatis; nobis invitis accidit plerumque ex acrimonia humoris e glandulis narium sponte erumpente; vel ptarmicis excitatur; immo aliquando ab aere frigido vel radiis solaribus. *Sternutatio.*

Art. 916. Sternutatio nimia est morbus de genere convulsivorum; ideoque in genere eandem curam postulat; *lenientia & mucilaginosæ* naribus attrahenda sunt; eandem fere curam admittit, ac singultus. *Cura.*

Art. 917. Ad inhibendam sternutationem a lymphæ acris defluxu productam commendatur compressio anguli majoris oculorum prope nasum digitis facta, dum altera manu simul nares clauduntur, ut lymphæ inde effluens non per nasum, sed per oculos egrediatur. Hoc enim

creditur, sternutationem protinus sistere. Juvat etiam si naribus lac calidum, vel ol. amygdal. dulc. attrahatur. Si vero magna insistentia, & importunitate sternutatio perennet corpus hydragogis purgandum est, vel etiam pyrethr. rad. pip. euphorb. aliisque salivatoriis masticando lymphæ copia irritantis alio est divertenda.

EPILEPSIA.

Etymullerî sententia.

Epilepsia. **Art. 918.** Paroxyfmi epileptici sunt motus convulsivi, in quibus universum corpus, aut plura membra diversimode contrahuntur, vibrantur, aut agitantur. Tres sunt gradus hujus affectus; primus parum differt a tertio gradu *vertiginis*. In secundo gradu adsunt agitationes & gesticulationes variæ, sensibus externis ac internis perstantibus, aut in delirium abreptis, saltant, cantant, rident, flent, ridicula narrant, vociferant, pectora percutiunt, post paroxysmum interdum omnium recordantur, interdum nihil sciunt. In tertio gradu omnistam sensus, quam rationis usus perit, ad humum prosteruntur, dentibus strident, corpus insigniter attollunt, spuma per os ejicitur, labia & linguam mordent, &c. quibus remittentibus ægri tanquam sopore oppressi jacent, ad se redeuntés nihil horum sciunt, tantum de torpore, & gravedine quadam capitis, & artuum lassitudine conqueruntur; qui secundo gradu laborant, vulgo *pro obsessis a demone* habentur.

Prognosis. **Art. 919.** Imprimis *lunæ motibus* auscultat epilepsia, maxime ea, quæ est *per essentiam*. Epilepsia *habitualis* interdum sine periculo vitæ ad plures annos durat, utut sæpius recurrens ægros plus

plus minus paralyticos, delirantes, aut stupidos reddat. In junioribus aliquando circa pubertatem terminatur; post 25^{um} annum superveniens fere usque ad mortem durat, teste Hippocrate, sed hoc non est omnino verum. In junioribus spes est circa pubertatis tempus.

Art. 920. Cura inchoanda est cum vomitorio, Curatio: maxime si morbus sit per consensum, mercurius dulcis permiscendus est cum purgantibus, quæ etiam debent esse mitiora; laudantur absorbentia, martialia, acidula, decoct. e lignis, fonticuli; si venesectio celebretur, fit in talo. Inter specifica antiepileptica numerantur sequentia, Radix peon. mar. flor. lilior. convul. tilia, sem. ruta, viscus quercinus, vel potius corylinus, lignum huxi, sp. ceras. nigr. aq. epileptic. Langii sp. sang. human. secundin. human. cranium humanum, dens hippopotami, castoreum, stercus pavonis, camphora, sal. & ol. succini.

Art. 921. Ad excitandum ægrum e paroxysmo Quid infletur fumus nicotianæ (vel avium pennarum) agendum in fauces; suffitus succini etiam multum contra paro-
fert; conveniunt ligaturæ communicationem spas-
modicam inhibentes, si, scilicet, ab extremita-
tibus convulsiones inchoentur.

Ballonii sententia.

Art. 922. Epilepsiæ in genere tres sunt differentia: Prima per propriam cerebri affectionem; secunda per consensum ventriculi; tertia ob partem peculiariter affectam, a qua aliquid manat; convulsionem epilepticam producturum. Magni refert ad morbi curationem, quænam sit species, & quænam idea, & sedes primum affecta, ne quod parti alteri decet, consulatur. Epilepsia

Art. 923. Quæcumque affectio comitialis post species

25. annumprehendit cum ægris confenescit ex Hipp. Hæreditaria item, & gentilitia incurabilis. Quibus morbi comitiales fiunt, in pubertate mutationem accipiunt Hipp. sed juvenesprehendi Epilepsia non placet Galeno, nisi ex diætæ vitio, quia pravo utuntur cibo, & multa intempestive faciunt. Mulieres vero utero gerentes non ita facile epilepticæ concidunt, ac quum utero non gerunt. Quartana epilepsiam fugat. Quando autem dicimus epilepsiæ vindicem esse quartanam hoc audiendum est, quoniam excrementitium humorem absomit diuturnitate temporis, sed suum humorem deteriore facit accusando putredinem.

*Ingeniosi
et subji-
cuntur.*

Art. 924. Ingeniosi, ceu quibus ingenii acuties est, ob cerebri substantiam subtilem ac delicatam in epilepsiam propendunt. Carolus V. Imperat. Mahumetius, & Cæsar iis affectibus obnoxii fuerunt. Et quibus ingenii vis acutior delicatiorque, ii si quid contentius agant, præsertim in coitione hominum, & frequentia, ut si quid edisserere velint, paroxysmo epileptico capiuntur, unde quidam putarunt non eo epilepsiam comitalem morbum dici, quod dimitterentur comitia, si quis in iis epilepsia prehenderetur: sed quum alias, tum maxime paroxysmum epilepticum homines adhoriri, quum in hominum corona, cum contentione aliqua animi agere instituunt.

*Nota
bene.*

Art. 925. Quamvis Hipp. in Coac. pronuntiaverit epilepsiam hydropi supervenientem desperatam esse, vidi tamen piscatorem convaluisset. Lib. de Febr. Galenus ait: creari in vesica pueris lapidem, sed eam affectionem non ita esse pueris familiarem ut est epilepsia; nunc vero contra observatur.

Art. 926. Epilepsia morbus acutus est, & chroni-

nicus. Acutus ratione paroxyfmi maxime si æger numquam antea adortus est, unde observat Hipp. senes maxime epilepsia perire, si numquam correpti fuerint; Chronicus vero, quia sæpe redux est.

Art. 927. Princeps Avicennas explicans illud quod scripsit Galenus in arte parva, habitudo corporis est in iis partibus, quæ oculis subjiciuntur, vult quosdam esse proprios ipsius habitus morbos. Quando a pede aut inanitate sub cute dolores implacabiles excitans aura venenata ad caput surgit, id nec a visceribus nec ab interno est corpore. Unde male epileptici curantur habita tantum ratione interni corporis, potius habitui providendum est. Idem in arthritide. Magni equidem interest ad remedia usurpanda, si ab utero, si a præcordiis, si ab habitu ipso & cruribus, tibiis, aut pedibus malum est repetendum.

Epilepsia ut plurimum est prava corporis habitu-

Art. 928. Laxetur alvus, & clysterum frequens usus ineatur. Sanguis vere & autumno, maxime si sanguis peccet, detrahatur. Item catharsis autumno blandior sed frequentior sit. Ventriculo robur concilietur, & par studium esto in cerebro roborando, sed vitentur quæ sanguinem, & spiritus inflammant. Animi impetus reprimen- di, utpote a quibus malum provocatur. Pyrotica tibiis. Ungulæ alcis usus ad insultus epilepticos apprime conferens, gestanda quoque. Aquarum naturalium usus quales Nivernenfes, & Spadanæ. Quibusdam sequens remedium placet. Antim. 3. sem. accipitur, maceraturque in vini albi optimi lib. ij. Paroxyfmi tempore cochlear unum istius vini in os infunditur.

Curatio.

Villisi sententia.

Paroxysmi descriptio.

Art. 929. Insultus epilepticus universalis ac immanior tantum *convulsio* esse videtur, cujus accessio ut plurimum ex improvise aggreditur, ægrosque nihil tale cogitantes opprimit; atque ictu oculi citius, sensu, & intellectu orbos, in terram præcipitat; quippe non tam cadunt, quam cum impetu quodam prosteruntur; prostratis supervenit stridor dentium cum spuma oris, sæpe etiam capitis concussio; brachia & crura, necnon cervix & dorsum, aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus distorquentur; plerisque præcordia & hypocondria & venter intumescunt, post aliquod tempus ad se redeunt, superflite dolore capitis & hebetudine.

Curatio.

Art. 930. Est morbus curationis difficillimæ, aliquando tamen medicamentorum ope profligatur, aliquando sua sponte terminatur, viz. circa pubertatis tempus, aliter in mortem desinit, vel in alium morbum commutatur, scilicet, *paralysin*, *stupiditatem*, aut *melancholiam* (incurabilia.) *Alphonsus Ferrus* plurimos epilepticos simplici *guaiac.* decocto bis in die ad ℥vj. vel iij. præscripto, ejusque decocto secundo vice potus ordinarii (prout in *lue venerea* affolet) assumpto se curasse affirmat: si tali decocto *radix peon.* *aliaque specifica* addita fuerint, forsan efficacius esset remedium.

Chesneavii sententia.

Nota bene.

Art. 931. Quod palpitatio est cordi, talis omnino est epilepsia cerebro; nam cum in eodem usus babeat utrumque principium suam *systolem* & *diastolem*, harum ratione, ambo ab iisdem

causis, simili symptomate affici par est. Ideo epilepsia, sive tanquam morbus sive tanquam symptoma spectetur, dicenda est cerebri, aut alterius cujusque partis alteratio, quæ apta nata sit gignendæ materiæ, ichoris, aut vaporis simili, qualitatibus cerebro proprietate specifica insensibilis, cujus occursum totum concutitur motu *palpitationis* simili cum læsione functionum; nervosa in consensum trahens, quæ suo modo etiam *palpitant* (quemadmodum *arteriæ palpitante corde*) quousque cerebrum noxia excusserit.

Art. 932. Non possum probare, quod omnes *Coertio* fere consulunt, *membra scilicet coercenda esse membrorum* tempore *paroxysmi*, existimantes ex illa convulsi-
sivi motus cohibitione levare musculos; sed tantum abest: cum enim cohibitio hæc sit violenta, impediatque musculi contractionem ad terminum suum pervenire: quo longius est ab illo, eo major fit fibrarum musculi contentio.

Barbetti sententia.

Art. 933. Si epilepsia oriatur ex cerebri *idiotia*, semper adest gravitas, & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, stupor, faciei pallor, & insomnia turbulenta; si ex *sympathia* ventriculi, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi dolorem, corrosionem vel distentionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficillime inediam tolerant; paroxysmum semper antecedunt nausea dolor, & palpitatio cordis, animique deliquium; solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum, aut pituitosorum, acidorumve humorum: Si ex *utero*, circa lumbos, & pubem dolores, & simul capitis acerbi cruciatus percipiuntur.

Ratio habenda est causa, unde oritur.

Art. 934. In hoc morbo curando omnibus fere *Curatio* an-

antecellunt flores salis armoniaci & ejusdem spiritus, qui est valde volatilis & penetrantissimus, item prodest cinnab. nativ. præmissis universalibus. Haustus sequens bis in die exhibitus puellam ab hoc malo liberavit; ℞. Sapon. Hispan. albiss. ℥℥. coque ex lact. vaccin. ℥iij. bibatur tepide.

Pitcarnii sententia.

*Pitcar-
nii tin-
ctura.*

Art. 935. In epilepsia vel paralyfi post vomitum repetitum, & vesicantia detur tinctura antiepileptica sequens (junioribus vero exhiberi debet mercurius & jusculum cum lumbricis terrestribus). ℞. Rad. valerian. sylv. dictamn. alb. ana ℥vj. castor. sterc. columb. ana ℥℥. visc. quercin. ℥vj. cinnam. sum. rorismarin. ana ℥℥. fol. sen. ℥ij. jalap. turpetib. ana ℥℥. Infunde frigide per dies x. in vin. alb. Gallic. ℥viiij. colaturæ add. pulv. cran. humani ungu. alcis ana ℥ij. sacchar. ℥iv. cui immisce rite ol. succin. ℥iv. & spir. castor. ℥ij. dos. ℥iv. Expedit hanc tincturam purgantibus orbam exhibere in paralyticis declinante morbo; expedit etiam ægros, post membra affecta ad ignem liberaliter & strenue perfricta, aquis frigidis immergere.

Harrisii sententia.

*Pulvis
specifi-
cus.*

Art. 936. ℞. Lumbric. terrest. preparat. ℥j. cran. human. preparat. ℥ij. cardamom. min. ℥ij. m. f. pulv. in chart. xij. distribuend. Sumebat epileptica unam bis in die in coch. julap. cephalic. sequent. superbibebatque ejusdem coch. iij. ℞. Aq. ceras. nigror. flor. tilie ana ℥℥. paon. comp. ℥ij. tinctur. castor. ℥ij. syr. paon. comp. ℥ij. m. f. julap. sed quia tantam pulveris nauseabundi quantitatem ventriculus fastidiebat, paulo post sing. doses elix. propriet. dulc.

*dulc. gutt. xxx. sacchar. tantillo instillat. insuper
mox deglutiebat: atque hac methodo curata est
puella epileptica, postquam plurima alia incas-
sum tentavit.*

Farrago sententiarum.

Art. 937. Spuma circa os, & involuntarius *Signa*
feminis, urinæ, & excrementorum alvi exitus, *equivoca.*
*non sunt Epilepsiæ signa necessaria, sed tan-
tum vehementis morbi, propterea dicebat Rha-
zes, quodsi spuma superveniat, & semen, aut
urina, aut alvi excrementa egerantur, tunc pas-
sionem esse graviolem. Saliva enim spumosa
etiam in aliis affectibus, ubi nervi pneumoni-
ci, aut contrahuntur, aut a functione sua obe-
unda inhibentur, non raro succedit.*

Art. 938. Infantes quibus crustæ scabiosæ in *Prognosis.*
*capite superveniunt morbis Epilepticis raro cor-
ripiuntur. Epilepticos fieri Melancholicos, &
vicissim asseruit Hippocrates. Si in hoc morbo
mens læsa est, & nervorum facta resolutio, Me-
dicinæ locus nullus adest. Utile item est obser-
vare num semper, eo tempore quo infans cor-
ripitur Epilepsia, matri luant, menses nec ne.
Nam hic morbus cum alias sit difficilis, tum hoc
ipso mirabilis, prorsus medentibus visus est, quod
nova in primis, plenaque Luna soleat recurre-
re. Regit, inquit *Galenus*, Luna in Epilepticis
periodos.*

Art. 939. Vidit Thom. Bartholinus puellam E- *Casus.*
*pilepticam habentem in facie maculas, quæ pro
varia Lunæ Phasi tam colore, quam magnitu-
dine variæ erant. Tantum, ait ille, corpori-
bus nostris cum cœlo commercium; sed viden-
da sunt quæ de Imperio Solis, & Lunæ edidit
Mead.*

Art.

Alia *Art. 940.* A decimo quarto ætatis anno usque ad vigesimum aut vigesimum quintum non nisi *Prognos.* duos Epilepticos sanitati restitutos fuisse, ab eo tempore, quo praxin exercuit, observavit *Hildanus*. Epilepsia quæ infantes ultra sextam hebdomadam corripit, lethalis est: alio vero tempore periculosa, quæ Virgines ante pubertatem adhoritur, mensuris erumpentibus ut plurimum definit. Incurabilis est quæ noctu cum tremoribus adhoritur: ita etiam, quæ subinde in Maniam abit, ait *Avicenus*. In juvenibus eadem sponte sua definit ex ætatis, loci & regiminis mutatione, ait *Hippocrates*, quare non raro, qui ab ea exercentur septimo mense, septimo anno, & post decimum quartum nullis etiam adhibitis remediis convalescunt. Hic morbus alias longus esse solet, & a vigesimo quinto ætatis anno usque in diem hominis supremum perseverat, neque vitæ periculosus est, tametsi interdum, cum recens est, crebris, gravioribusque accessionibus hominem tollat. Illud etiam non perperam animadvertendum est, prægnanti foeminae si morbus accessit, hunc, facto partu, solvi: & si quid inde vitii foetus traxit, id magnâ ex parte conquiescere, ubi editus in lucem infans protinus evomuerit, multumque ejecerit aquosi excrementi: sin minus manere morbum.

*Indica-
tiones &
curatio.*

Art. 941. In curandis Epilepticis habendus est respectus causæ morbum producentis, & si purgandus est æger, id debito intervallo ab accessionibus faciendum: ne ex irritatione remedium paroxysmi augeantur. Genericæ tamen indicationes sunt 1. ut corrupta corporis fermenta evacuentur: 2. ut quæ evacuari nequeunt corrigantur, 3. ut contrahantur aut laxentur solida nimis laxa aut tensa, quousque ad naturalem tonum restituantur. Ut vero congrua

reme-

remedia hiis indicationibus satisfaciencia sceligantur, adeundi Scriptores, qui ex professo de hoc morbo egere. Interea irritum non erit observare, quod in contumacioribus Epilepsiis Vomitoria etiam repetita non sunt negligenda, sine quibus nullam Epilepsiam curari *Vvedelius* testatur. Cavendum ne cinnabarinis falia cum primis fixa misceantur, ne mixtura Mercurio sublimato similis hinc emergat, & convulsiones augeat, & quia spirit. sal. armoniac. lac infantum in ventriculo coagulat, in eorum Epilepsia tractanda ab ejus usu caveto.

Notabene.

Art. 942. Epilepticus, remediis aliis minus proficientibus, *super mare naviget ad nauseam, & vomitum excitandum*, idque aliquoties repetat: & deinde deambulet, horis tribus, quatuorve quotidie, per integram septimanam, vel diutius, in *sulco immediate post aratum humum, versans in agello annis aliquot feriato*. Dicit aliquis authorem pro certo insomniis ludificari; quanquam hoc credat, experiri licet, nec fortasse facti poeniteat.

Art. 943. Ultra omnia, ad morbum caducum curandum, & penitus eradicandum valet *dieta lactea* ab aliis quibuscunque obsoniis, & potulentis omnino abstinendo; ut ex insigni historia *Medici, Noviomagi* non multo pridem degentis, isto modo curati docemur. Vid. *Cheynei* Tractat. de Arthritide, p. 103. &c.

Art. 944. Causa proxima omnis Epilepsiae exquisitae semper est nimia cerebri in nervos motores, nulla in sentientes actio. *Boerhaave*. *Melancholici* fiunt aliquando Epileptici & contra, Epilepsia (inquit *Hippocrates*) *pituitosis* quidem contingit, minime vero *biliosis*. *Crato* *cinnabarim nativam* tanquam Epilepsiae *magnetem* commendat, hoc modo exhibitam; *℞. Cinnab.*

Remedia varia.

*nab. nativ. opt. subtilissime trit. ℥β. coral. rub. præparat. margar. præpar. ana ℥ij. croc. opt. ℥j. fol. aur. N. xv. f. pulv. subtilissimus, dos. ℥j. cum julap. cephalic. Succus rutæ multum laudatur ad epilepsiam : ideoque ejusdem extractum iisdem pollet viribus, & commodius sumi potest. Electuarium Peruvianum Epilepticum Fullerii est præstantissimum, & certissimum Anti-epilept., uti experientia me docuit (inquit Fuller.) Post debitas evacuationes adultis dosis sit ℥j. mane, & vespers per 3. vel 4. menses, & postea per triduum vel quatrimum ante novilunium & plenilunium, morbos Epilepticos, hystericos, & cholicos. *Alia me-reans sancti Viti penitus eradicat.* In morbis hujusmodi convulsivis ægrotis prædictum electuarium frequenter exhibui & (libenter agnosco) raro frustrata fuit spes mea. Eximix vires *radicis valerianæ sylvestris* a Fabio Columna prædicatæ, & a Riverio memoratæ, experientia M. Marchant denuo confirmatæ sunt. *Memoir. de l'Arbre cad. Vol. x. p. 430.* Cortex *Peruvianus* (inquit *arbores. Colebatch.* in Dissertatione de Visco) non certius feбри intermittenti, quam *viscus arbores* Epilepsiæ, choreæ Sancti Viti, & morbis universis convulsivis, etiam asthmatis convulsivo (& si huic, tussi convulsivæ) medetur. Dosis in substantia adultis ad ℥β. vel ultra forma boli sexta quaque hora superbibendo haust. infus. fortis ejusdem plantæ. Si singulis unciiis pulveris visci addatur drachma *asæ fætidæ*, medicamentum efficacius evadet. „ Operæ pretium esset procul „ dubio, vires *humoris mucilaginosi baccarum* in „ his affectibus tentare: Valde enim probabile „ est vim eandem, si non superiorem eo inesse; & forsân esset medicamentum minus nau- „ seabundum. “ Præter jamdicta medicamenta, sequentia etiâ quandoque præscribentis intentioni*

tioni quadrare possunt, viz. *aurum fulminans*; *aurum Mosaic. pulvis ad guttetam*, sp. C. C. *succinat. Elect. cephalic. elect. epileptic. tinctur. epileptic. & infusum cephalic. Fulleri. Elect. epileptic. & emulsio peon. Batean. &c.*

CHOREA SANCTI VITI.

Art. 945. Chorea sancti Viti a Germaniæ loco, *S. Veit* dicto, ubi sacellum sancto Vito *S. Viti* dicatum adest, nomen accipit, quo loco verno tempore juvenes utriusque sexus saltandi gratia convenire solebant, & saltare more enthusiastico; atque ibidem interdum hoc morbo correpti erant.

Sydenhami sententia.

Art. 946. Chorea sancti Viti est *convulsionis* *Ejusdem* quædam species; pueros puellasve a decimo ætatis anno ad pubertatem invadens, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel aliæ alicui parti applicatam nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm, & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contrahitur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticulationes, circulatorum instar, exhibebit: non enim recta linea ori admovet, sed deducta a spasmo manu, huc illuc aliquamdiu versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens liquorem de repente in os injicit, & valide haurit; dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret.

Art. 947. Ad curam rite instituendam *vena Cura* est secunda, & postmodum exhibe *portionem purgati-*
vam

vam communem, & vesperi haust. paregoric. postea sanguis iterum extrahatur, & ad catharsin, uti prius, æger revertatur, & ad tertiam, quartamve vicem, si vires ferant: diebus purgatione vacuis sequentia exhibeantur; ℞. *Conserv. absynth. Rom. flaved. aurant. ana ℥j. anthos ℥ss. theriach. Androm. vet. nuc. moscat. condit. ana ℥iij. zinzib. condit. ℥j. syr. & succo citr. q. s. f. elect.* de quo capiat quant. N.M. mane & hora 5. pomerid. superbibendo vin. sequent. coch. v. ℞. *rad. Peon. enul. campan. imperator. angelic. ana ℥j. fol. rut. salu. beton. chamædr. marrub. alb. summit. centa. min. ana m. j. bacc. junip. ℥vj. cort. aurant. ij.* infunde frigide in vin. canarin. ℥vj. coletur usus tempore. ℞. *Aq. rut. ℥iv. epileptic. Langii, brion. comp. ana ℥j. syr. peon. ℥vj. m. f. julap. cap. coch. iv. sing.* nocte hora decubitus instillando *spiritus C. C. gr. viij.* applicetur plantis pedum emplast. e *caranna*.

*Ad recidivam
cavendam.*

Art. 948. Ob recidivæ metum pertundenda est vena, & purgandus æger aliquoties ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulo ante) qua morbus invasit.

*Curatio
singularis.*

Art. 949. „ Ipse vidi puellas duas hoc morbo
„ affectas diutius saltitantes, tanquam lyra agi-
„ tatas, cum mentis quadam alienatione pro
„ tempore; has curavi cum *expressione millepe-*
„ *dum, & cortice Peruviano*, præmissis *venase-*
„ *ctione, & leni cathartico*. Exemplum hujus af-
„ fectus singulare habet *Solenander, consil. med.*
„ *p. 310. Electuarium Peru. epileptic. Fuller. vin.*
„ *habet egregiam ad hunc morbum domandum.*
„ Pater prædictarum puellarum, qui *clericus* e-
„ rat, filias suas *incantamentis, vel veneficarum*
„ *malis artibus* revera affici persuasum habuit,
„ nec ab ista opinione abduci potuit. Rem ve-
„ ro longe aliter se habere ex eventu luculen-

„ ter

„ ter patuit; antedicta enim remedia *obsessionem*
 „ istam protinus comminuerunt , quæ *precibus*
 „ & *lacrymis* respuerat obtemperare.

F A S C I N A T I O .

Art. 950. „ De Fascinatione in praxi mea ni- *Fasci-*
 „ hil experientia didici, quodcunque & quocun- *natio.*
 „ que de ea vulgo perhibentur, neque credo ul-
 „ los morbos a veneficiis suscitari: ideoque de
 „ medicamentis, & curatione eorum sollicitum
 „ esse non est necessarium. In prodigiosis vero
 „ quibusdam morbis, symptomatum inusitato- *Curatio*
 „ rum caterva stipatis, medicamenta *vermifu-*
 „ *ga*, item, illa quæ *epilepsie vel suffocationi* uterè
 „ medentur, vel *flatus discentientia*, utpote et-
 „ iam quæ naturaliter repugnant dispositionibus
 „ illis in corpore, quibus diabolus ad præstigia
 „ sua abuti possit, (uti credunt Theologi) sem-
 „ per locum habent.

A N I M I M O R B I :

Art. 951. Qui laborant animi pathemate cor- *Animi*
 ripi potissimum solent morbis *ventriculi*, ut in- *morbis.*
 ter cæteros observare licet in mœrentibus, qui
 conqueruntur: primo de languore ventriculi,
 mox vero de *inappetentia*, oris amaritie, & siti
 circa horas matutinas, cruditatibus acidis & ni-
 dorosis, flatibus & tensionibus hypochondrio-
 rum, aliisque læsæ chyloseos malis.

Art. 952. Si quis morbus durante animi pas- *Morbis*
 sione ægrum corripuerit, solet interdum tamdiu *durante*
 durare quamdiu ipsa animi passio, & potius in *passione*
 alienæ speciei morbum mutabitur, quam ægro- *vix cu-*
 tantem liberum relinquat. *rabilis.*

Art. 953. Morbi ab animi pathemate pen- *Quomodo*
 C c den-

tractan. dentes blande ac leniter tractandi sunt, a ni-
in sunt. mia remedium copia, & vehementia quam
 maxime abstinendum.

Sympto- *Art. 954.* Quando morbus aliquis remediis
mata a- debite præscriptis cedere nolit, insolitisque qui-
nomala busdam modis, atque a sui natura valde remo-
ab ani tis progreditur, suspicandum erit de *occultis ani-*
mi passio- *nibus.* *mi passionibus.* Inter solatia ægrotorum animo
 laborantium magnam vim obtinet *musica* (inquit
Baglivus.)

MANIA & MELANCHOLIA.

Mania *Art. 955.* „Mania cum melancholia talem ha-
& me- „bet affinitatem, ut non raro mania in me-
lancho- „lancholiam transeat, & initia melancholiæ
lia. „frequenter maniacum quid habent, ut obser-
 „vavit *Dodonaus*; ideoque in eodem capite tra-
 „ctandi sunt hi duo affectus.

Cælii Aureliani Sententia.

Melan- *Art. 956.* In melancholia adest animi anxie-
cholia tas atque difficultas, mœstitia cum silentio, &
descriptio odio conviventium, nunc vivendi, nunc mo-
accura- riendi cupido cum suspicionibus velut insidia-
ta. rum sibi paratarum; item inanes fletus, atque
 murmura vacua, & rursus hilaritas magis post
 cibum cum inflatione præcordiorum, capitis
 gravedo, color luridus cum nigrore; aut subli-
 vidus; corporis tenuitas, virium debilitas, in-
 digestio cum ructationibus odoris tetri, intesti-
 norum tormina, vomitus humorum diversico-
 lorum, & similia per podicem egestio. „ Qui
 „gravius laborant, sese vel pecudes esse vel te-
 „staceos, vel etiam vita defunctos credunt;
 „quare alii gallinacei cantum voce imitantur,
 „alii

„ alii occurrentibus cedunt, veriti ne (testacei
 „ cum sint) diffringantur, alii cibum pertina-
 „ cissime recusant, amissam esse vitam rati.

Riverii sententia.

Art. 957. Melancholia est delirium sine fe- *Mania
& melan-
cholia
quomodo
distingui-
untur.*
 bre, cum timore & mœstitia; & sic distingui-
 tur a *mania*, quæ est cum furore & audacia.
 Ex varia melancholici humoris dispositione ma-
 xima deliriorum varietas emergit; unde alii pu-
 tant se esse reges, vates, alii grana tritici, alii
 vitros, ceram, alii se esse canes, feles, gal-
 los, &c. existimant, indeque voces horum ani-
 malium imitantur, &c.

Art. 958. Varia sunt deliria in variis ægro- *Varia
sunt de-
liria pro
varietate
constitu-
tionis.*
 tantibus pro majori vel minori causæ vehemen-
 tia: alii enim feroci iracundia rapiuntur, &
 obvios quosque invadunt; & proprias vestes di-
 lacerant, sibi que ipsis interdum violentas ma-
 nus inferunt. Alii vero mitiores, & pacatio-
 res sunt, nullamque astantibus noxam infe-
 runt, sed tantum varios sermones, & ridiculos
 proferunt; interdum canunt, & rident, & sym-
 ptomata patiuntur, quæ in melancholia, & stul-
 titia solent contingere. Melancholia errabunda
menſe Februario homines potissimum infestat;
 ægri ne horam in uno loco manere possunt,
 sed continuo vagantur, quò vadant nescientes.

Art. 959. „ Admirandam melancholiæ, vel *Dyent
throni-*
 „ mania speciem apud *Oribasium*, descriptam
 „ legimus, quam *λυκανθρωπία* vocat. Hujusmodi
 „ delirio affecti foras noctu vagantur, lupos quo-
 „ dammodo æmulantes, aspectu pallidi, luri-
 „ di, os oculosque valde sicci, crura contusio-
 „ num ac vulnerum plena; circa defunctorum
 „ monumento ad instar *Demoniaci Evangelicæ*,

» plerumque versantur. Vide Freind, *Histor.*
» *Medic.* p. 18.

Difficile *Art. 960.* Humor melancholicus flagellum ,
curatur. *crux* aut *opprobrium* medicorum appellatur, quo-
niam vim remediorum eludit, solvitur inter-
dum melancholia per fluxum *hemorrhoidum* vel
Quibus per *scabiem*; aliove morbos *cutaneos*. Remedia
remediis in affectus hypochondriaci curatione proposita
tentando hic locum habent; ℥j. *Aq. nymph.* ℥j. *sal. prunel.*
est. ℥j. *camphor.* ℥j. misce, & cum linteis complica-
tis admoveatur tepide sincipiti in maniacis; uti-
lissimum quoque est *epithema ex sacchar. Saturn.*
& *aq. spermat. ranarum*.

Voillisi sententia.

Melan- *Art. 961.* Melancholici in cogitando fere con-
cholici tinuo occupantur, & inter cogitandum res pau-
cogita- ciores quam antea solebant, animo comprehen-
bundi. dunt, ita quidem ut sæpe dies & noctes idem
objectum animo volutent, de rebus aliis, quæ
interdum sunt longe majoris momenti, nihil
soliciti; & etiam objecta fere omnia iis defor-
mia, & velut sub larva apparent.

Quomo- *Art. 962.* Hæc tria fere omnibus maniacis ac-
do se ha- cidunt, viz. 1. eorum *phantasie*, sive *imagina-*
bent ma- *tionem* cogitationum impetuosarum æstu perpetuo
niaci. occupantur, ita ut varia sibi obmurmurent, aut
clamando & ejulando proferant. 2^o. *Notiones*
sive *conceptus*, aut incongrui sunt, aut sub spe-
cie falsa sive erronea representantur. 3^o. Illo-
rum delirio *audacia* & *furor* adjunguntur, con-
tra ac in *melancholicis*.

Curatio. *Art. 963.* Helleborus ab *Hippocrate* ita crebro
præscribitur, quoniam tunc temporis alia *ca-*
rhartica, saltem in frequenti usu, vix innotue-
re; jam vero longe præstat *lenioribus* & *mitiori-*
bus

bus humores subducere: Emetica sequentia sunt maxime utilia; ℥. Sulph. antimon. a gr. viij. ad x. crem. tart. ℥ss. m. ℥. Mercur. vitæ gr. vj. vel vij. tartar. vitriolat. ℥ss. m. ℥. Extract. hellebor. nigr. calomel. ana ℥j. f. pil. cathart.

Etmulleri Sententia:

Art. 964. Affectus Melancholicus seu Melancholia differt a delirio Melancholico; prior est quando homo est nonnihil mœstus & morosus, facile subinde irascitur; ipsi nihil arridet; cogitabundus est; ubi vero taliter affectis supervenit phantasma, constituit delirium Melancholicum; in quo ægri sunt timidi, anxiosi, & quasi in angustiis constituti videntur; adeoque quæcunque vident vel audiunt, sibi pejora & periculosiora persuadent; & licet interdum rident, & læti videntur; quando putant se esse divites, &c. nihilominus non est revera hilaritas; non verum gaudium; sed potius apparens, & cum risu Sardónico conjunctum; transitorium; & facile succedit novus mœror, & præcordiorum anxietas, sine causa iterum rident; & parum aut nihil omnino dormiunt; sed cum terrore evigilant.

Art. 965. Mores animi sequuntur temperamentum corporis. Fundamentum Melancholiæ semper circa hypochondria consistet, utut remotior causa interna subinde aliunde oriatur; in quo puncto lien, & uterus incusari solent.

Art. 966. In Melancholicis imprimis acidum vitiosum in primis viis abundat; hinc frequenter sunt voraces. Expiscanda est mali origo, an ex tristitia; & animi affectibus; vel ex sanguine Melancholico, in priori casu pulsus est val-

*Differe-
rentia
melan-
choliæ &
delirio
melan-
cholico*

*Funda-
mentum
melan-
choliæ*

*Origo
mali ex-
piscan-
da est.*

de obscurus, inæqualis & pene deficiens & vermicularis .

Curatio
melan-
choliae.

Art. 967. In vomitoriis consistit radix curæ Melancholiæ , & antimonialia vomitoria exhibenda sunt in larga dosi. Melancholici & Maniaci odio suum habent medicum, etiam curati licet . Alvus servanda est lubrica cum extracto hellebori & mercurio dulci, quod est alterativum æque ac laxativum , ut etiam est lapis lazuli ; in usum revocanda sunt remedia antiscorbutica, martiata, acidula ; saccharum Saturni specificum habetur ; tinctura coral. confect. alkerim. ambra , fumaria, anagallis ; hypericum , crocus , camphora , vinum generosum , &c. laudantur . Emplastrum ex racamach. capiti raso applicetur . In delirio Melancholico opium nullum fortitur effectum ; licet dupla aut tripla dosi propinetur , ægri agrypni manent, & ferociores fere evadunt.

Mania
definitio,
&c.

Art. 968. Mania sive infania est delirium sine febre cum insigni furore & audacia , exuta quasi omni ratione ; ægri pertinacissime vigilant, interdum per aliquot menses. Tres circumstantiæ sunt maxime notandæ , nempe, furor insignis, robur stupendum, & frigoris tolerantia plane mirabilis.

Curatio
maniae.

Art. 969. Radix curationis consistit in validis vomitoriis sæpe repetitis , convenit etiam venesectio , præ reliquis radix hellebori albi est vomitorium maxime proficuum, sequenti modo præparata tuto propinari potest ; ℞. rad. hellebor. alb. a 3ß. ad 3j. coque in vino donec mollescat, tunc abjiciatur vinum istud, & radix in vinum aliud injiciatur, & ita per noctem relinquatur in loco calido sine coctione tamen , postea coletur expressione levi vel forti, prout magis vel minus validum postuletur, vires sunt optimæ, nec unquam

unquam satis laudatæ; *nitrum crudum* & omnia *nitrata* summe conveniunt, remedia pro cura *melancholice* hic quoque locum habent. Immerfio subitanea in *aqua frigida* quandoque prodest.

Meadii Sententia.

Art. 970. Quoad curam infantiæ seu Melan- *Observā-*
lici, vel Maniaci delirii illud ante omnia Me- *da pro*
dicum considerare oportet, quas exinanitiones *curatione-*
ferre possit æger: siquidem omnibus fere mo- *ne.*
dis demenda est materia, modo vires id finant;
sin illæ sint imbecilles, cibus idoneis, & medi-
camentis primum confirmandæ erunt, usque
dum pati medicinam tuto possint. Nam haud
raro evenit, ut nimium exhaustis humoribus,
furori succedat insanabilis animi dejectio, &
melancholia; qua oppressus æger in perpetuis
anxietatibus, & mœstitia vitam transigit, heu!
nimis ut plurimum longam. Diutissime enim
magna ex parte vivunt infani. Modi autem præ-
cipui, qui demendæ hujus morbi materiæ con-
veniunt, sunt sanguinis missio, vomitus, alvi
purgationes, & urinæ fluxus. De hisce igitur
singulis aliquid proponam.

Art. 971. Sanguis commodissime detrahitur, *Phlebo-*
aut ex brachio, aut ex vena jugulari, interdum *tomia.*
etiam per cucurbitulas occipitio inciso admo-
tas, nimirum si quando capitis dolor urgeat,
aut ultra exauriri per venas sanguinem vires
minime patiantur.

Art. 972. Vomitus optime excitatur vino *Vomitus.*
Ipecacuanhæ in infirmioribus; in robustiori-
bus vero tinctura veratri, aut vino antimo-
niali.

Art. 973. Alvi dejectiones moliri commodif- *Cathar-*
simum *sis.*

simum est helleboro nigro ; aut infuso sennæ adjuncta tinctura Jalapii : aut denique aloe si forte mensium vel hæmorrhoidum suppressio præcesserit . Has omnes inanitiones per vomitum , & per alvum frequenter repetere ægrum oportet ; ita ut per vices aliæ aliis interponantur . Neque illud addere alienum est , valentiora plerumque remedia requirere hunc morbum , cum nervi haud facile hic irritentur .

Diuretica .)

Art. 974. Majoris autem momenti est , quam vulgo existimatur , per renes depletio , præsertim cum furor conjunctum habet febrilem ardorem . Melancholicis enim parum prodest , quos ut plurimum nimis largum urinæ profluvium sollicitat . Diuretica autem hic aptissima sunt salia ex lixiviiis herbarum crematarum parata , & sal diureticus dictus ; quorum alterutrum per vices exhibere licebit , idque portione satis larga .

Vesicatoria .)

Art. 975. Cum illis , quæ morbum minuunt , adnumeranda forsitan videbuntur Emplastra vesicatoria capiti adnota ; quæ tamen nimia irritatione nocere potius , quam juvare sæpe deprehendi . Magis conveniet veterum more caput ad cutem tondere ; deinde aceto , in quo rosar . Flores , aut hederæ terrest. folia infusa sint , frequenter fovere , ac madefacere ; item setaceum , quod barbara voce chirurgi appellant , sub occipite ponere . Illud autem hoc modo efficitur .

Seraceæ .)

Art. 976. Funiculus ex filis sat multis fericeis acus foramini inditur ; dein , facta perforatione subter cutem transversus conjicitur , sicut spatium duorum fere digitorum comprehendat ; tum per aliud , cuspide acus factum vulnusculum educitur . Illinendus autem est unguento aliquo digestivo , & quotidie movendus ,

quo

quo ex ulcere pus exeat. Nihilominus tamen in longo morbo vesicatoria interdum proficiunt.

Art. 977. Dum hisce modis noxii humores expelluntur, iis etiam remediis pugnandum est, quæ corpus immutant. Diætâ tenuis esse debet, ex jusculis maxime farinæ avenæ, aut hordei; & cibis ex media materia. Alendum enim corpus est, ne vires deficient, & detractionibus necessariis ferendis impares evadant.

Art. 978. Medicamenta plurima apud auctores, cum veteres tum recentiores, commendantur; quorum alia maniacis, alia melancholicis conveniunt: utraque autem eo collimant, ut bilem corrigant; quæ acris primum, deinde viscida, & picis instar atra fit. Quin & sanguinis ipsius habitus in hoc morbo crassus est, & tenax, nigroque colore; unde incisa cadavera cerebrum siccum, & tantum non friabile; sanguinisque canales atro, ac lento cruore distentos ostendunt. Illud autem animadvertere ex usu erit, pleraque quæ ad humorum vitium emendandum apta sunt medicamina, vi aliqua exilissimos glandularum meatus aperiendi, & subtilissimos liquores e corpore propellendi polle-
*Resinæ & gum-
mata de
obstruente
tia.*

re. Hujus generis sunt gummi graveolentia, in primis asa foetida, myrrha, castoreum Russicum, & camphora; quam vi etiam anodyna pollere, & certius tutiusque quam ipsum opium, somnum arcessere, nonnulli auctores experti affirmant. Melancholicis etiam convenientissima sunt quæcumque ex ferro parata. Plurimum denique juvat, in furoribus præsertim, ægrum balneo frigido frequenter immergere. Capiti enim, ut monet *Celsus*, nihil æque prodest, atque aqua frigida.

Art. 979. Alia ratione maniaci alia melan-
*Regimen-
cho-*

cholici continendi sunt; illorum enim reprimi audacia debet, horum spes excitanda, erigendusque animus. Neque tamen illos, qui violentius se gerunt, asperioribus onerare coercionibus, & verberibus multare, necesse est, cum satis sit vincere, meticulosi enim sunt, ut jam dixi, omnes, & cum per tempus aliquod superatos se senserint, manus facile dant in posterum, neque vel sibi, vel aliis vim inferre audent.

Difficilior res est cum iis, qui aut cum nimia tristitia, aut nimia hilaritate desipiunt; quorum animis, pro cuiusque natura medicum se accommodare necesse est. Aliorum igitur rursus intempestivus objurgatione, & minis prohibendus est; aliorum tristes cogitationes discutiendæ, ad quod symphoniarum, & ludi, quibus olim delectabantur, multum sæpe valent. Et musica quidem, quomodo corpus pariter ac animum afficiendo juvet, jam olim explicui. *Mechanical account of poisons. Essay: five Tractat. Mechan. de venenis.*

Imaginationes corrigenda. Art. 980. Illud autem perpetuo servandum est, ut imaginibus, quæ diu occuparunt, aliæ contrariæ menti adferantur, quo novis cogitationibus paulatim se assuescant; Ut enim in corpore, morbo, aut exercitiis fracto, imperanda est quies, & laboris intermissio, sic animum a vanis, quas accepit, speciebus omnibus modis abducere oportet. Id autem consequemur, si ad ea, quæ diversis motionibus exercent, convertamus. Idcirco in falsis timoribus, qui longum inhæserunt, veris periculis terrefacere, & pavorem incutere, nonnumquam prodest. Hi autem veri terrores falsorum istorum natura dissimiles esse debent, ut mentem diverso modo exagitent. Mens enim quiescere nescit, curis
vero,

vero, & sollicitudine vacua esse potest, & mutatio idearum pro oblectamento, & studiorum intermissione est habenda; pariter ac membrorum musculi, uno aliquo labore fatigati, ad alias actiones conversi refocillantur.

Art. 981. Corporis exercitationes nunquam negligendæ sunt. Ambulare, equo vehi, pileæ, globis, ludisve similibus uti; natare; quin & terra marique peregrinari, multum juvat: hisce enim tum fabricæ universæ robur confirmatur, tum assidua rerum objectarum permutatione mens ad se rediens sapere discit. *Exercitationes jubendæ.*

Art. 982. Anodyna medicamenta ad somnum arcessendum rarissime in hoc morbo juvant; in magnis tamen animi terroribus, aut ubi per longam sollicitudinem, vel tristitiam, pervigilio fatigatus est æger, illa experiri non alienum est. Neque tamen diu in his persistendum; non raro enim etiam, cum somnum inducant, expergiscitur laborans terrificis imaginibus gravius, quam antea tentatus. *Anodyna.*

Art. 983. Nullo in morbo major de iterato in ægritudinem lapsu est metus, quocirca, quæcumque posuimus auxilia, sive ad medicinam, sive ad diætam, & vivendi morem pertinent; ea omnia etiam, cum jam convaluerit æger, ad satis longum tempus per intervalla in usum revocari debent. *Prognosis.*

Farrago sententiarum.

Art. 984. Infantiæ duo genera describunt Auctores, quorum utrumque est constans error mentis sine magna febre; alterum cum furore, & audacia, alterum cum tristitia & metu; quorum illud *Maniam*, hoc *melancholiam* appellant. Hæc autem gradu tantum, ut plurimum, differunt. Melancholia enim nunc citius, nunc tardius in maniam sæpiissime transit; & remittente furo-

furore, gravior fere reddit tristitia: hinc furibundi omnes sunt timidi, & pusillanimes. Id quod in curationibus observasse, permagnus est.

Quadam causa. Hæmorrhoidum, aut catameniorum fluxus cohibiti, aut ulcera cacoethea suppressa, versus hunc morbum disponunt.

Signa. *Art. 985.* De Maniacis observare est: hæc *tr quadam.* illis fere omnibus esse communia. 1°. Eorum phantasias, five imaginationes cogitationum impetuofarum æstu perpetuo occupari; ut dies & noctes varia sibi obmurmurent, aut clamando, & ejulando proferant: 2°. Notiones five conceptus incongruos esse, & sub specie falsa, five erronea eis repræsentari: 3°. Illorum delirio audaciam, & furorem adjungi secus ac in Melancholicis, in quibus timor, & tristitia vigent.

Admirabile est in Maniacis universi corporis robur, quo fit, ut nulla vi cohiberi aliquando possint, aliquando validioribus vinculis illigati ea proscindant. Afferit *Fernelius* se Maniacos vidisse, qui per solidos quatuordecim menses nunquam dormiverint. De hac re dubitat *Bellini* sed *Boerhaavius* se hoc in Maniaco vidisse testatur. Raro item conqueruntur Maniaci de frigore, & una ex præcipuis Maniæ circumstantiis est frigoris tolerantia incredibilis.

Melancholici non una tantum insanix specie laborant: sed aut venenum, ne sibi detur, suspicantur; aut hominum consuetudinem perosi in solitudinem aufugiunt: aut ad superstitionem religionem convertuntur: aut lucem hanc, vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis advenit, qui exinde in Maniam seu furorem præcipitant. Furoris item species infinitæ sunt, inter quas eandem datur, qua laborantes propria membra dilacerant,

rant, pia cogitatione, Diis suis tanquam id postulanti-
bus, gratificantes. *Arateus.*

Art. 986. Insania, quæ cum risu est tutior, *Prognosis*
quæ cum studio, pejor. Mania licet affectus sit *sis*,
periculosus, & sanatu molestissimus, per se le-
thalis non est; & lætitia plus justo Melancho-
licis superveniens, Maniam portendit. Boni o-
minis sunt in utroque morbo evacuationes quæ-
libet, dummodo copiosæ fuerint, per sudorem,
urinam, alvum, hæmorrhoides, uterum, na-
res &c. Salutares etiam sunt febres Tertianæ,
vel Quartanæ, nec non scabiei, aliorumque cu-
raneorum affectuum eruptiones. Viri sane fu-
rore, & Melancholia corripiuntur: rarius autem
sed deterius mulieres furiis agitantur, inquit *A-*
rateus.

Art. 987. Quantum ad violentas contorsiones, *Notab.*
inquit *D. Boudon* in additionibus ad hunc Au-
ctorem Cap. 3. §. 22. & elevationes corporis per
aerem a terra, quæ de *Energumenis* atque *Exsta-*
ticis narrantur, nos easdem explicare possu-
mus, animadvertendo in omnibus ferme cor-
poris partibus fibras motrices ita contrahi pos-
se, ut innumeras motuum compositiones secun-
dum quamcunque directionem membra ducen-
di aptas, edant, quibus solidarum partium co-
natibus si diversas alterationes addas, quas hu-
mores recipere possunt, facile intelliges, totum
corporis volumen tantis agitato elateribus at-
que etiam ob humorum rarefactionem, a qui-
bus penetratur, multum de propria gravitate
amittere posse, atque hinc aliquandiu crassiori
aere levius evadere, per quem ascendere, inde
observabitur. Nos vero paucis explicationem,
hanc refellimus observando differentiam gravi-
tatis specificæ corporis gravioris in liquidum
longe levius demeri nullis artuum vibrationi-
bus

bus, & contorsionibus iminui posse, atque adeo cum plus quam mille vicibus gravius sit hominis corpus aere, in quo demergitur, oportere ut sponte sua per eundem aerem ascendat, volumen plus quam mille vicibus majus obtineat, absque prioris massæ augmento. Hujusmodi enim imminutiones gravitatis absque congruo incremento voluminis naturæ legibus repugnant.

Farrago sententiarum.

Sellio *Art. 988.* De horum affectuum origine, in-
Cadav. cremento, & ætiologia videatur *Boerhaave*. In fe-
 ctis cadaveribus Mania demortuis (inquit D.
Shavu) nihil alienum a sanorum corporibus in-
 venit, nisi forsan *induratio meningis cerebri*
exterioris, quæ probabiliter ejusdem oscillatio-
 nes liberas plurimum immutat, & interturbat,
 unde spirituum animalium distributio valde e-
 normis ac perturbata evadit.

Remedia *Art. 989.* Succus *hedera terrestris* intus sum-
varia. ptus ad ℥ij. vel iij. singulis diebus valde com-
 mendatur ad hunc morbum vincendum, item
 linimentum ex eodem succo confectum quo ca-
 put rasum inungitur, curam promovere creditur.
 Specifica duo simplicia adeo deprædicata sunt
hypericon (*Fuga Daemonum* dictum) & *anagallis*.
Angelus Sala pro arcano habuit tincturam *hy-*
perici, & aliquando cum careret tinctura, de-
 coxit *summitates* ejusdem in vino Rhenano &
 cerevisia tenui, atque utiliter propinavit. De-
 coctum *anagallidis flore purpureo* (dos. ℥iv. ter in
 die) præmisso plus semel vomitorio tanquam
 specificum commendatur ab *Ettmullero*, *Hart-*
manno, *Vuillisio*, *Sennerto*, *Quercetano*, &c.

Alia. *Art. 990.* Sequens emeticum, quod fortissi-
 mum est, in hospitio mente captorum frequen-

CAP. III. *Mania & Melancholia.* 415
ter propinatur. ℞. succ. fol. asari ℥vj. vel ℥j. aq.
card. ben. ℥ij. oxymel. scillitic. ℥℔. m. f. porio.
Pharm. pauper.

Cerevisia melanagoga.

℞. Rad. hellebor. nigr. ℔℔. jalap. ℥vij. hermo.
dacl. ℔℔. coq. in cerevis. nov. cong. xxiv. ad cong.
xviii. addendo sub finem coction. sen. alexandr.
℔ij. rad. rhabarb. ℥vj. tart. alb. ℥iv. sem. coriandr.
℥vj. rad. liquirit. limatur. chalyb. ana ℥iv. fol. co-
chlear. hortens. M. iv. colaturæ add. fermentum.

Cerevisiam ad Melancholiam.

℞. Fol. marrub. alb. m. iv. coq. in cerevis.
nov. cong. vj. ad cong. iv. cola & in doliolo sus-
pendatur saccul. seq. ℞. Rad. chin. nodos. pæon.
mar. ana ℥ij. polypod. ℥j. lapath. acut. ℥iij. ra-
phan. sylv. ℥. x. fol. ling. cervin. m. iij. summit.
hyperic. p. vj. cort. fraxin. ℥iv. bacc. junip. sem.
dauc. ana ℥j. rasur. stamni (in nodul.) ℥iv. ferri
rubiginos. ℔j. includ. omnia in saccul. &c. *Pil. de
lapide lazuli, flores salis armoniaci martiati,*
&c. sunt remedia proficua. Nescio an virescam-
phoræ, Regiæ societati a D.^{re} Kenier sesquianno
abhinc communicatæ, ad hos contumacissimos
affectus expurgandos ulterius tentatæ fuerint,
necne. Dosis in his casibus est ad semidrachmam
omni nocte, præmissis universalibus, & aliis re-
mediis cephalicis & alterantibus non penitus ne-
glectis. Philosoph. Transact. N. 400.

HYPOCHONDRIACA & HYSTERICA affectio .

Quæ secundus gradus Melancholiæ est.

*Huius
morbi
natura,
& dia-
gnosis.*

Art. 991. Quando humor atrabilarius , qui perinde est ac pars illa sanguinis , quæ dissipatis mobilioribus crassa , pinguis , atra & terrestris relinquitur , ab encephali vasibus ubi in Melancholia , aut Mania accumulabatur , ad viscera abdominalia transfertur , ibique hæret , tunc alio nomine morbus Hypochondriacus vocari solet , quia atra bilis magis densa atque tenax reddita eam , in primis abdominis regionem occupat , ubi hepar , lien , ventriculus , pancreas &c. locantur . Quare ponderis gravantis sensum , & anxietatem ægri circa hæc loca sentiunt , maxime ab assumptis cibo potuque , & anxietas adeo molesta est , ut ipso dolore intolerabilior quandoque adigit miseros , ut ærumnosæ vitæ pertæsi , violentas sibi manus inferant . Tum ex læsa digestionē , acida acrimonia , ex cibis male concoctis genita , famelicos facit ægros , qui tamen ab assumptis cibis , quam maxime gravantur ; Hoc cum eo Hippocratis congruit : *Neque sine cibo esse , neque copiosum cibum devoratum ferre potest . Verum cum jejunos fuerit , viscera mussitant , & saliva acescunt , quum vero quidquam aderit , pondus in visceribus &c.* Idem simul pallidum , flavum , immo & fuscum faciei colorem referunt , observante Aretæo : corporis quoque habitus in pejus labitur ; colore foedo ex atro viridique commixto tinguntur , nisi inferius bilis descendat , atque exeat , sed quoquoersum , per corpus cum sanguine diffundatur .

Sydenhami sententia.

Art. 992. Hipochondriaca & hysterica affectio est morbus frequentissimus; paucissimæ quidem sceminae vel viri sedentarii ab illo penitus immunes sunt; symptomata, aliorum pæne omnium morborum æmulatur; quamcunque enim corporis partem infederit, symptomata qualia ei parti competunt, statim producit. In capite: *Apoplexiam* facit, quæ similiter hemiplegia solvitur: Spasmos horrendos gignit *epilepsia* similes, paroxysmum hystericum proprie dictum faciens, vulgo *uteri strangulatum*: *Cephalalgiam* intolerabilem excitat, *clavus hystericus* nominatur, ut dolorem transverso pollice possis contegere: *Palpitationem cordis* præcipue *chlorosi* laborantibus concitat. Aliquando (sed rarius) pulmones obsidet, & *tussim* excitat fere continuam sine expectoratione. *Dolores colicos & iliacam passionem* nonnunquam æmulatur, & interdum *îltero* paroxysmus solvitur; hoc genus in sceminis laxiori corporis habitu præditis locum habet; de salute plerumque desperant. Paroxysmum *nephriticum* aliquando mentitur. In ventriculo *vomitum*, in intestinis *diarrhæam* efficit, sine dolore tamen. Partes externas non raro occupat dolore; præcipue in dorso, & aliquando tumore maxime cruribus & tibiis: tumores ab *Hydropicis* discriminantur, eo quod majores sint tempore matutino, & vestigium digiti impressi non retineant. *Dentes* etiam interdum afficiunt. Dolorem in dorso certo certius persentiscunt, quotquot hoc affectu tanguntur. Externarum partium *refrigeratio* his omnibus quasi viam sternit, & plerumque non nisi finito paroxysmo dispellitur. Adhuc in fere omnibus spirituum

Hypo-
chondri-
aca, &
hysteri-
ca affe-
ctio.

dejectiones & subsidentia, risus & lacrymae sine ulla προφάσει. Et postremo (quod tristissimum est) magis *animo* ægrotant quam *corpore* hoc modo afflicti. Urina limpida & magna quantitate excernitur, quod signum est *pathognomonicum*. Ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes, afficit, ut mercurio delibutos facile crederes. *Flatus nidorosos*, nunc *acidos* eructant, atrocissima *animi pathemata* in sinu foveant.

Causa. Art. 993. Causæ *procatarecticae* sunt vel vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius violentæ quædam *animi commotiones* a repentino aliquo sive iræ, sive doloris, & similium passionum insultu. Causa efficiens est *ἀνᾶξια* spirituum animalium. „ Secundum mentem quorundam pathemata, *vapores* vulgo dicta, alterutro, tanquam causa immediata, fundamenti niti, viz. *nimis titillante*, vel *molestiore* quædam *ineffabili sensatione* præter modum pariter illinc irritante, vel hinc vellicante; unde secretiones evadunt valde impares & male comparatæ. „

Indicatio curativa. Art. 994. Præcipua indicatio curativa sanguinis corroboracionem indigitat; ideoque post debitas *evacuaciones* (ubi indicantur) *chalybeatis*, *amaris*, *corroborantibus* & *volatilibus* cura perficienda est. Chalybeata foeminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducunt; in hoc casu exhibe *laudan. liquid.* guttas aliquot sing. nocte in *aq. aliqua hysterica*. *Aquæ minerales* omnes chalybis præparaciones longe superant. *Limaturæ ferri crudæ* in robustis corporibus cum majori fructu exhibentur, quam quævis præparatio. Aqua communis impregnata *ferreis clavibus* & *calceis equinis*, &c. medicamentosa evadit æque ac *aquæ minerales*. Inter bibendum *aquas ferreas*, si aliquod symptoma gravius

vius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis abstinendum, donec symptoma istud evanuerit: in earum usu ad sex septimanas ad minimum perseverandum est; *zingiber conditum*, & *semina carvi saccharata* ad ventriculum calefaciendum sunt subinde sumenda, *dam aquas* bibunt. *Theriaca Andromach.* & *vinum Hispanicum* multum laudantur. *Cortex Peruvianus* in hoc morbo eximias vires obtinet, præsertim foeminis, quæ spasmodis afficiuntur, ut & *dieta lactea* in *colica hysterica*. *Equitatio* usus est eximii. In paroxysmo ad foetida confugiendum est, quæ spiritus in ordines compellunt; quæcunque foetent huic intentioni inserviunt. In doloribus vehementioribus, vomitionibus, & diarrhoeis ad laudanum tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

Willisii sententia.

Art. 995. Hystericae affectionis signa sunt motus in imo ventre, ibidemque velut *globi* cujusdam ascensus; dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriorum distentio & murmur cum flatuum erudatione, respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita, præfocatio in gutture, vertigo, oculorum inversio aut rotatio, sæpe risus aut fletus, fabulatio absurda, quandoque *æqualis* & *æquiva* cum pulsu obscura aut nullo, aspectu cadaveroso, interdum motus convulsivi in facie & artubus, & nonnunquam in toto corpore.

Art. 996. Symptomata hujus morbi in viris sunt, quæ sequuntur: cardialgia, flatuum ingens proventus, rugitus ac crebra vomitio, in sinistro hypochondrio distentio, ac subtus *ventricul* pulsatio immanis sentitur, borborygmi & murmura. In *thorace* constrictio & angustia, ref-

Paroxysmi hystericae descriptio.

Symptomata in viris.

piratio difficilis, cordis tremor & palpitatio, spirituum deliquia. In capite dolores atrocissimi, scotomiæ, vertigines, vigiliæ pertinaces, cogitationum ætus & fluctuatio, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cuiusque formido & suspicio, morborum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, melancholia & mania, dolores vagi, spasmi, stupores, sudores nocturni, febres erraticæ, &c. sputatio sere continua. *Higlmorus* supponit præcipuam hujus morbi causam esse in vitiosa ventriculi constitutione.

Curatio.

Art. 997. Ad therapiam quod attinet, quoniam quamplurima symptomata sunt *convulsiva*, ideo constat remedia *antispasmodica* potissimum indicari. In paroxysmo *fœtida* interne atque externe valde profunt; nonnullis convenit in medio paroxysmo *aq. frigida* haustum, in qua *camphora* deflagavit, propinare. Extra paroxysmum *evacuationibus* necessariis factis, medicamenta vulgo *digestiva*, quæ ad ventriculi tonum ac fermentum spectant, locum habent: talia sunt *rin-tura sacra*, *elixir propriet. pulv. ari. comp. sal. absynth. cremor. tartar. vitriolat. vitriolum Martis*, &c., Inter digestiva & chalybeata pro certo emittunt virtutes *entis Veneris*; utcunque tamen, an sit revera *anodynum*, ut a quibusdam perhibetur, dubius hæreo; nondum enim satis compertum habui. Externe *fovus stomachici*; postremo ex medicamentis *chalybeat*is maximum juvamen sperandum est. Potus assiduus *coffee* aut *thee* paratus nonnullis emolumento fuit; *acidula* sere semper cum fructu sumuntur. *Ril. nostr. hyster.* in paroxysmo & extra; *℥. Facul. brion. ase fœtid. castor. ana ℥j. sal. coral. succin. Jovis ana ℥ss. galban. in aq. bryon. comp. solut. q. s. f. massa.*

Purcelli sententia.

Art. 998. Hysterica passio (inquit *Galenus*) *Hic as-*
 unum quidem est nomen, varia tamen & innu- *festus est*
 mera accidentia sub se comprehendit. Inter alia *morbo-*
 symptomata hoc morbo occurrentia perquam *rum le-*
 notabilis est sensus *frigoris*, quem percipiunt æ- *gio ?*
 græ per dorsum assurgentem & mox per univer-
 sum corpus diffusum; sequitur cephalalgia, &
 nonnunquam cordis palpitatio, & animi deli-
 quium, & deinde brevi sensim ad se redeunt:
 in aliis præterlapso frigore succedit insignis ca-
 lor, qui pleraque symptomata antedicta cum ali-
 quot novis accersit; interdum in initio paro-
 xysmi frigus est vix perceptibile, & tunc sym-
 ptomata graviora non nisi postaccessum caloris
 tragediam agunt. Propter diaphragmatis & mu-
 sculorum respirationi inservientium violentum
 ac perpetuum spasmus sceminæ hystericæ quan-
 doque diutissime procumbunt instar mortuarum
 sine (sensibili) respiratione, immo interdum per
 integrum diem & diutius. Probe animadverten-
 dum est hunc morbum ire & redire, & suos ha-
 bere paroxysmos, etiam si non certis ac statis pe-
 riodis recurrentes, sicut febrium intermitten-
 tium.

Art. 999. Causa primaria hujus affectus sunt *Causæ ?*
cruditates & coctiones vitiosæ, quæ plerumque an-
 te adventum paroxysmi in ventriculo gravedi-
 nem ac perturbationem, in intestinis murmura
 ac borborygmos pariunt, unde producitur spi-
 rituum *ἀναξία*, quæ est *causa proxima* reliquorum
 symptomatum; *causæ remotiores* ex errore aliquo
 circa sex res non naturales suboriuntur.

Art. 1000. Ad therapiam rite instituendam ac- *Methodus the-*
 curate distinguendum est medico de constitutio- *rapentia-*
ca.

ne patientis, an sit sanguinea & biliosa, vel pituitosa ac melancholica, & etiam de cruditatis peculiari genio, utrum sanguinis crasin nimis viscidam & glutinosam reddit, aut nimis laxam & ebullitionibus proclivem. Affectionum Hystericarum cura huic fundamento maxime innititur: ex his etenim inter se plane discrepantibus oriuntur indicationes longe a se invicem diversæ. Sensatio frigoris in dorso, item pulsus debilis & tardus, sanguinis lentorem arguunt: pulsus celerior, calor ingens frigus excipiens, odor moschi, zibethi, ambræ, paroxysmum accersens, statum sanguinis esse laxiorem, & fermentisibilem indicant.

Curatio. Art. 1001. E paroxysmo excitandæ sunt, naribus *volatilia & fetida* admovendo, *plantas pedum trillando* (experimentum est *Dolai*) & in graviori casu *apoplectico* scilicet, *punctionibus, scarificationibus, vesicantibus, ustionibus, sartagine calefacta*, &c. sunt suscitandæ. Iis, quarum sanguis est viscosus & nimis tenax, convenit *venesectio*, & postmodum vel die sequenti *emeticum*, vel, si minus congruum judicatur, *catharticum*; his ita præmissis, ad *attenuantia & aperitiva* accedendum est; & hic apprime conducunt juscula ovin. vel gallin. cum *radicibus & herbis aperitivis, & rubigine ferri* (in nodul. ligat.) incoct. (vel, si ob ferrum incoctum ventriculus nauseat, forsan non erit minus efficax, si singulis auro-
ris post medicamentum aliquod *chalybeatum* assumptum superhauriatur cratillus istiusmodi jusculi.) Potus quotidianus sit *vinum Gallicum* aqua dilutum cum gut. xx. vel xxx. sp. sequent.; *℞. Sat volat. oleos. ℥iij. sp. lavend. ℥j. m.* In hoc affectu nullum remedium efficacius datur quam *radix hellebori* vel ejus *extractum*. Constat ex sola usu *elect. chalybeat. seq.* (℞. *Cort. Peruvian.*
pul-

pulveris. 3ß. coral. rub. ocul. cancr. præp. ana ʒiij. ferr. rubiginos. ʒiijß. sal. absynth. ʒij. cum q. s. syr. absynth. f. electuarium) Fœminas quamplurimas Hystericas curatas esse. In altera crasi, ubi sanguis est nimis laxus & ebulliens, indicantur remedia calorem temperantia; venesectio, emulsiones, cortex Peruvianus, aq. Tunbrigenses, Bathonienses, jussulum cancrorum fluviatilium, &c. Accuratam sane horum affectuum historicam symptomatum ætiologiam nobis dedit laudatus auctor in tractatu suo eleganti *de hysteria*, idiomate vernaculo conscripto.

Etzmulleri sententia.

Art. 1002. Malum Hypochondriacum est affectus ex multis symptomatibus diversimode complicatus, a cruditate acida plus minus viscida in primis viis natus; cujus eminentior gradus vocari solet *scorbutus*. Inter signa primaria frequentia sunt eminentiora, viz. adsunt pathemata stomachi non rite digerentis cum symptomatibus circa abdomen, cum torminibus & flatibus intestinorum, alvi obstructione, corporis perturbatione, &c. Sed non omnia in omnibus; ordinario motiones, & plus minus dolores, murmurationes, distentiones, & aliæ abdominis affectiones, cum præcordiorum angustia, & respirationis difficultate, flatibus & scotomatibus, vel vertiginosa affectione rationem formalem constituunt. Est affectus quidem complicatissimus; tres fere gradus paroxysmi statuuntur, viz. primo dum *respiratio est libera*. 2º. Quando *hec impedita*, & *pulsus* fere cessat. 3º. Quando etiam *convulsiones* superveniunt.

Art. 1003. Emplastrum egalbano cum aliquot granis *zibethi* umbilico apponi debet; *zibethum*

*Mali hy.
pochon-
driaci.
sympto-
mata
præci-
pua.*

Cura.

enim umbilico illitum suffocationes Hystericas insigniter alleviat, modo non nares nimium feriat. *Enemata* conducunt ex *carminantibus cum ol. succini & salibus volatilibus*; item ex *urina sani*; ut & *clysmata terebynthinata*. *Misturæ ex salibus volat. cum castor. & opiatīs* optime paroxysmum sedant; conducunt etiam *trōchisci de myrrh. stercus equi maris* est remedium nulli cedens; *succus ejus cum vino*, vel *decoctum* propinatum expectando sudorem est incomparabile in vel extraparoxyfimum; *fuligo furni splendens* est medicamentum pro pauperibus; item *flores sulph. cum N. M. & theriaca* in vino solut. cum additione *castor*. In graviore malo exhibere soleo potionem seq. teterriimi quidem saporis; sed præsentanei effectus; *℞. Aq. mentha flor. sambuc. matricar. ana ℥j. essent. castor. ℥i℥. ad ℥ij. sal. volat. C. C. gr. xij. succin. gr. viij. landan. hyster. ℥℥. syr. e cort. aurant. ℥℥. m.* capiatuꝝ expectando sudorem. In specie *sclarea* (horminum hortense) vel ejus decoctum est experimentum singulare paucis notum in suffocatione.

Louveri sententia:

Bouli-
mia.

Art. 1004. Melancholia Hypochondriaca affecti humore salino in ventriculo deposito magna *boulimia* sæpissime tentantur, & quamdiu appetitus iste durat, ab omni dolore corporis immunes sunt; humore vero isto acri & ferino; metastasi quasi facta, in alias corporis partes deposito, cruciatus & spasmi ciuntur; interea etiam ut ventriculi appetitus omnis & digestio propter defectum ejus penitus flaccescat; quod Hypochondriacis fere omnibus solemne est, atque malæ sanguinis diathesi, potius quam lienis vitio; proxime imputari debet. De corde p. 147.

Scor-

Scardone sententia.

Art. 1005. Si res mihi sit, cum ægro laxioris habitus, temperamenti, ut ajunt, frigidi, inappetentia insigni laborante sine febre, atque hypochondriorum æstu; contentus sum salibus lixiviosis: absynth. centaur. min. agrimon. vel tart. solub. terra fol. tart. tartar. vitriol. a ℥ij. ad ℥j. ex jusculo junioris pulli propinandis ad multos dies.

*In habi-
tu cor-
poris la-
xo.*

Art. 1006. Si præpollentis acidi indicia se prodant (sunt autem acuta fames; ventriculi mor-
sus; rerum insuetarum, & incongruarum appetitus; ructus acidum spirantes) pulv. VVedelii absorbente, dempto eidem vitriolo ad ℥ sem. uti expedit.

*Ubi in-
dicia
acidi
assunt.*

Art. 1007. Alterutrum horum adhibeam; le-
vem infusionem rhabarbari quolibet tertio, vel quarto die exhibeo in hunc fere modum paratam. ℥. Rhab. elect. in taleol. incis. ℥ij. tart. vitriol. vel solub. ℥j. m. infund. per 24. hor. super ciner. calid. in aq. font. unc. vj. coletur postea, & liquor leniter exprimatur. Colaturæ addatur Syrup. flor. persicor. unc. j. pro una vice, & sic pro aliis.

*Rhabar-
barum.*

Primo vere succis optime depuratis Fumar. fench. agrimon. taraxaci ad unc. iij. ex jusculo junioris pulli uti præstat. Hisce martialia succedant. Si acidum mucosis quilibet, prævaleat, limatura martis super lapid. porphyrit. levig. a gr. x. ad xv. ex succo concreto absynth. aut ejusdem conserva per viginti circiter dies adhibenda.

Art. 1008. Si mucus iners prædominetur, tinctura martis aceto aut succo alio acido extracta a ℥ sem. ad ℥j. ex decoct. theiformi absynth. uti expedit. Sicuti salium digestivorum, ita succo-
rum,

*i m-
is iners
vigeat.*

rum, & martialium ufui rhabarbari usus intermiscendus. Prævalente muco inertī pillulæ tartareæ *Bontii* a ℥j. ad ℥ sem. vel tartareæ *Schroederi*, *Quercetani*, & aliæ fimiles ante coenam, viſæ ſunt convenire, dummodo ad immodicum hæmorrhoidum fluxum proclives non ſint ægri. Celebres enim ſunt apud Hollandos pillulæ illæ *Bontii*, quarum hæc fere descriptio eſt. ʒ. aloes ſuccotr. ℥iij. gumm. ammoniac. ℥j. ſem. tart. vitriol. ℥ ſem. m. f. ſ. a. maſſa pillul.

*Acidulas
juvant.*

Art. 1009. Opportuno tempore ad aquas acidulas, tandem ad lac primum aſininum, mox vaccinum deveniendum. Cibi ſimplices ſint, ab acidis, a vino æger abſtineat. A paſtu tinctur. abſynth. ex decoct. Caffè, aut ejuſdem conſervam ante cibum aſſumat.

*Inhibi-
tu or-
poris
ſiccō*

Art. 1010. Si æger ſiccioris, & calidioris ſit habitus cum hypochondriorum æſtu, tenſione, pulſus duritie, febre, ſolo oleo amygdal. dulc. & clyſteribus ex aqua hordei, cum ſaccharo contentus ſum. Primo vere ſucci optime depurati portulac. cichor. endiv. fumar. vel ſerum lactis, cum iisdem plantis deſtillatum viſa ſunt convenire. Æſtuoſa tempeſtate ad balnea aquæ dulcis, aquas Villenſes, Nucerianas, vel acidulas deveniendum, tandem ad lac.

Farrago ſententiarum.

*Pruden-
tia opis
eſt in
medicō.*

Art. 1011. Morbi longi, teſte *Platone in Ti-
meo*, blandiſſime tractari expetunt, non vehe-
mentioribus irritari. „ Mens ipſa ægroti fre-
„ quentiſſime adeo inſigniter afficitur in hoc
„ morbo, ut ſæpius cogatur medicus aliquid ad-
„ mittere, quod jubent *conſuetudo*, *opinio vul-*
„ *gi*, *ſuperſtitio præjudiciaria*, quod tamen ſana
„ ratio e contra vetat. „

Art.

Art. 1012. Mulieres hystericæ sensum quemdam frigoris in vertice capitis pati solent, est-
que hoc præcipuum hysteriæ diagnosticon. *Bas-
glivus.* *Diagno-
sticon
singula-
re.*

Art. 1013. *Bezoardicum Joviale* est præstantissi-
mum remedium & infallibile in affectibus hy-
stERICIS, ut pluries mirati sumus. *Idem.* *Bezoar-
ticum
Joviale.*

Art. 1014. In affectionibus hypochondriacis
vomitus est ante omnia provocandus; sic enim
tomes subtrahitur morbo, & revera est basis cu-
ræ. *Pitcarn. in MS.* In hoc consentientem ha-
bemus doctissimum D. *Vwoodvard*, mihi ami-
cissimum. *Emetico-
rum ef-
ficacia.*

Art. 1015. Remedia sequentia quamplurimis
indicationibus satisfaciunt, si quis cognoverit
uti. *Aurum Mosaicum*, *cerevisis. hysteric. Fulleri.*
Chalybs sine acid. Batean. Decoctum nigrum (*Art.*
48.) *elect. hysteric. elect. Peruv. epileptic. & enem.*
hysteric. Fulleri. *Ens Vener. flor. sal. armoniac.*
martiat. Infusum amarum sequens *℥. cort. Pe-
rov. crasse pulv. ℥ij. tart. alb. ℥ij. Rad. serpent. vir-
gin. ℥iss. infund. frigide in vin. rub. ℔ij. coletur
usus tempore. Infus. chalybeat. amar. (Art. 132.)*
*Mistura ecphrastica, julap. camphorat. mistura hy-
stERIC. spirituos. & pil. hysteric. Fulleri.* *Pulvis ad
guttetam, pulv. hysteric. Bat. sal. Jovis, tinctur.*
*epileptic. Fuller. sp. C. C. succinat. tartarum vitriola-
rum, vitriolum Martis &c.* *Remedia
varia.*

Art. 1016. Quando homo hystericus, vel hy-
pochondriacus ira excandescit, vel quavis de
causa vehementer contristatur, mox ejus orga-
norum motrices fibræ turbantur, plurimaque
pars naturalium munerum pervertitur, ægri
hinc pessima sibi ominantur, & recuperandæ
salutis spem protinus abjiciunt, urinam lympi-
dissimam reddunt, in gravidis abortus sequitur,
atque inde raptus ad cerebrum, unde apoplexia
in *Præci-
pua mor-
bi sym-
ptomata.*

in paralyſim deſinens, in aliis convulſiones epilepticæ accedunt, quæ vulgo *ſtrangulatus*; vel *matricis ſuffocationes* dicuntur. Aliquando morbus externa capitis occupat, ubi in parvo ſpatio vix pollicem excedente acutiſſimus dolor exoritur, *Clavus hyſtericus* dictus, & ſi forte ad pulmones vergat tuſſim facit moleſiſſimam, quæ proprie *tuſſis hyſterica* dici debet. Tranſeunte morbo ad ventrem colica hyſterica prodiſt, & ubi habitum externum corporis occupat dolores cum vel ſine tumore in mandibulis, brachiis, manibus, femoribus, & cruribus exſurgunt, ſed in cruribus ſæpiſſime tumores ferme hydropici apparent, qui tamen ab eis diſtinguuntur, quia mane creſcunt, & unum tantum crus tenent altero immuni relicto. Ceterum ex doloribus nullus frequentior, & pertinacior eſt, quam qui dorſum exercet, aſt omnes huiusmodi dolores id commune habent, quod veſtium leviſſimos quoſque attactus dedignentur a quibus perinde irritantur, ac ſi caro verberibus mulſata fuiſſet.

Curatio
nis me-
thodis
pro hypo-
chon-
driacis.

Art. 1017. Quoad genericam huius morbi curationem, ſi ſatis temporis divexarit, ut merito ſuſpicari liceat, humores corporis corrupiſſe, jubenda erit phlebotomia, atque inde purgatio, priuſquam animus intendatur organicis partibus robur, & fluidis aptam mobilitatem conciliandi, quibus ſecunda valetudo reſtituetur. Si vero dolores, vomitus, & diarrhææ vehementer excruciantes dilationem hanc non perferant, incipiendum erit ab anodyno, quemadmodum Laudanum liquidum eſt, ſequenti ratione concinnatum.

Lauda-
num li-
quidum.

℞. Vin. Hiſpan. lib. j. opii unc. ij. croc. unc. j. cinamom. caryophyl. ana ℥j. inſund. in M.B. per duos treſve dies quouſque liquor congruam conſiſtent. adipiſcatur. Poſtea filtrat. ſervetur uſui. Huius quædam

dam gutt. cum aquæ cinamomi cochleare propinantur.

Post venam in brachio sectam postridie dabitur purgans elapsis duobus, vel tribus diebus reiterandum, nec hujus molestiæ priora mala gravantes, agrum deterrere debent, cum id a purgantibus, ea ipsa die qua sumuntur præstari soleat, utilitate levaminis diebus subsequenti-
bus emergente. Post catharsin remedia martialia usurpanda veniunt, triginta fere diebus continuanda, quo tempore nullum aliud purgans, adhibetur, quod omnes calybis effectus infringeret, atque demum ad hysterica spiritus confortantia deveniendum est.

Art. 1018. Ast methodus qua mulier hysterica curari debet, ex gr. hujusmodi est. Octo circiter sanguinis unciiis extractis, ejus umbilico emplastrum applicatur ex galban. unc. iij. tinct. castorei dissoluto cui add. gumm. tacamach. ʒij. Postridie mane quatuorumat. pillul. ejusmodi.

℞. *Pillul. cochiar. maj.* ʒij. *castor. putr.* gr. ij. *bal-sam. peruv. gutt.* iij. *reform. pillul.* xij. quarum iv. singulo biduo capi debent, eisdem superdormiendo.

Si animi deliquia, aut languores accesserint quatuor, vel quinque cochlearia sequentis julapii propinabuntur. ℞. *Aq. rutæ unc.* iv. *bryon. compos. unc.* ij. *castor. in nodulo suspens.* ʒ sem. *sacchar. finit q. s. f. julap. in cujus priori dosi si occasio urgeat effundimus sp. C. C. gutt.* xx.

Post descriptas purgantes pillulas, capiat de sequentibus quotidie mane duas, totidemque quinque horis a prandio, per triginta dies, vini absynthiti cyathum superbibendo. Modo dictæ pillulæ parantur ex *Limat. calyb. gr.* viij. *extract. absynth. q. s.* Si vero easdem lubeat forma bolli comparare; ℞. *Conser. absynth. roman. cor-*
sic.

*Hystere-
carum
curatio.*

*Pillulæ
purgan-
tes.*

Julapium

Pilula tic. aurant. ana unc. j. rad. angel. condit. nuc. moscat. alia. condit. theriac. andromac. ana unc. sem. gingiber. condit. Zij. syrup. limon. vel aurantior. q. s. f. Electuarium. ℥. de hoc electuar. Zij. limat. calyb. gr. viij. syrupi aurant. q. s. reform. bullus mane, & vespere ingerendus, superbibendo vini absynth. cyathum vel vj. cochlearia sequentis infusionis. ℥. rad. angelic. enul. campan. imperator. ana unc. j. Infusio. fol. absynth. vulg. centaur. min. marthub. alb. chamedr. ana man. j. cortic. 2. aurant. infus. in vin. hispan. ad duorum digit. supereminentiam; colatura servetur usui.

Pulvis. Art. 1019. Pro delicatulis autem sequenti ratione calybs præparari poterit. ℥. Limat. ferr. subtiliss. pulv. unc. j. pulv. aron. compos. Zvj. semina coriand. anis. fœnicul. ana unc. sem. cinam. opt. corall. rub. pp. ana Zij. nucis myrrist. Zij. f. pulv. tenuiss. cui add. sacchar. fin. ad pondus omnium. Hujus pulveris ægra sumat 3 sem. bis in die per quadriduum, deinde 3j. per 40. dies superbibendo vini absynth. cochlearia vj. vel de sequenti Julapio.

Julapiū. ℥. Aq. lact. alexiter. lib. j. aq. gentian. compos. unc. iv. absynth. compos. unc. ij. sacchar. alb. q. s. f. Julap.

Aliud. ℥. Vin. rhenan. absynthiij lib. sem. aq. gentian. compos. unc. ij. syrup. oxallidis unc. j. f. julap. ut prius adhibendum.

Pilula. Quousque hæc curatio perennat, utatur ægra pilulis sequentibus: ℥. Myrrh. elect. galban. as. fœtid. ana 3j. castor. 3 sem. bals. peruv. q. s. m. & de singula drachma reformatur pillul. xij. singula nocte ad dosin iij. ingerendæ, superbibendo cochlearia tria, vel quatuor aq. bryoniæ compos. Quod si eadem ob commixta gummata alvum moverint, sequentes pro eis adhiberi poterunt.

Pilula alia. ℥. Castor. 3j. sal. volat. succin. 3 sem. extract.

ruta q. s. f. pil. xxiv. quarum tres singula nocte devoret ægra superbibendo tria, vel quatuor cochlearia julapii cujusdam hysterici, vel de supra descriptis.

Art. 1020. In hac affectione convenit etiam spir. C. C. gutt. xvj. vel xvij. una cum aq. quadam convenienti subinde propinare, quæ si hujusmodi remediis non cedat, ad alia transeundum est.

℞. Trochisc. myrrh. pulv. ℥j. balsam. sulph. terebinth. gutt. iv. gum. ammoniac. solut. q. s. m. f. pilul. iv. mane & vespere sumende, superbibendo quatuor, vel quinque cochlearia julapii cujusvis hysterici add. spir. C. C. gutt. ij. *pilula alia.*

Art. 1021. In hujusmodi morbis antiscorbutica etiam optime faciunt, idcirco sequens addimus electuarium. ℞. Conf. cochlearie unc. ij. jub. unc. j. pulv. ari compos. ℥vj. syrup. aurant. q. s. f. elect. ad avellan. magnit. mane 5. hor. a prand. & vespere devorandum, superbibendo aq. raphan. compos. cochl. vj. vel tantundem de sequenti. ℞. Rad. raphan. sylv. concis. lib. ij. rad. ari lib. j. fol. cochl. hortens. man. viij. fol. menth. salv. nasturt. aq. beccabung. ana man. j. sem. cochl. hortens. contus. lib. sem. nuc. moscat. unc. sem. vin. alb. lib. xij. destil. omnia cum eductione lib. vj. & servetur usui, Vel destill. fol. cochlear. hortens. recent. aqua inde comparata servetur usui. *Electuarium.*

Art. 1022. In potu ordinario tria, vel quatuor cochlearia sequentis mixturæ addere licebit. ℞. Rad. raphan. sylv. sem. cochl. hort. ana unc. sem. fol. cochlear. ejusdem man. ij. pulv. malz aurant. misc. in mortario sensim affundendo vini albi lib. sem. deinde trajecta cum levi expressione mixtura, eadem servetur usui. *Aqua composita.*

Art. 1023. Non obstante tantorum remediorum usu, si affectio adhuc permaneat, aquæ mine-

minerales sulphuræ, vel calybeata consulendæ sunt, ex quibus si triste aliquod symptoma exsurgat, quod merito eisdem tribui possit, eoque inhibebuntur, donec idem conquiescat. Ceterum harum aquarum usus sex saltem hebdomadis continuandus commendabitur, atque interea stomachum corroborandi gratia, dabitur ægræ subinde ingerendum vel Zinzib. conditum; vel Carvi semina saccharo obducta. Decem prioribus diebus juvabit ei tres pillulas hystericas sub noctis ingressum quotidie devorandas exhibere, superbibendo quatuor, vel quinque cochlearia Julapii cujusdam hysterici. Quantum ad aquas sulphureas necesse erit easdem singulo bi-duo sub forma balnei usurpare, continuando hujusmodi praxin, vel per duos menses, vel per sex saltem hebdomadas.

Art. 1024. Si ex calybis usu corpus nimium incalescat, post singulum quatrimum mane dabuntur lib. iv. aquæ cujuslibet Mineralis purgativæ, cujus opæ minori molestia alvus laxabitur, ac remediis ex Pharmacopea mutuatis præstari solet. Si vero graviora incommoda calybs afferat, eadem Laudano liquido cum hysterica quavis aqua propinato compescenda erunt.

Art. 1025. Viribus a morbi diuturnitate exinanitis curatio a phlebotomia, aut alvi purgatione nequaquam exordietur, sed ab ipso calybe; & ubi symptomata mitiora occurrant, satis erit post institutam phlebotomiam ventrem in triduum, vel quatrimum laxare, ut inde mane, & vespere pillulæ hystericae per decem dies utilius usurpari possint.

Art. 1026. Vehementi dolore quovis excruciante, in Vomitibus & diarrhœis enormioribus Laudanum primo jubebitur, deinde operabitur, ut spiritus confirmetur; & si vires per-

mit-

mittent vena pertusa, laxativum aliquod ante Laudanum propinabitur, iis in primis foeminis, quæ robusto temperamento sanguineoque pol-
lent. In debilioribus autem satis erit paululum a paroxysmo leviori aliquo Emetico stomachum levare, inde largam Theriacæ vel Orvietani do-
sin jubere, cui superbibendus erit liquor aliquis spirituosus, una cum paucis Laudano liquido mixtus; sed si vomitus diu perseveraverit omis-
so emetico statim ad Laudanum confugietur.

Symptomatibus jam superatis per aliquot dies mane, & vespere Laudani usus continuabitur, hæc duo maxima diligentia observando: 1^{um}. nempe, quod semel adhibito ab evacuationibus laudano, eodem remedio, eademque ejus dosi continuandum erit usque ad omnimodam sym-
ptomatum evanescentiam; 2^{um}. quod laudani usus motuum perturbatorum compositionem præ-
stans nulla evacuantia, ne quidem simpliciores Clysteres perfert, a quibus cavendum erit.

Art. 1027. Ceterum frequens Theriacæ An- *Quædã
alia re-
media.*
dromaci usus diu continuatus in hujusmodi af-
fectionibus eximie quidem est virtutis æque acce-
teris in morbis omnibus, qui a nativi caloris de-
bilitate ac concoctionis infirmitate profiscun-
tur.

Vinum etiam Hispanicum in quo infunditur Gentiana, Angelica, Absynthium, Cantau-
rium, Cortic. Aurant. similiaque corroborantia plurimum in hujusmodi morbis prodest, quan-
do ejus nonnulla cochlearia ter in die sumun-
tur, dummodo ægræ temperamentum, nec de-
bile, nec biliosum videatur.

Art. 1028. In Convulsionibus hystericis, quæ periodice invadunt, Cortex Peruvianus ad quan-
tatem ℥j. mane, & vespere sumptus per ali-
quot hebdomadas mirifice convenit.

Art. 1029. Debiliores vero, & delicatulae diætæ lactea uti possunt, maxime si a Colica hysterica sæpe exerceantur, modo ea omnia incommoda perferre possint, quæ primis hujusce diætæ diebus superveniunt; cum sæpe lac in stomacho coaguletur, aut alimentum valde tenue vires, ut par est, haud refocillans ministret.

Art. 1030. Ceterum nihil magis sanguinem depurat, & solidis, spiritibusque nihil magis roboris tribuit, quam equo vehi, & hujusmodi exercitium per aerem salubrem diutius protrahere, pro quo itinera in curru commode substitui possunt.

Art. 1031. Quodsi hysterica, vel hypochondriaca passio nimis evacuationibus, vel menstruum aut hæmorrhoidum fluxui immodico superveniat, tali casu, vitæ regimine paulo incrassante instituto, propinanda est libra dimidia ter in die sequenti Potus. ℥. *Aq. plant. Vini rub. ana q. v. & Sacchar. fini q. s. bull. ad consumpt. tertiae partis* atque utile simul est si ægra subinde julapio quodam hysterico minori & parva dosi utatur. Ad erigendos spiritus satis est galbanum, assamque foetidam ana ℥ij. cum castor. ℥j. & sem. sal. volat. succin. 3 sem. m. naribus admove, vel sp. sal. Armoniac. ℥ij. tantum.

Art. 1032. Quando de inhibendo agitur fluxu menstruo, eductis octo sang. unc. a brachio, atque postridie exhibito pro ægræ viribus cathartico, ejus lumbis applicabitur Emplastrum. ℥. Empl. Diapalm. pro Herniis ana q. s., indeque sequens electuarium inter utiliora habebitur.

Electuarium. ℥. *Cons. ros. exsicc. unc. ij. trochisc. terr. lemn. ℥j. s. cortic. Granat. corall. rubr. ana ℥ij. Lapid. Hematit. sang. dracon. bol. armen. ana ℥j. Syrup. coral. simpl. q. s. m. f. Electuarium*, de quo capiat ægra,

ægra, magnitud. nucis moscatae mane, at quinta hora post prandium, superbibendo sex cochlearia sequentis julapii.

℞. Aq. centinod. Plantag. ana unc. iiij. Aq. cinamom. hordei, syrup. ros. sicc. ana unc. j. sp. *Julapium.*
vin. q. s. ad gratam aciditatem. M.

Utiliter etiam ter, vel quater in die ad vj. unc. dosin propinari potest succus express. fœnicul. plantag. vel urticæ, indeque clarificatus.

Ceterum quoad usum purgantium, eadem quovis elapso biduo, vel triduo utiliter reiterantur usque ad tertiam vicem, interposito subinde Paregorico ex Syrup. Diacodii ad unc. j.

Art. 1033. Si Hysterica passio ab uteri prolapsu fuerit post difficiliorem partum, tunc sequens remedium usurpabitur. ℞. Cortic. querc. *Torus.*
unc. ij. aq. font. lib. iiij. coq. ad tertia partis absorptionem; dein add. cortic. granat. contus. unc. j. Ros. rubr. flor. granat. ana man. ij. Vini rubri lib. sem. colatura partes affectæ pannis laneis foventur; mane bihorio antequam e lecto ægra surgat, & vespere postquam decubuit; sicque continuatur usque ad integram symptomatum cessationem.

Art. 1034. Præter remedia huc usque recensita, nonnulli pro hypochondriacis Gallum celebrant longævum, & radicibus aperitivis infarctum; ut Cort. Cappar. Tamarisc. fol. fumar. Bugloss. scolopend. cum herbis capillaribus, addendo Uvas & femin. Anis. & coriad. & post coctionem jus exprimitur, trifariam dividendum, cuius priori parti infunduntur Sennæ mundat. ʒij. *Remedia pro hypochondriacis.*
fem. salis Vegetabil. ʒj., reliquis duabus adduntur tantum Salis CrySTALL. Tartar. ʒj. vel ij. prior dosi mane stomacho jejuno propinatur, post trihorium altera, vespere demum tertia. *Jus aperitivum.*

Art. 1035. Si causa morbifica difficulter, valde, subigi potest, aperitiva purgantibus mixta egre-

gie opitulantur, & pro visiosis aciditatibus edo-
mandis alkalina sunt invehenda ex. gr. ℥. Syrup.
mart. aperitiv. unc. j. sem. cass. mundat. unc. j. rhab.
pul. ℥ij. sal. Polychr. ℥j. Dissolvantur omnia in
cyatho Decoct. ex rad. aperitiv. Vel ℥. sennæ,
Rhabarb tart. solub. martiat. ana ℥j. resin. Jalap.
gr. jv. f. pulv. & cum conser. flor. Bugloss. f. bol.
Vel hæceadem pulvis cum Ptisana rad. aperitiv.
propinetur.

Art. 1036. In Colica aliisque internis convul-
sionibus ol. amygdal. dulcium, unctuosique ac
pingues clysteres plurimum conferunt, tum et-
iam juvat, si mox post clysteres purgantia le-
niora jubeantur, quæ efficaciora reddi poterunt
addito Tart. solub. Emetico. Sæpe vero prom-
ptius levamen a China China obtinetur eadem
dosi adhibita, quæ in intermittentibus febribus
usuvenit. Vel ℥. Rhabarb. ℥ij. Pulv. Hieræ
amar. unc. sem. Semin. Anif. ℥ sem. Vin. alb.
unc. xiv. Inf. in loco calid. per hor. 24., & fil-
tratus liquor quadrifariam dividatur, totidem die-
bus mane ingerendus.

Art. 1037. Ut autem humorum corruptio vi-
tetur, quam morbi diuturnitas in corpus in-
vehit, nihil efficacius habetur præparationibus
ex Myrrha, & Aloe, quarum duo hic exempla-
ria subnectimus.

Elixir
antehy-
stemicum. ℥. Aloes Hepatic. Myrrh. ana unc. j. Croc.
orient. unc. sem. contus. & mixtis superafund. spir.
vin. spir. sulph. ana unc. j. digerant. in fimo per
octo dies vase probe clauso, quo deinde aperto su-
perafund. sp. vin. suffic. quantitas, donec per sex
transversos digitos pulveribus supereminet. obiecto
iterum vase continuetur infusio in loco calido per
duos menses. Filtrata tinctur. tertia pars sp. vin.
destillando ab ea extrahatur, tum residuo adda-
tur sp. sulph. tertium de toto, nec adhibendus li-
quer.

quor nisi post ultimam hanc additionem octiduo elapso.

℞. Aloes Myrrh. ana unc. j. croc. unc. sem. con- Aliad
tus. & commixt. cum aq. Cinamom. injectis in re- Elixir
tortam digerant. per 15. dies in fimo, postea aptato
recipiente ad ignem arenæ tertii gradus fiat destil-
latio. Tum cohobato liquore per tres vices, obtine-
bitur demum Aqua instar serilactis albicans, si-
mulque spirituosissima.

Horum elixirium dosis est a gutt. vj. usque
ad gutt. xij. ex meri cochleare vel cujusvis alius
Cardiaci liquoris.

MEMORIA LÆSA.

Art. 1038. Inter omnes animæ humanæ fa- Mem-
cultates, ne una quidem tanta difficultate, & ria & te-
molestia philosophorum animos exercuit ac Me- logia.
morie etiologia. Non pauci sunt, qui opinantur
istam facultatem constitui ex repositorio varia-
rum idearum sensibilibum oblata occasione primi-
tus collectarum, & in cerebro cum signaturis qui-
busdam ordinate depositarum, unde ad usus fu-
turos tanquam ex promptuario ad libitum evo-
cantur: sed duæ admodum graves obtrundunt
difficultates, nimirum, in tanta rerum accumu-
latione, quomodo fieri potest, ut aliæ minus ob-
literentur, & confundantur; & quo artificio
mens ipsa ex adeo grandi idearum multitudine
illas præcipue expergefaceret, & compellare po-
test cæteris silentibus, quas singularis usque usus
pro varia rerum exigentia exquisitè postulat.
Exclamandum sit necesse est *Plasmatio nostra*
mira est, & mirabile opificium corporis nostri!
Prodigiosæ fuerunt in omni ævo quorundam ho-
minum memoria, v.g. Senecæ. Portii Latronis,

Cyni Regis; nostratum quoque Reynoldi Episcopi,
Ewallisii &c.

Sennerti sententia.

Memoria laesa. Art. 1039. Memoria laesa exempla notabilia apud authores passim occurrunt. Christophorus a Vega refert Franciscanum quemdam ex acuta febre ita memoriam amisisse, ut, etsi prius peritus esset theologus, postea nec literas agnosceret, & neque nomina rerum, quæ sibi assidue in usu erant, memoria teneret.

Intemperies cerebri. Art. 1040. Si intemperies cerebri sit frigida, & humida, somnus est longus, & profundus; si humida tantum, est longus sed non profundus; si frigida tantum, moderate somnolenti sunt; si frigida & sicca, non sunt somnolenti. Si absque causa externa memoria subito lædatur; imminentis apoplexie, epilepsie, aut paralyseos est indicium, si homini alias sano id accidat. Difficulter curatur, quæ a malignis morbis, venenis, aut philteris ortum habet.

Cura. Art. 1041. Anacardium tanquam specificum decantatur, & revera interdum egregios edit effectus, sed ejus usus periculo haud vacat. (vid. locum, in Raii hist. plant.) Abstinentum est a carne porcina, anatrina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus, lacte, caseo, leguminibus, brassica, lactuca, papavere, fructibus horæis, & quæ vaporosa sunt, crassæ substantiæ, & coctu difficilia; vinum moderate sumatur, aer sit tenuis, cerevisia pura, corpus exerceatur moderatis laboribus, somnus non mox a cibis ineatur, vitetur diurnus, noctuque sit moderatus, fugiat mœstitiam & animi solitudinem, & ad lætitiâ disponatur, a venere absteineat.

Hoc

Hoc in casu in usum revocantur hæc & similia ;
Rad. peon. mar. zedoar. valerian. maj. flores tilia ,
lilior. convul. primul. veris , rad. calam. aromat. sem.
sinap. sp. diamb. sine odoratis , sp. lavendul. castor.
ambra grisea , ol. cinnamomi , &c.

Ettmulleri sententia.

Art. 1042. Tantum saltem scimus, quantum *Tantum*
 memoria comprehendimus, & cum judicio pon- *scimus*
 deramus, & applicamus. Certum est cerebrum *quantū*
 esse memoriæ subjectum radicale, quomodo au- *memo-*
 tem fiat, nescio. Venus nimia memoria debi- *ria tene-*
 litat, maxime in senibus. *mus.*

Art. 1043. *Cubeba* N. iij. mane jejuno stoma- *Curatio.*
 cho comestæ insigniter acuunt ingenium, &
 memoriam; *ambra* est omnium optima medicina
 in firmandis viribus animalibus, & roboranda
 memoria, omnibusque mentis actionibus, adeo
 ut nihil æque fulciat senes labascentes; elegan-
 tissima est tinctura cephalica ex granis *chermes,*
 & *ambra cum spiritu lilior. convul. &c.* Sed notan-
 dum est, quod ex crebriori usu, *ambra* plus no-
 cet, quam prodest, præmaturam *stupiditatem* infe-
 rens; profunt *masticatoria*, & *capitis lotiones*,
cheè, salvia, rosmarinus, &c.

Art. 1044. „ In praxi nostra tabellas sequen- *Vires ra-*
 „ tes, præmissis rite universalibus, hoc affectu *dicis*
 „ laboranti cum fructu maximo, multis abhinc *casum-*
 „ annis exhibuimus; ℞. *Rad. cassumuniar. subti-* *muniar.*
 „ *lissime pulverisat. ʒj. spec. diamb. sine odoratis*
 „ *ʒij. sacchar. albiss. duplo pondere f. tabellæ frē-*
 „ *quenter in die maxime vesperi, & mane co-*
 „ *medend.*

Farrago sententiarum .

Quibus de causis memoria concidit. Art. 1045. Incurabilis omnis est Oblivio quæ a parentibus proficiscitur, vel ætatis ratione fit. A nimia item venere lædi posse memoriam observat *Salmuthius*: Vir doctus (inquit) ut conjugii placeret, usus fuit stimulantibus Venerem, unde sine memoria, redditus est fatuus; & a nimia caliditate. *Galenus* casum memorat cujusdam, qui cum in colendis vitibus diutius sub sole constitisset, & inedia usus esset, in hunc affectum inciderat.

Quomodo eandem roboretur. Art. 1046. In confirmanda memoria hoc singulare observetur, quæ ante somnum post cœnam vesperi concipiuntur, vel repetuntur, matutino tempore melius impressa manere.

Casus memorabilis. Art. 1047. Historiam narrant *Tulpinus* Oblivionis a læso occipitio; Famulus Nicolai Lonii, iturus sera vespera præpropere ad Tabellarium Antverpianum, per declivem bursæ fornicem, ob glaciem id temporis summe lubricam, procidit supinus in occipitium, unde orta omnium rerum oblivione, non meminit deinceps nominis sui, nedum domus e qua venisset, aut quo contenderet delaturus, quas manu etiamnum contineret litteras. Quem mentis stuporem brevi eatenus quidem emendavit ars, ut iterum recorderetur longe præterita, at quæ casum hunc immediate præcesserant, illorum memoria plane exciderat.

Non semper calida juvant. Art. 1048. Non semper caput purgantibus, non semper excalescentibus utendum esse in curanda memoria aut abolita aut diminuta monet, & duobus casibus illustrat *Septaliis* quorum alter est cujusdam, qui ex fornacis immenso calore memoriam amiserat; in quo cum Me-

dici

dici calidis uterentur , & morbus in deterius rueret , embrochis frigidis capiti applicitis , & cibo spiritibus instauratis , sanitas reversa est , alter quempiam sistit ex metu in memoriæ deperditionem illapsum , cujus confirmato tantummodo animo , & spiritibus vino cibisque optimis instauratis convaluit.

Art. 1409. Memoriæ jactura vel ætatis invalescentis effectus est , tuncque nullam admittit *Causa generab-* curationem , vel sequella est aut symptoma *les me-* aliorum morborum : ut Apoplexiæ , Paralysis , *mori al-* Lethargi vel alterius soporosi morbi , atque hinc *sa.* in circumstantiis præcipuo morbo sanato symptoma quoque evanescit.

Art. 1050. Ad recuperandam Memoriam plurimum commendatur , ut subinde Olibani ℥. cum *Remedio pro me-* Ros. Conserva devoretur vel ut unus vel alter *moria* Myrobolanus conditus sumatur . Divinum quod *recupe-* vocat Remedium *Hildesheimus* huc spectans Oleum est Mirrhæ per deliq. quo tempora , & *randa* occiput inunguntur . Ejusdem Auctoris est etiam quod sequitur .

℥. fol. Betonic. Salv. Lavendul. Rosimar. ana *Liquor* man. ij. Nuc. Mosc. Piper. lon. Galang. cyperi ana *externe* Div. Castor. ℥ij. Myrrh. Thur. ana ℥iij. croc. ℥ij. *adhiben-* m. & infund. in sp. vin. q. s. & fiat digestio in *das.* M. B. Hoc liquore ægri tempora , & totum caput inunguntur .

DELIRIUM RABIOSUM

sive Hydrophobia.

Cælii Aureliani sententia.

Art. 1051. Ex morfu animalis rabidi homines *Hydro-* in delirium rabiosum sive hydrophobiam inci- *phobia.* dunt , quidam celerius , quidam tardius , post
an-

annum vel eo amplius , sed frequentius , post dies quadraginta .

Signa *Art. 1052.* Signa præfagientia sunt anxietas quædam, iracundia; somnus suspensus & turbatus, stomachi gravedo, oscitatio, & extensio frequens membrorum, insueta querela de aere quamvis sereno, parva bibendi voluntas. Signum præsentis mali ad apicem provecti est omnium potulentorum timor, & abhorrentia.

Meadii sententia.

Morbi *Art. 1053.* Morsus canis rabidi hoc habet in se singulare, & stupendum, quod interdum malum non prius detegatur, quam memoria illius causæ penitus oblitterata sit; *vulnus* enim est *aque medicabile* ac communes morsus sanorum animalium: Sed quandoque longe post dira symptomata exfurgunt, post duos vel sex menses, interdum post annum integrum, vel diutius, vel frequentibus post 40. dies sentiuntur dolores vagi per universum corpus, maxime circa partem læsam; æger evadit anxius ac tristis, & ad iracundiam proclivis; pulsus intermittit cum tremore aliquali, & tendinum ac nervorum spasmis; adest insignis calor internus, & sitis, & postremo aquæ timor & abhorrentia (quod *essentiam* morbi constituit) adeo ut ne quidem conspectum potulentorum sine maxima consternatione ferre possit, multo minus unam guttulam deglutire valeat, atque hoc est signum *pathognomicum* morbi consumati, quod tamen non accidit nisi sub ejus finem, & ultimam *catastrophem*, nempe diebus duobus vel tribus ante obitum, cum morbus sit prorsus insanabilis.

Quid faciendum *Art. 1054.* Sicut in aliis morsibus venenatis, ita speciatim hoc in casu *Galenus* prudenter admo-

monuit vulnus amplificare per *incisionem circum-* *Quid fa-*
lare, *cancerio* inurere, & *ulcus apertum* servare *ciendum*
 per dies 40. ad minimum: sin vero hæc metho- *est in re-*
 dus nimis dura & inhumana videatur, suffice- *cens vul-*
 re *cucurbitula* applicata virus extrahere, præ- *nerato*
 gressa prius profunda scarificatione. Sola appli-
 catione *unguenti Ægyptiaci* quam calidissimi re-
 cens vulneratum feliciter servatum novi.

Art. 1055. Si quando remedia externa omni- *Cura in-*
 no omittantur, vel saltem haud recte vel tempe- *terna*
 stive adhibeantur, cura internis magna ex parte
 tentanda est; *alexipharmaca* sunt propinanda,
 inter quæ præ reliquis omnibus *cineres cancro-*
rum fluviatilium veteres medici uno ore magno-
 pere extollunt; *Galenus* ait neminem periisse,
 cui hoc remedium propinavit; sumendi sunt ci-
 neres ad quantitatem coch. j. vel ij. singulis die-
 bus ad dies quadraginta, vel soli vel potius cum
 pulv. rad. gentian. & thur. in vino.

Art. 1056. Frequens immersio demorfi in a- *Immer-*
quam salsam marinam optimum & certissimum *sio in a-*
 omnium prophylacticorum merito perhibetur ad *quam*
hydrophobiam præcavendam. *marinâ.*

Ettmulleri sententia:

Art. 1057. Delirium rabiosum a morfu rabi- *Deli-*
 dorum animalium, in specie canis oritur, un- *rium ra-*
 de hydrophobia; demorfi plane rabiosi reddun- *biosum.*
 tur, & omnino in mores brutales transmutari
 videntur, nihil fere humani apud se retinentes.
 Præter canes, etiam *feles*, *galligallinacei*, *equi*,
mulæ, *lupi*, *boves* & similia animalia fiunt rabi-
 da, & morsus eorum sunt venenati, ut & homi-
 nis irati. Notandum est, quod etiam morsus
 levissimus, immo tantillus salivæ contactus in
 homine ab animali rabido receptus, suo tem-
 pore

pore rabiem inferre possit, adeo penetrans & malignum est illud seminium. In decursu morbi, hydrophobia est symptoma semper conjunctum. Extant exempla quædam, licet rariora, hydrophobiæ, nullo morfu animalis rabiosi prægresso; sed dubium est, an intalibus præcesserit aliqualis infectio, nec ne; contagium etenim subinde ad biennium, imo ad plures annos absconditum latet, antequam in actum erumpat.

*Signa
rabiei
incipien-
tis.*

Art. 1058. Signa rabiei incipientis in demorso sunt anxietas præcordiorum, iracundia sine causa, querelæ de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate, & ineptitudine ad motum; æger melancholicus evadit, lucem fugit, a potu abstinet, in parte olim vulnerata morsificationem & titillationem, interdum dolorem sentit.

*Hydro-
phobici;
intra tri-
duum
vel qua-
triduum
moriun-
tur.*

Art. 1059. In morbo perfecto ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, collum, & fauces ringunt, liquida omnia abhorrent, insomnes permanant; in his extremis raro curantur, sed ut plurimum moriuntur inter triduum, vel quatrinduum post inceptam hydrophobiam.

*Inten-
tiones
curati-
væ.*

Art. 1060. Ex vulnere facto, quantocyus fieri potest; *malignum virus* extrahendum est, ideoque sanatio non cito perficienda est, sed vulnus potius ampliandum. Interne conducunt *cardiaca & alexipharmaca*, *tinctura bezoardica*, *Spiritus theriacalis camphoratus*, &c. sed omnia dupla dosi danda sunt, & diutissime insistendum est his remediis; super locum morsum, allium, ruta, & sal contusa & mista apponenda sunt more cataplasmatum. Præ ceteris optima cura fit per improvisam in *aquam frigidam* immersionem; convenit *purgatio* cum *helleboro* & *mercurio dulci*; *diuretica* profunt; vis *cantharidum* est quasi specifica. Post scarificationem vulneris applicetur

cepa sub cineribus affata vel sequens; *M. Cepam* *acrem* N^o. 1. *alliorum capita*. N^o. 5. *theriac*. *℥vj.* *ferment*. *℥β.* f. cataplasma: sunt qui addunt, *herb. rut. sem. sinap. ol. scorpion.* &c. verum proutissimum remedium est *ustio* loci affecti cum *ferro candente*: hæc omnem malignitatem destruit: Si sero advocatus sit medicus, applicanda est *cucurbitula* cum multa flamma; conducit etiam *foniculus* prope locum affectum.

Listeri sententia.

Art. 1061. Præter signa ab aliis commemorata futuræ hydrophobiæ unum se, quod præcipuum & infallibile appellat, animadvertisse ait omnibus ignotum, viz. *dolor quidam in loco commorso*, licet ulcus antea per dies & menses integre fuerit sanatum, accedens, qui intensus esse non consuevit, nisi morsus partem nervosam petierit: hic dolor a loco jam commorso incipiens leviterque patientem affligens, per partem post partem spatio 3. aut 4. dierum plus minus ascendit ad cerebrum, ubi quasi *vertiginem* causat, & *confusionem*, indeque statim homo in *rabiem* deducitur.

Art. 1062. Huic prognostico (nempe *neminem aquæ metu oppressum servatum esse*) consentiunt fere omnes antiqui.

Art. 1063. Ex nostra observatione ipsam *salivam* præcipue vitari, atque in ea uni esse virus, experimentis credo: etenim hæc fere vulnera inficere solet, & etiam sine vulnere communicari potest malum. „ Huic conjecturæ ad „ stipulatur historia duorum hominum hoc ma „ lo affectorum *solo salivæ tactu* sine recepto „ vulnere, itemque duorum puerorum in *Hibernia sola tractatione vulneris* in capite canis „ ab

*Dolor in loco de-
morso
dix post
vulnus
sanatum
signum
futuræ
hydro-
phobiæ.*

*Omnes
hydro-
phobicæ
moriun-
tur.
Virus in
saliva
maxime
consistit.*

„ ab altero rabioso demorſi pariter infectorum;
 „ hiftoriæ proſtant in Actis philoſophicis. Plures
 „ canibus rabioſis demorſi curæ meæ commiſſi
 „ fuerunt, ſed ne unum quidem *Hydrophobia*
 „ laborantem mihi unquam contigit videre;
 „ ſuppeditantur exempla ex Gallic. Hiſt. Acad.
 „ Scient. quorundam curatorum, etiam ubi a-
 „ quarum pavores aderant, maxime *phleboto-*
 „ *miis* uſque ad deliquia iteratis vicibus cele-
 „ bratis; *immerſionibus in aquam ſalsam* tan-
 „ tum non mortem inferentibus, & *perfuſio-*
 „ *nibus* ejuſdem uſque ad extremas vitæ oras
 „ provectis. „ Quidam medicus hydrophobici
 „ cujuſdam oculis mappam craſſam ſuperinjecit,
 „ manibus ligatis, potionem bibere invitum ali-
 „ quoties cogeſcit; at prorſus ſiniſtro eventu;
 „ nam ſtatim vehementer convulſus obiit. „ Qui
 „ plura velit adeat authorem Liſterum, qui
 „ elegantiffimum tractatum de hoc affectu con-
 „ ſcripſit. Admiranda proſecto eſt hiftoria *Ja-*
 „ *cobi Corton* apud illum ab omnibus lectu di-
 „ gniffima.

Leuvthorp. Philoſ. Tranſact.

Vol. III. pag. 283.

Art. 1064. ℥ſ. Rad. ſerpent. virgin. flor. hyperic.

Reme- ana p. a. f. pulv. doſ. ℥ſ. vel ℥ij. in julap. cephalic.
diu ſu. ℥ſ. Fol. rut. ℥vj. cheriac. Ven. alliæ, rament. Jovis
gulare. ana ℥iv. infund. in vin. Canarienſ. vel alb. dige-
 re in balneo per horas 4. coletur cum expreſ-
 ſione forti, doſis ℥ij. vel iij. ſingulis auroris ad
 dies novem, maneatque æger jejunus per tres
 horas: *manens reſiduum* parti vulneratæ circum-
 ligetur, & ſingulis diebus renovetur. Remedium
 hoc me nunquam feſellit. *Mayerne.*

Reme-
diu to-
picum.

Art. 1065. Loco vulnerato quamplurimum ap-

pli-

applicetur *anus galli veteris* plumis prius divulsis;
& si canis rabiosus esset, gallus statim intumes-
cet, & mox morietur, & demorsus sanabitur;
si vulnus sit exiguum, ampliari debet.

Art. 1066. Aliter, homo morsus *in mare* quam- *Alia me-*
primum novies immergatur, & locus vulnera- *thodus.*
tus cum lixivio & cineribus *quercinis & urina*
eluat, & applicetur cataplasma ex *theriaca*
Londinensi, alliaria, ruta, & sale.

Art. 1067. ℞. *Fol. rut. sic. scord. ana ℥ij. rad. Electua-*
Serpent. virgin. ℥i℥. flor. hyperici ℥iij. theriac. Lond. rium.
℥j. Syr. e cort. limon. q. s. m. f. elect. pro dos. ix. una
singulis auroris sumenda.

Art. 1068. *Lichen cinereus terrestris* (Raii p. *Lichen*
117.) cum æquali quantitate *piperis* est remedium *cinereus.*
infallibile ad rabiem præcavendam in homine ac
jumento.

Art. 1069. „ Aliquando expertum vidimus *Decoctum*
„ decoctum ad morsum canis rabidi *pharm. Bat. ad mor-*
„ cum felici successu. Postremo quoniam hoc *sum ca-*
„ inale a morfu animalis (& ut plurimum ca- *nis ra-*
„ nis) rabiosi omnino pendet, operæ pretium *bidi.*
„ esse videtur, ut accurate animadvertamus,
„ quænam sint signa *diagnostica* canis vere ra-
„ bidi, ut futurum morbum, si fieri possit,
„ præcaveamus. „ Sequentia itaque habemus a-
pud *Lomnium*; canis rabiosus esurit, sitit, nihil *Signa*
tamen cibi vel potionis sumit, oculos flammeos *diagno-*
trucesque habet, auriculas demittit, linguam *stica ca-*
exerit, multum ore spumat, umbræ suæ obla- *nis ra-*
trat, sæpe sine omni latratu tristis atque anxius *biosi.*
discurrit, crebro tanquam cursu fatigatus spi-
rat; caudam gestat intortam, nullo discrimine
in quosque obvios animantes impetu ac morfu
fertur, præcipiti atque incerto oberrans cursu.
Integri canes & conspectum & latratum ejus,
qui furit, exhorrescunt, ac fugiunt. „ Primum
„ sym-

„ symptomata rabiei in canibus est *invisitatus tre-*
 „ *mor seu trepidatio.*

Farrago sententiarum.

Hydro-
phobia
est deli-
rii spe-
cies.

Art. 1070. Vera hydrophobia est canina rabies a morfu canis rabidi communicata; interdum etiam ab animali quovis rabido, & ira furente, quæ in delirio consistit, in quod nonnulli celerius, alii tardius post susceptum morsum, quidam post annum, vel eo amplius, sed frequentius post dies 40. incidunt. Neque vero tam perpetuum delirium est, quin imo frequenter dentur rabidi, qui sibi mente constant, & morbi invasionem sentiunt, & rogant, jubentque, ut sibi vincula injiciantur, ne ipsi in amicos, & adstantes irruant. Hinc patet quam nihil habeat morbus hic cum mania affinitatis.

Ejus se-
igna.

Art. 1071. Si in vulnere, vel consolidato, vel ligationis cujusdam, rosionis ac doloris sensum æger percipiat, qui caput versustendat, & inde vertigo excitetur, vigiliis, somniis turbulentis, anxietate quadam, & iracundia, vel timore præter rationem, ventriculi gravitate, & vellicatione, sensu quodam velut aeris inclementioris, insolita a cibo, potuque abstinentia afficiatur, judica talem ab animali rabido demorsum fuisse. *Scardona.*

Remedia
utilia.

Art. 1072. Alexipharmaca sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus cineres cancerum fluviatilium, veteres medici uno ore magnopere extollunt. Galenus, ait, neminem perisse, qui hoc remedium propinavit. Sumendi sunt, cineres ad quantitatem cochl. j. vel ij. singulis diebus ad dies 40. Frequens item adventante hydrophobia in aquam salis marinam immersio aliquando valet. Ubi vero de ægro-
 rum

rum salute conclamatum jam sit , nihil ex-
periundum restat præter liberalem , ac repe-
titam venæ sectionem , si temperamentum ,
vires , ægrique constitutio permittunt , præ-
ter immersiones per vim , & metum in a-
qua , & perfusiones per universum corpus
tandiu celebrandas , quandiu aquam vix pa-
veant ægri.

Art. 1073. Cantharides quasi específicas in *Noxia*
hoc morbo habitas ab Ettmullero , & Bac-
chio: ut etiam pulverem illum famosum ex
cantharidum , & piperis longi ana gr. iv. cum
mica panis ab initio statim adhibendum , quo-
usque sanguis , cum urina exire incipiat , o-
mnino damnamus , & perniciosissimum cre-
dimus . Et quia urina sanguinea prodeunte
ad lactis usum mox devenitur , satius habe-
mus nullo premissio hujusmodi noxio pulve-
re ad lac confugere , eodemque per 40. dies
ægros saginare.

Art. 1074. Ad præcavendam rabiem in ho-
mine ac jumento Lichen cinereus terrestris ,
cum æquali quantitate piperis est laudatum
remedium . „ Sequens vero *remedium R.*
„ *Schembergus* , ait , Indis Orientalibus feli-
„ citer usitatum mihi maxime commenda-
„ vit Vir fide dignissimus. ℥. Cinnab. An-
„ timon. factic. ana gr. xv. Mosch. gr. xij.
„ fiat pulvis mane , & vesperi e cyatho vi-
„ ni generosissimi sumendus per quamplu-
„ res dies , vel pro re nata „. Sed nihil ma-
gis præstat , quam vulnus statim etiam con-
solidatum denuo aperire , & late scarificare
cucurbitula fortiter attrahente desuper appli-
cata , vel partem affectam ferro ignito inu-
rere , & fotu frictioneque ex muria salis , &

*Præser-
vativa.*

aceto assidue tractare . Atque hæc quidem , primis a morfu diebus conferre visa sunt . Si progressu adhibeantur oleum , & operam perdimus .

*Curatio
per sudorifera.*

Art. 1075. Jam ubi hydrophobia invaserit, nihil inter initia efficacius ol. amygdal. dulc. sem. lini, vet ol. rosat. ad unc. v. propinatur, quo ad bibendum æger disponitur, cui sudorifera, cum regimine calido ad sudandum insuper jubentur; ut Pulv. Palmarii, Julapium Cephal. Mayerne, Acet. Aromat. Hanemani, &c.

*Signum
imminentem
hydrophobiam
indicans.*

Art. 1076. Petrus Salius Diversus in lib. de affect. Particularib. observat biduo ante hydrophobiæ accessum ægrum de vehementi in cicatrice vulneris vellicatione, & punctura conqueri; quod ab aliis quoque confirmatum est. D. Boudon, insuper addit trigesimo nono die a morfu hujusmodi puncturam, & vellicationem in cicatrice vulneris notasse atque biduo post ægrum hydrophobum evasisse.

Prognosis.

Art. 1077. Hydrophobi ut plurimum quinta die aquæ timore, liquorumque omnium horrore moriuntur, non obstante etiam quod crebræ imersiones adhibeantur. Certissimum est enim Boerhaavium, Osterdyk-Schanchtium, aliosque demersiones in aquam sæpe incassum cedere comperiisse.

*Altera
curandi
methodus.*

Art. 1078. Post canis rabidi morsum vulnus apertum detinendum est, quod statim aqua salsa abluitur, inde scarificatur, eidemque, vel cucurbita, vel vesicatorium imponitur. Unguento aliquo mercuriali illiniri debet, & vel unguento eodem, vel etiam Mercurio dulcificato intus sumpto, ut in
luis

luis Aphrodisiacæ curatione usuvenit, salivatio promoveatur. Finita salivatione per mensem, si opus, continuata, restitutisque congruo alimento ægri viribus, & nutritione a timore subsequenti hydrophobiæ immunis vivere poterit; si vero ex cicatricis vellicatione, & punctura hydrophobiam instare cognoscatur, aut eadem jam facta sit, tunc nulla interjecta mora ad Turbith Minerale confugiendum erit. *Vid. Transf. Philosoph. ann. 1736. D. BOUDON Abrege de la Med. de M. J. Allen Ch. III. §. xxij. de la Rage. D. James in epist. ad D. Hans-Sloane ibid.*

T A R A N T I S M U S.

Art. 1079. Tarantismus est rabies eorum, qui a *tarantulis* sunt morfi. *In Apulia Italia regione* frequenter occurrit; apud nos nusquam invenitur. Spiritus animales primario afficiuntur. Cura per *musicam* peragitur. *Clarissimus Baglivus* de hoc affectu tractatum emisit: & de eodem etiam scripsit *celeberrimus noster D. Mead*, quibus remittendus est lector eruditus. *Vid. etiam Hist. de l'Acad. Vol. VI. p. 20. tum etiam Hassenreffer de Cutis Affectibus*, circa finem, ubi etiam Cantilenas quasdam adfert Italico vernaculo conscriptas, quæ una cum Instrumento Musico luduntur, quemadmodum habuit *P. Kirkerus* in sua *Musurgia*. Item consulantur *Obs. Anotom. Med. Chirurg. Stalpartii Van der Wiel. Cent. I. obs. 100.*

Art. 1080. Nec tantum Musices præstantia, & curativa virtus ad Tarantismum subigendum, sed ad alios etiam compescendos mor-

bos extenditur. In historia Acad. Regiæ Scient. Parisiens. Anno 1707. pag. 7. hæc narrantur. Musicus quidam febre continua remittente correptus circa finem septimi, cum ejulatibus, vociferationibus, terroribus & agryphia, vehementi delirio corripitur. Tertio ejusdem delirii die, cum nonnullis frueretur rectæ mentis intervallis, exoravit ut plurimum musicalium instrumentorum Symphonia in suomet cubiculo concederetur. Id vero ægre Medicus patiebatur. Tamen nonnullis D. Bernier cantilenis lusus, ab ipso usque musices ingressu vultus lætitiâ ostensus est, oculique ejus lacrimis præ voluptate maduere, & usque ad finem Musicæ omni febre immunis deprehensus est. Symphonia remota iterum febris, ut prius revertebatur, & per aliquot dies hujus remedii usu continuato eosdem semper viros produxit effectus. Decimo tandem die ab usu Musices nullis antea auxiliis adhibitis, quam sanguinis emissionem a pede, omnino convaluit. Similis quoque casus in eadem Hist. Academ. occurrit ad annum 1708. de Saltatore delirio occupato, qui instrumento musicali audito postquam diu brachiis notas musicales persequutus est, profundo demum somno correptus, salubri crisi oborta, convaluit.

INCUBUS SIVE EPHIALTES.

Vuillisi sententia.

Incubus. Art. 1081. Incubi paroxysmus fere tantum inter dormiendum ingruit, & plerumque post stomachum cibis dyspeptis aggravatum, & decubitus in lecto supinum excitari solet; eo labo.

laborantes potissimum in pectore ; & circa præcordia noxam sentire videntur , nam respiratione plurimum impedita , se a pondere , thoraci graviter incumbente , opprimi putant ; quod pondus nunc hac nunc illa *spectri* aut *larva* specie ipsorum imaginationes illudit , nec exequere possunt , nec corpus dimovere ; verum post diuinam , ac interdum fere ad vitæ deliquium , in præcordiis luctam tandem evigilant , & moles imaginaria evanesceat ; superstite vero ut plurimum cordis tremore , & non raro diaphragmatis vibratione celerrima & violenta . Hic affectus raro ex se periculosus est .

Art. 1082. Præmissis universalibus *cephalicis* *Curatio .*
& *antispasmodicis* curatur .

Ettmulleri sententia.

Art. 1083. Raro hoc malo afficiuntur ; qui *Quomodo*
laudabili utuntur diæta , aut qui *sobriam a-* *præcave-*
mant *cœnam* ; si dormiatur in latere elevato *acur .*
capite , præcaveretur incubus . Ab Arabibus appellatur *epilepsia nocturna* , quia incubus habitualis , & diuturnus in *epilepsiam* tantum degenerare solet , & est ejusdem prodromus in junioribus , uti in senibus *apoplexia* .

Art. 1084. Incubus habitualis curandus est , *Curatio .*
præmissis præmittendis , *antiepilepticis* , *mar-*
tialibus , &c. cum sobrietate conjuncta . *La-*
pis lazuli laudatur .

*Inter legendum.**Elegans
morbi
descri-
ptio.*

Art. 1085. Antonius Menjotus hunc affe-
ctum eleganter describit; quod sit nocturna
spirandi difficultas absurda superinjectæ molis
opinione somniantem eludens. Pueros frequen-
ter exercet; quia voraces plus comedunt, quam
digerunt. Cum vehementior impresserit præ-
focatio, quosdam interfici, testatur Aurelianus;
additque ex Silimacho contagiosum quoddam
& epidemicum Incubum Roma grassantem mul-
tos pestis instar jugulasse.

*Quando-
que let-
alis est.**Finis Primæ Partis.*

